BUHR B

[redacted]

a39015 00004929 9b

Illustriertes Handbuch

der

Laubholzkunde

Charakteristik der in Mitteleuropa heimischen und im Freien angepflanzten angiospermen Gehölz-Arten und Formen mit Ausschluß der Bambuseen und Kakteen

Von

Camillo Karl Schneider

Register.

Verlag von Gustav Fischer in Jena
1912

Digitized by Google

Alle Rechte vorbehalten.

Schlußwort zum Registerband.

Es sind gerade 8 Jahre, seitdem die erste Lieferung meiner Laubholzkunde erschien. Nach 10jähriger, angestrengter Arbeit kann ich das zum Abschluß gebrachte Werk der Öffentlichkeit übergeben. Wenn ich es auch mit einer gewissen Befriedigung tue, so geschieht es doch in dem Bewußtsein, daß die Vollständigkeit und die — wenn ich so sagen darf — vollendete Genauigkeit des Buches, welche viele Leser gewiß erwarten werden, nicht erreicht wurde.

Daß ich danach gestrebt habe, alle bis Ende 1911, ja selbst Anfang 1912 in Kultur gekommenen und als sicher brauchbar für die Kultur beschriebenen Laubgehölze zu berücksichtigen, beweist der umfangreiche Nachtrag. Allein schon die Zahl der neuen chinesischen Formen ist eine so ungeheuere, daß es sich als unmöglich erwies, auch nur das bis jetzt sicher Bekannte noch vollständig einzureihen.

Als ich den Gedanken zur Ausführung einer Laubholzkunde faßte, konnte ich nicht ahnen, wie gewaltig die Zahl der Neueinführungen anschwellen würde. Seit 1902 sind aus Ostasien, ja allein aus China, weit über 1000 gute Arten beschrieben worden, von denen schon viele hunderte inzwischen durch Sammler, wie Giraldi, Faurie, Farges, Soulié, Silvestri, Taquet, Henry, vor allem aber durch E. H. Wilson in Kultur gelangten. Zählt man dazu all das, was C. A. Purpus u. a. aus Nordamerika zu uns brachten, was durch den St. Petersburger Garten aus Centralasien eingeführt wurde, was Bornmüller, Siehe u. a. im näheren Orient entdeckten, was meist durch Kew aus dem temperierten Himalaya den Weg in unsere Gärten fand, so wird man begreifen, daß mein Werk den geplanten Umfang ungemein überschreiten mußte.

Während des Erscheinens der verschiedenen Lieferungen wurden, oft kurz nach Ausgabe meiner Bearbeitung, zahlreiche Monographien über dendrologisch wichtige Familien und Gattungen veröffentlicht. Ich weise nur hin auf Dodes Arbeiten über *Populus* und *Juglans*, auf

242639

Koehnes Darlegungen über *Prunus* und diverse *Evonymus*, auf Rehders Beiträge über *Lonicera, Viburnum, Abelia, Deutzia, Hydrangea, Acer* und im Verein mit E. H. Wilson über *Cotoneaster* etc., auf Komarows *Caragana*-Monographie, auf Graf Schwerins *Sambucus*-Arbeit, auf Bearbeitungen über chinesische Pflanzen von Diels, Hemsley, Wilson, Finet und Gagnepain, — um nur das Allerwichtigste anzudeuten. In Englers „Pflanzenreich" gelangten zur Ausgabe z. B. die *Cornaceae* (Wangerin), *Betulaceae* (H. Winkler), *Styracaceae* (Perkins). Ich selbst habe über *Berberis* und *Syringa* gearbeitet.

Das, was ich am Schluß meines Vorwortes zum zweiten Bande gesagt habe, kann ich auch heute nur wieder betonen. Bei allem meinen Bestreben, die Formenkreise kritisch durchzuarbeiten, konnte Vieles nicht über den Rahmen eines Referates hinausgehen. Ich kann nur hoffen, daß ich alles Wichtige zusammengetragen und daß ich vor allem auf sehr sehr viele Lücken unserer Kenntnisse hingewiesen habe. Koehnes, in ihrer Art sonst ausgezeichnete Dendrologie, die natürlich heute sehr ergänzt werden müßte, hatte meinem Gefühl nach schon beim Erscheinen den einen Fehler, daß der Benutzer aus der Art der Darstellung den Eindruck gewinnt, als sei alles in der schönen knappen Form, wohinein es Koehne gegossen hat, ein für alle Male richtig dargestellt. Es mag ja für den Laien seine Vorzüge haben, wenn man ihm alles so bietet, daß er etwas durchaus Sicheres vor sich zu haben glaubt, allein die Unzulänglichkeit unseres Wissens und die Unbeständigkeit der wissenschaftlichen Auffassungen ist eine nur zu große. Ich möchte nicht den Eindruck im Leser erweeken, als fühle ich mich als dendrologische Autorität. Ich hasse jeden wissenschaftlichen Eigendünkel, der einmal Erkanntes für ewig gültig hält, wo doch jeder Tag uns lehrt, daß wir immer neu lernen und berichtigen müssen. Ich begrüße jede berechtigte Korrektur meiner Darlegungen — die ich aus leicht begreiflichen Gründen sehr oft viel früher abschließen mußte, als mir lieb war — mit aufrichtigem Danke. Gerade Herrn Prof. Koehne fühle ich mich für viele kritische Hinweise verpflichtet. Nur wolle man im Auge behalten, daß ich vielleicht noch einige Jahrzehnte hätte arbeiten müssen, wenn ich jeder Gattung und Formengruppe eine solche Studie hätte widmen wollen, wie sie Koehne für *Prunus* durchgeführt hat und wie ich selbst es bei *Berberis* und *Syringa* versucht habe. Niemand kann stärker empfinden, wie unzulänglich noch die Übersichten über *Spiraea, Sorbus, Rhamnus, Vitis* — um nur einige kritische Gattungen anzudeuten — sind. Vielleicht bringt schon die allernächste Zeit hier Klärung auf Grund des ungemeinen Reichtums Chinas an solchen Formen.

Wenn recht Vieles in meiner Dendrologie den Anforderungen nicht genügen kann, die unsere besten heutigen Dendrologen, wie Koehne, Rehder, E. Wolf u. a. an mein Werk stellen mögen, so

liegt dies nicht zuletzt daran, daß ich trotz des außerordentlichen Entgegenkommens, welches mir die auf den Widmungsblättern und in den Vorworten genannten Herren, Behörden und Institute und vor allem mein Herr Verleger bewiesen, daß ich trotz alledem mit der Zeit das Werk als eine für mein wirtschaftliches Emporkommen unerträgliche Bürde empfand. Trotz aller Hilfe sah ich mich zur Darbringung von Opfern genötigt, die auf die Dauer meine wirtschaftliche Lage schwer schädigten. Wenn daher das Werk kein Torso bleiben sollte, mußte ich es bis Ende Februar 1911 abschließen.

Aber was es auch für Mängel haben möge, es ist doch die einzige wissenschaftliche und auch durch die Erleichterung der Bestimmungsübersichten und die ungeheuere Zahl der bildlichen Darstellungen für alle Gehölzfreunde brauchbare Laubholzkunde der Gegenwart. Weder in deutscher, noch in englischer, noch in französischer Sprache gibt es ein Buch, worin das riesige Laubholzmaterial unserer Gärten von heute sich gesammelt findet. Daher kann mein Buch, in dessen Nomenklatur ich den gültigen internationalen Beschlüssen folge, auch als Grundlage für eine einheitliche Namengebung angesehen werden. Der vor 1905 (dem Wiener Botanischen Kongreß) unternommene Versuch der rührigen Deutschen Dendrologischen Gesellschaft, ein „Handbuch der Laubholzkunde" zu schaffen, ist nicht nur an den Wiener Beschlüssen gescheitert, sondern vor allem an der Unzulänglichkeit des Werkes selbst. Es genügt nicht, überall abzuschreiben, um eine Grundlage zu schaffen, und außer Zabels Beiträgen sind die Angaben dieses Buches, soweit sie nicht Arbeiten von Koehne oder Schwerin entnommen wurden, ganz unzulänglich. Die Deutsche Dendrologische Gesellschaft täte eine gute Tat, wenn sie dieses allzu hastig und flüchtig durchgearbeitete sog. Handbuch als unbrauchbar einzöge. So wie es ist, kann es nur Verwirrung stiften.

Ein wirkliches Übereinstimmen in der Namengebung wird sich zwischen den Vertretern der systematischen und angewandten Botanik, sowie den Gärtnern, Forstleuten und Liebhabern vielleicht nie erzielen lassen, oder jedenfalls bei den einzelnen Formen erst dann, wenn die Wissenschaft ihr letztes Wort sprechen konnte. Und gerade eine nicht geringe Zahl der für den Kultivateur und überhaupt den Vertreter der Praxis wichtigen Formen ist zur Zeit wissenschaftlich noch gar nicht oder nur sehr unzulänglich bewertet. In den Katalogen werden immer eine große Anzahl von Namen sich finden, die keine Dendrologie sicher deuten kann. Aber in der Benennung der wissenschaftlich fest umgrenzten Formen sollten die Baumschulenbesitzer, Forstleute und Liebhaber doch den internationalen Vereinbarungen folgen. Wenigstens würde es sehr zur leichteren Verständigung beitragen, wenn die botanisch korrekten Namen meiner Laubholzkunde, soweit es geht, neben den handelsüblichen in Klammern geführt würden!

Digitized by Google

Auf ein für die Praxis wichtiges Buch, welches demnächst erscheinen und eine wertvolle Ergänzung zu meiner Laubholzkunde bilden wird, möchte ich noch hinweisen. Es ist das zweite Kulturhandbuch der „Dendrologischen Gesellschaft für Österreich-Ungarn" und wird den Titel: „Unsere Freiland-Laubgehölze" führen. Es wird gegen 500 photographische Habitusbilder enthalten und bietet im Verein mit meiner Laubholzkunde dem Gehölzfreund alles, was er nur brauchen kann.

Dem hochverehrten Herrn Präsidenten dieser Gesellschaft Sr. Exzellenz Herrn Ernst Graf Silva Tarouca, Pruhonitz, fühle ich mich zu ganz besonderem Danke verpflichtet. Seine gütige Unterstützung und die durch seine liebenswürdige Vermittlung erfolgte Förderung meiner Arbeit durch die anderen auf dem Widmungsblatt von Band II genannten Gönner ermöglichte es mir, die Laubholzkunde zu dem jetzt vorliegenden Abschluß zu bringen.

Ferner danke ich nochmals allen den Herren, die ich in den beiden Vorworten genannt habe. Insbesondere Herrn Alfred Rehder, dessen sehr liebenswürdige Vermittlung es mir möglich machte, die Arbeiten im 2. Hefte der „Plantae Wilsonianae" noch im Nachtrage berücksichtigen zu können.

Noch nicht erwähnen konnte ich die freundliche Unterstützung durch die Herren Dr. Degen, Budapest, W. Kesselring und E. Wolf, Petersburg und A. Fomin, Tiflis.

Herrn Baron István Ambrózy, dessen Anlagen in Malonya durch ihren Gehölzreichtum und ihre gartenkünstlerische Bedeutung bald ein Wallfahrtsort für alle ernsten Jünger der Gehölzkunde und Gartenkunst sein werden, danke ich besonders herzlich für seine vielfache Hilfe.

Mein verehrter Freund, Herr Carl Bergmann, Wien, hatte die Güte, den größeren Teil des Registerhandes für mich auszuarbeiten.

Mit Worten vermag ich es nicht auszudrücken, wie sehr ich mich dem Verlag gegenüber verpflichtet fühle. Leider weilt Herr Dr. Gustav Fischer, mit dem ich den von mir im Zwange der Verhältnisse so übel eingehaltenen Verlagsvertrag abschloß, nicht mehr unter den Lebenden und ich kann ihm persönlich nicht mehr danken. Ich kann nur wünschen, daß seinem Herrn Sohne die so beträchtlichen Kosten des Buches durch einen gesteigerten Absatz wenigstens zum größten Teil wieder vergütet werden.

Herrn Adolf Kasper, Wien, welcher die Ausführung der Zeichnungen nach Vorlagen aufs Gewissenhafteste besorgte, danke ich ebenfalls für seine Arbeiten. In gleicher Weise der Druckerei, welche den schwierigen Satz mit großer Sorgfalt durchführte.

Es war meine Absicht, auf dem Titelblatt der letzten Bände meinen Namen ohne den Zusatz Karl zu schreiben. Auf besonderen Wunsch des Verlags habe ich dies unterlassen, erlaube mir aber den

Hinweis, daß ich mich jetzt und künftig nur noch CAMILLO nenne, um die vielfachen Verwechslungen mit dem Wiener Zoologen und Philosophen Herrn Professor Dr. KARL CAMILLO SCHNEIDER, zu vermeiden. Ich selbst beschäftige mich außer mit Dendrologie vorzüglich mit Gartenkunst und mit sozialen Fragen.

Etwaige Zuschriften und besonders viele Hinweise auf all das, was in meinem Buche unzulänglich ist oder fehlt, erbitte ich wie bisher nach Wien I, Burgring 7, wo ich noch immer in der Botanischen Abteilung des K. K. Hofmuseums die aufrichtigste Gastfreundschaft genieße und von dem Vorstand, Herrn Custos Dr. ALEX. ZAHLBRUCKNER, wie von den Herren Assistenten, Custosadjunkt Dr. K. VON KEISSLER und Custosadjunkt Dr. KARL RECHINGER bis zum Schluß bei der Bearbeitung meines Buches aufs Freundlichste unterstützt wurde, wofür ich zu guter Letzt nochmals meinen allerbesten Dank abstatte.

Wien, 15. Mai 1912.

Camillo Schneider.

Alphabetisches Register

aller in Band I und II erwähnten Gattungen, Arten, Varietäten und Formen.

Im Register ist die Bezeichnung Subspezies, Unterart, Varietät, Subvarietät oder Form weggelassen und die einzelnen Glieder einer Art sind nach ihrem systematischen Wert rangiert. Ungenaue, abgekürzte oder unrichtige Autorzitate, Namen und Formen sind im Register ergänzt und berichtigt! Bei Bastarden steht stets der dem Alphabet vorangehende Elternname an erster Stelle. Die halbfett gedruckten Zahlen zeigen an, daß über die betreffende Form im Hauptnachtrag etwas Wichtiges gesagt wurde, bzw. daß sie erst dort Aufnahme fand. Ziffern mit Vorsatz von II beziehen sich auf Band II.

Abelia R. Br. II. 676, **1058**.
– adenotricha Hance II. 1060.
— angustifolia Bur. et Fr. II. 1060.
— Aschersoniana Rehd. II. 1059.
— biflora Turcz. II. 678, 1060.
— — sanguinea Mak. II. 678.
— Buchwaldii Rehd. II. 1058.
— chinensis R. Br. II. 677, 1059.
— — × uniflora II. 677.
— coriacea Hemsl. II. 1059.
— corymbosa Rgl. et Sehmalh. II. 679, 1060.
— Davidii Hance II. 678.
— Dielsii Rehd. II. 1060.
— Engleriana Rehd. II. 1059.
— floribunda Decsn. II. 676, 1059.
— — hybrida Ht. II. 677.
— Graebneriana Rehd. II. 678, 1059.
— grandiflora Rehd. II. 677, 1060.
— gymnocarpa Rehd. II. 1058.
— Hanceana Mart. II. 1059.
— hirsuta Walp. II. 1059.
— hybrida Zab. II. 677.
— Koehneana Rehd. II. 1059.
— longituba Rehd. II. 1059.
— maerotera Rehd. II. 1059.
— myrtilloides Rehd. II. 1059.
— onkocarpa Rehd. II. 1060.
— parvifolia Hemsl. II. 678, 1059.
— rupestris Ht. II. 677, 1059.
— — Ldl. II. 677.
— — grandiflora Rov. II. 677.
— Schumannii Rehd II. 1059.
— serrata Ht. II. 678.
— — S. et Z. II. 678, 1058.
— Shikokiana Mak. II. 1060.
— spathulata S. et Z. II. 678, 1058.
— speciosa Decsn. II. 1059.
— teretiealyx Rehd. II. 1059.
— triflora R. Br. II. 679, 1060.
— umbellata Rehd. II. 1060.
— uniflora Ht. II. 677.
— — R. Br. II. 678, 1059
— Zanderi Rehd. II. 1060
Abelicea Rehb 224
– Abelicea C. S. 226, 806.
– hirta C. S. 226, 806.
Abelicea Keaki C. S. 226.
– ulmoides O. Ktze. 224.
Absinthium arborescens Moench II. 765.
Acacia Julibrissin W. II. 4
Acaena L. II. 968.
— agrimonioides K. II. 969.
— elongata L. II. 968.
— — gracilis Bitt. II. 969.
Acanthopanax Miq. II. 424.
— acerifolium Schelle II. 429.
— aculeatus Seem. II. 427.
— asperatum Fr. et Sav. II. 428.
— brachypus Harms II. 426.
— divaricatus Seem. II. 428.
— Giraldii Harms II. 424.
— Henryi Harms II. 424, 1040.
— innovans Fr. et Sav. II 427.
— japonicum Fr. et Sav. II. 427.
— leucorrhizus Harms II. 424, 1040.
— pentaphyllus Mareh. II. 427.
— ricinifolius Seem. II. 429.
— — magnificus Zab. II. 429.
— — Maximowiczii C. S. II. 429.
— sciadophylloides Franch. et Sav. II. 429.
— senticosus Harms II. 424.
— sessiliflorus Seem. II. 429.
— setchuenensis Harms II 426.
— Sieboldianus Mak. II. 427.
— Simoni Sim.-Louis II. 427.
— spinosus Ht. II. 427.
— — Seem. II. 427.
— trichodon Fr. et Sav. II. 427.
— — Zbl. II. 427.
— trifoliatus C. S. II. 427.
Acer L. II. 192, **1027**.
— acuminatum Wall. II. 244
— aetnense Hort. II. 227.
— ambiguum Dipp. II. 225.
— amplum Rehd. II. 1029.
— — tientaiense Rehd. II. 1029
— argutum Maxim. II. 245.
— austriacum Hort. II. 230.
— — Tratt. II. 231.
— azinatum Ht. II. 196.
— barbatum Michx. II. 243.
— — grandidentatum Sarg. II. 244.

Acer barbinerve Maxim. II. 245.
— Bedoi Borb. II. 231.
— betulifolium Maxim. II. 245, **1029**.
— Bornmülleri Borb. II. 231.
— Bosci Spach II. 197.
— bosniacum Maly II. 236.
— Buergerianum Miqu. II. 197.
— — ningpoense Rehd. II. 198.
— caesium Wall. II. 205.
— californicum Dietr. II. 222.
— — Hort. II. 221.
— — texanum Pax II. 222.
— Campbelli Hook. II. 205.
— — yunnanense Rehd. II. 206.
— campestre L. II. 230.
— — affine Opiz II. 230.
— — austriacum DC. II. 231.
— — collinum Wallr. II. 231.
— — glabratum Wim. et Grab. II. 230.
— — hebecarpum DC. II. 230.
— — — acutilobum Pax II. 230.
— — — lobatum Pax II. 230.
— — — — affine Pax II. 230.
— — — — molle Schwer. II. 230.
— — — — quinquelobum Schwer. II. 230.
— — — subtrilobum Schwer. II. 230.
— — × lactum II. 227.
— — lasiophyllum Wim. et Grab. II. 231.
— — leiocarpum Tausch II. 230.
— — — austriacum Pax II. 231.
— — — glabratum Bedoi Pax II. 231.
— — — normale Schwer. II. 230.
— — — — Bedoi Schwer. II. 231.
— — — — collinum Schwer. II. 230.
— — — — glabratum Schwer. II. 230.
— — — pseudomarsicum Pax II. 230.
— — marsicum Pax II. 230.
— — molle Opiz II. 230.
— — × monspessulanum II. 231.
— — subtrilobum Ue. et Sint. II. 230.
— capillipes Sarg. II. 238.
— — Maxim. II. 238, 1029.
— cappadocicum Gled. II. 1029.
— — sinicum Rehd. II. 1029.
— — tricaudatum Rehd. II. 1029.
— carpinifolium S. et Z. II. 215, 1028.
— catalpifolium Rehd. II. 1029.
— caudatum Wall. II. 199.
— — multiserratum Rehd. II. 199.
— — Pratti Rehd. II. 199.
— — ukurunduense Rehd. II. 200.
— ceriferum Rehd. II. 1028.
— cinerascens Boiss. II. 233.
— — Boissieri Schwer. II. 233.
— — Bornmülleri Schwer. II. 233.
— — — longipes Bornm. II. 233.
— — Paxi Schwer. II. 233.
— circinatum Pursh II. 208.
— circumlobatum Maxim. II. 207.
— — Pseudo-Sieboldianum Pax II. 207.
— cissifolium Koch II. 210, 1028.
— coccineum Mchx. II. 219.
— colchicum Hartw. II. 226.
— commutatum Presl II. 232.
— cordatum Pax II. 214.
Acer coriaceum Tausch II. 202.
— crassipes Pax II. 236.
— crataegifolium S. et Z. II. 216.
— — × rufinerve II. 217.
— — Veitchi Nicb. II. 217.
— creticum L. II. 234.
— — Schm. II. 202.
— — cuneifolium Spach II. 234.
— — rotundifolium Spach II. 233.
— — semiorbiculatum Boiss. II. 233.
— — sublobatum Spach II. 234.
— crispum Lauth II. 228.
— cucullobracteatum Lév. et Vt. II. 1028.
— cultratum Wall. II. 226.
— dasycarpum Ehrh. II. 219.
— — coloratum Wesm. II. 220.
— — cuneatum Pax II. 219.
— — heterophyllum laciniatum Hit. II 220.
— — laciniatum Pax II. 219.
— — — heterophyllum Schwer. II. 220.
— — — Wieri Schwer. II. 219.
— — normale Pax II. 219.
— — pendulum Nich. II. 219.
— — pyramidale Späth II. 219.
— — subtrilobatum Schwer. II. 219.
— — — longifolium Späth II. 219.
— — — pseudoternatum Schwer. II. 219.
— — — tripartitum Schwer. II. 219.
— Davidi Franch. II. 216, 1028.
— dedyle Maxim. II. 200.
— diabolicum Koch II. 241, 1029.
— — purpurascens Rehd. II. 242.
— Diecki Pax II. 227.
— Dippeli Schwer. II. 225.
— discolor Maxim. II. 214.
— dissectum Thbg. II. 207.
— distylum S. et Z. II. 217, 1028.
— divergens Pax II. 223.
— Dobrudschae Pax II. 229.
— Douglasi Hook. II. 223.
— Drummondi Hook. et Arn. II. 219.
— Duretti Pax II. 202.
— erianthum Schwer. II. 204.
— eriocarpum Mchx. II. 220.
— erosum Pax II. 199.
— fallax Pax II. 228.
— Fargesi Rehd. II. 213.
— Fauriei Lév. et Van. II. 221.
— flabellatum Rehd. II. 207.
— floridanum Pax II. 243.
— Francheti Pax II. 240.
— fulvescens Rehd. II. 1028.
— Ginnala Maxim. II. 196.
— — euginnala Pax II. 196.
— — × monspessulanum II. 196.
— — Semenowi Pax II. 196.
— Giraldi Pax II. 206, **1027**.
— glabrum Torr. II. 222.
— — rhodocarpum Schwer. II. 1028.
— — tripartitum Pax II. 223.
— — typicum Schwer. II. 1028.
— granadense Boiss. II. 235.
— grandidentatum Nutt. II. 243.
— griseum Pax II. 211.

Acer Grosseri Pax II. 236.
— Ilayatae Lév. et Van. II. 229.
— Heldreichi Orph. II. 204.
— — eubeldreichi Pax II. 204.
— — macropterum Pax II. 204.
— Henryi Pax II. 210.
— — serratum Pamp. 1028.
— hermoneum Schwer. et Bornm. II.234.
— hispanicum Pourr. II. 235.
— hispidum Schwer. II. 243.
— Hookeri Miqu. II. 215.
— — majus Pax II. 215.
— hybridum Ht. II. 202.
— — Spach II. 202.
— hyrcanum Fisch. et Mey. II. 235.
— — acutilobum Schwer. II. 235.
— — intermedium Schwer. II. 235.
— — Keckianum C. S. II. 235.
— — Reginae-Amaliae Schwer. II. 232.
— — Reygassei Boiss. II. 235.
— — tauricolum Boiss. II. 235.
— ibericum M. B. II. 231.
— insulare Mak. II. 1029.
— insigne B. et B. II. 203.
— — glabrescens Boiss. et B. II. 203.
— — — Wolli C. S. II. 203.
— — Van Volxemi Pax II. 205
— — velutinum B. et B. II. 203.
— — Wolli Schwer. II. 203.
— intermedium Panč. II. 235.
— isolobum Kurz II. 196.
— italum Lauth II. 236.
— — hispanicum Pax II. 235
— — hyrcanum Pax II. 235.
— — — Keckianum Asch. et Sint. II 235.
— — — intermedium Pax II. 235.
— — — Reginae-Amaliae Pax II. 232.
— — — serbicum Pax II. 235.
— — granatense Willk. II. 235.
— — × pseudoplatanus II. 202.
— japonicum Thbg. II. 209, 1028.
— — Parsoni Veitch II. 209.
— — Sieboldianum Fr. et Sav. II. 209
— laetum C. A. Mey. II. 226, 1029.
— — colchicum Schwer. II. 226.
— — — horticola Pax II. 226.
— — — rubrum Schwer. II. 226.
— — — viride Ilesse II. 226.
— — cultratum Pax II. 226.
— — indicum Schwer. II. 226.
— — parviflorum Rgl. II. 1028.
— — × platanoides II. 227.
— — Regelii Pax II. 1028.
— — tomentosulum Rehd. II. 226, 1028
— — tricaudatum Rehd. II. 226.
— laevigatum Wall. II. 213.
— — reticulatum Rehd. II. 213.
— lanceolatum Moll. II. 213.
— lasicum Schwer. II. 223.
— lasiocarpum Lév. et Van. II. 200.
— laurilolium Don II. 1028.
— laxiflorum Pax II. 215.
— — longilobum Rehd. II. 1028.
— leiocarpum Opiz II. 230.
— leucoderme Small II. 243.
Acer lobatum Ht. II. 202.
— Lobeli Ten. 227.
— — laetum colchicum Pax II. 226.
— — — — horticola Pax II. 226.
— — — indicum Pax II. 226.
— longipes Rehd. II. 223.
— — tientaiense C. S. II. 224, 1029.
— — typicum C. S II. 224.
— macrophyllum Pursh II. 201.
— macropterum Vis. II. 204.
— mandschuricum Maxim. II. 213.
— marsicum Guss. II. 230.
— Martini Jord. II. 235.
— Maximowiczi Pax II. 239.
— Maximowiczianum Miqu. II. 212.
— Mayri Schwer. II. 225.
— mexicanum Pax II. 222.
— micranthum S. et Z. II. 239, 1029.
— Miyabei Maxim. II. 229.
— molle Pax II. 196.
— Mono Maxim. II. 225.
— monspessulanum L. II. 231.
— — athoum Bornm. et Sint. II. 231.
— — commutatum Borb. II. 232.
— — cruciatum Pax II. 232.
— — dentatum Schwer. II. 231.
— — — ibericum Schwer. II. 231.
— — — liburnicum Schwer. II. 231.
— — genuinum Pax II. 231.
— — — liburnicum Pax II. 231.
— — ibericum Pax II. 231.
— — illyricum Tausch II. 232.
— — × obtusatum II. 232.
— — × Opalus II. 232.
— — × pseudoplatanus II. 202.
— — Reginae-Amaliae Wesm. II. 232.
— — rumelicum Grisb. II. 232.
— montanum Ait. II. 1027.
— multiserratum Max. II. 199.
— neapolitanum Ten. II. 236.
— neglectum Lge. II. 227.
— — zoeschense Schwer. II. 227.
— Negundo L. II. 220.
— — californicum Wesm. II. 222.
— — odessanum Rothe II. 221.
— — tomentosum Schwer. II. 221.
— — — odessanum C. S. II. 221.
— — vulgare Pax II. 220.
— — — californicum Pax II. 220.
— — — nudum Schwer. II. 220.
— — — pseudocalifornicum Schwer. II. 220.
— — — rubilolium Pax et Schwer. II. 221.
— — — — giganteum Schwer. II. 221.
— — — violaceum Schwer. II. 221.
— nigrum Mchx. II. 243.
— nikoense Max. II. 211.
— — griseum Fr. II. 211.
— — melagocarpum Rehd. II. 1028
— niveum Bl. II. 213.
— oblongum Wall. II. 214.
— obtusatum W. et K. II. 236, 1029.
— — euobtusatum Pax II. 236.
— — — africanum Pax II. 236.
— — neapolitanum Pax II. 236.

Acer obtusatum × pennsylvanicum II. 236.
— — × pseudoplatanus II. 202.
— obtusifolium Sibth. et Sm. II. 234.
— Oliverianum Pax II. 206.
— — serrulatum Rehd. II. 1027.
— opalifolium Vill. II. 236.
— Opalus Mill. II. 235.
— — × pseudoplatanus II. 202.
— orientale L. II. 233, 1029.
— — cuneifolium Pax II. 234.
— — nanum C. S. II. 234, 1029.
— — obtusilolium Pax II. 234.
— — ovale Pax II. 234.
— — rotundilolium Pax II. 233.
— — sempervirens Pax II. 234.
— palmatum Lév. et Van. II. 238.
— — Thbg. II. 207, 1028.
— — atropurpureum Van Houtte II. 207.
— — dissectum Schwer. II. 207.
— — — rubellum Pax II. 207.
— — linearilobum S. et Z. II. 207.
— — — lineare Schwer. II. 207.
— — sessilifolium Max. II. 207.
— — Thunbergi Pax II. 207.
— — — eupalmatum Schwer. II. 207.
— — — — atropurpureum C. S. II. 207.
— — — — normale Schwer. II. 207.
— — — septemlobum Schwer. II. 207.
— — — — euseptemlobum Schw. II. 207.
— — — — Ilessei Schwer. II. 207.
— palmilolium Borkh. II. 243.
— Papilio King II. 199.
— parviflorum Fr. et Sav. II. 236, 1029.
— Pavolini Pamp. II. 1028.
— Paxi Franch. II. 198.
— — ningpoense Pax II. 198.
— pectinatum Wall. II. 236.
— pellucido-bracteatum Lév. et Van. II. 238.
— pennsylvanicum L. II. 237.
— — erythrocladum Späth II. 237.
— pentapomicum Stew. II. 196.
— Peronai Schwer. II. 232.
— pictum Thbg. II. 225, 1028.
— — ambiguum Pax II. 225.
— — eupictum Pax II. 225.
— — mono Pax II. 225.
— — parviflorum C. S. II. 225, 1028.
— — Paxi Schwer. II. 225.
— — tomentosulum C. S. II. 226.
— pilosum Max. II. 240.
— platanoides L. II. 228.
— — coloratum Pax II. 228.
— — — rubrum Pax II. 228.
— — — — Reitenbachi Schwer. II. 228
— — — — Schwedleri Schwer. II. 228.
— — columnare Carr. II. 228.
— — crispum Spach II. 228.
— — — cuneatum Pax II. 228.
— — — — argutum Schwer. II. 228.
— — dissectum Jacqu. II. 228.
— — Drummondi Schwer. II. 1029.
— — globosum Nich. II. 228.
— — hederilolium Schw. II. 229.
Acer platanoides hederifolium integri. lobum Schwer. II. 229.
— — — Stolli Späth II. 229.
— — heterophyllum Nich. II. 229.
— — — dilaceratum Dieck II. 229.
— — — irregulare Schwer. II. 229.
— — integrilobum Zab. II. 227, 229.
— — Lobeli Parl. II. 227.
— — palmatifidum Tausch II. 228.
— — — dissectum Schwer. II. 228.
— — Reitenbachi Nich. II. 228.
— — rubrum Herd. II. 228.
— — sanguineum Schwer. II. 1029.
— — Schwedleri Nich. II. 228.
— — typicum Pax II. 228.
— — — maculatum Schwer. II. 228.
— — — pratinum Schwer. II. 228.
— — — rubellum Schwer. II. 228.
— — — — acuminatum Schwer. II. 228.
— — — — columnare Schwer. II. 228.
— — — rufum Schwer. II. 228.
— — — — globosum Schwer. II. 228.
— polymorphum S. et Z. II. 207.
— — Spach II. 202.
— pseudoplatanus L. II. 201.
— — coloratum lutescens Albertsi Schwer. II. 202.
— — — — Worléei Rosent. II. 202.
— — erythrocarpum Carr. II. 202.
— — pyramidale Nich. II. 202.
— — typicum Pax II. 201.
— — — crispum Schwer. II. 202.
— — — quinquelobum Schwer. II. 201.
— — — — clausum Schwer. II. 202.
— — — — erythrocarpum Pax II. 202.
— — — — purpurascens Pax II. 202.
— — — — pyramidale C. S. II. 201.
— — — — Worléei Pax II. 202.
— — — subtrilobum Schwer. II. 202.
— — — — Albertsi Pax II. 202.
— — — — cruciatum Schwer. II. 202.
— — — — serratum Schwer. II. 202.
— — — ternatum Schwer. II. 202.
— — — triangulare Schwer. II. 202.
— — — — argutum Schwer. II. 202.
— — villosum Parl. II. 202.
— Pseudo-Sieboldianum Kom. II. 207.
— pubescens Franch. II. 229.
— pubinerve Rehd. II. 1027.
— purpurascens Fr. et Sav. II. 242.
— pusillum Schwerin II. 196.
— quinquelobum Gilib. II. 201.
— — K. Koch II. 223.
— ramosum Schwer. II. 203.
— Regeli Pax II. 229.
— Reginae-Amaliae Orph. II. 232.
— reticulatum Champ. II. 213.
— robustum Pax II. 206.
— rotundilobum Schwer. II. 232.
— rubrum L. II. 218.
— — Drummondi Sarg. II. 219.
— — normale Schwer. II. 218.
— — — coccineum Kirchn. II 219.
— — — columnare Rehd. II. 218.
— — — globosum Rehd. II. 218.

Acer rubrum normale magnificum Schwer. II. 1028.
— — — pendulum Schwer. II. 218.
— — — Schlesingeri Sarg. II. 218.
— — — semiorbiculatum Schwer. II 218.
— — — Wageri Pax II. 219.
— — pendulum Kirchn. II. 219.
— — sanguineum Lav. II. 219.
— — semiorbiculatum Wesm. II. 218.
— — tomentosum Kirchn. II 219.
— — tridens Wood. II. 219.
— Rugeli Pax II. 243.
— rulinerve S. et Z. II. 237.
— saccharinum L. II. 219.
— — Wangh. II. 243.
— — coloratum Pax II. 220.
— — floridanum Chapm. II. 243.
— — laciniatum Pax II. 219.
— — — heterophyllum Pax II. 220.
— — — Wieri Pax II. 219.
— — normale Pax II, 219.
— — — pyramidale Pax II. 219.
— — subtrilobatum Pax II. 219.
— — — cuneatum Pax II. 219.
— — — pendulum Pax II. 219.
— — — pseudoternatum Pax II. 219.
— — — tripartitum Pax II. 219.
— saccharum Marsh. II. 243.
— — barbatum Trel. II. 243.
— — floridanum Ludw. II. 243.
— — leucoderme Sarg. II. 243.
— — nigrum Britt. II. 243.
— — Rugeli Rehd. II. 243.
— sanguineum Spach II. 219.
— Schoenermarkiae Pax II. 241.
— Schwerini Pax II. 214.
— Semenowi Rgl. et Herd. II. 196.
— semiorbiculatum Pax II. 218.
— sempervirens L. II. 233.
— — cuneifolium Tausch II. 234.
— — nannm Tausch II. 234.
— — obtusilolium Tausch II. 234.
— septemlobum Thbg. II. 207.
— sericeum Schwer. II. 202.
— sessilifolium S. et Z. II. 207.
— — Shirasawanum Koidz. II. 1028.
— Sieboldianum Miqu. II. 209, 1027.
— — mandschuricum Max. II. 207.
— sikkimense Miqu. II. 217.
— — serrulatum Pax II. 217.
— — subintegrum Schwer. II. 217.
— sinense Pax II. 205.
— spicatum Lam. II. 199.
— — laciniatum Jouin II. 1027.
— — ukurunduense Max. II. 200.
— stachyophyllum Hiern II. 245.
— stereuliaceum Koch II. 244.
— — Wall. II. 240.
— striatum Dur. II. 237.
— sutchuense Franch. II. 212, 1028.
— syriacum Boiss. et Gaill. II. 234.
— — cyprium Boiss. II. 234.
— — hermoneum Bornm. II. 234.
— tataricum L. II. 196.
— — acuminatum Franch. II. 196.
Acer tataricum aidznense Franch. II. 196.
— — genuinum Racib. II. 197.
— — — torminaloides Pax II. 197.
— — Ginnala Maxim. II. 196.
— — hebecarpum Schwer. II. 197.
— — × monspessulanum II. 197.
— — × pennsylvanicum II. 197.
— — Slendzinski Racib. II. 197
— tegmentosum Maxim. II. 238.
— tenellum Pax II. 229.
— tetramerum Pax II. 245.
— — betulilolium Rehd. II. 1029.
— — — latialatum Rehd. II. 1029
— — elobulatum Rebd. II. 1029.
— — — longeracemosum Rehd. II 1029.
— — tiliifolium Rehd. II. 1029.
— Thomsoni Miqu. II. 241.
— tomentosum Desf. II. 219.
— Torreyi Greene II. 223.
— Trautvetteri Medw. II. 204.
— trifidum Hook. et Arn. II. 197.
— — integrifolium Mak. II. 1027.
— — ningpoense Hance II. 198.
— — — integrifolium Koidz. II. 1027.
— — typicum C. S. II. 198.
— triflorum Komar. II. 212.
— trilobatum Ht. II. 202.
— — Lam. II. 232.
— trinerve Dipp. II. 198.
— tripartitum Nutt. II. 223.
— truncatum Bunge II. 224.
— Tschonoskii Maxim. II. 238, 1029.
— turcestanicum Pax II. 223.
— ukurunduense Trautv. et Mey. II. 199.
— — multiserratum C. S. II. 199.
— urophyllum Maxim. II. 239.
— Van Volxemi Mast. II. 203.
— Veitchi Schwer. II. 217.
— velutinum Hort. II. 204.
— villosum Presl II. 202.
— — Wall. II. 240.
— violaceum Ht. II. 221.
— Wageneri Hort. II. 218.
— Wilsonii Rehd. II. 204.
— — serrulatum Dunn II. 1027.
— zoeschense Pax II. 227.
Aeldoton P. Browne II. 134.
Actinidia Ldl. II. 323, 1034.
— arguta Miqu. II. 326.
— callosa Ldl. II. 324.
— — coriacea Fin. et Gag. II. 324
— — formosana Fin. et Gag. II. 324.
— — Henryi Maxim. II. 324, 1034
— — pilosula Fin. et Gag. II. 324
— chinensis Planch. II. 323.
— curvidens Dunn II. 1034
— fulvicoma Hance II. 323.
— — hirsuta Fin. et Gag. II. 323.
— Giraldii Diels II. 327.
— Henryi Dunn II. 1034.
— holotricha Fin. et Gagn. II. 324
— Kolomikta Maxim. II. 327.
— lanata Hemsl. II. 324.
— melanandra Franch. II. 326.
— platyphylla Gray II. 327.
— polygama Ht. II. 327.

Actinidia polygama Miqu. II. 327, 1034.
— rubricaulis Dunn II. 1035.
— rufa Miqu. II. 327.
— strigosa Hook. II. 324.
— tetramera Maxim. II. 327.
— trichogyna Franch. II. 324.
— volubilis Ht. II. 327.
— — Miqu. II. 327.
Adelia P. Br. II. 792.
— acuminata Mchx. II. 792.
— ligustrina Mchx. II. 792.
— neomexicana O. Ktze. II. 792.
— parvifolia Cov. II. 792.
Adenocarpus DC. II. 22.
— complicatus Gay II. 22, 1009.
— decorticans Boiss. II. 22.
Adenostoma Hk. et A. 533.
— brevifolia Nutt. 533.
— fasciculata Hk. et A. 533.
— — brevifolia T. et Gr. 533.
— — hirsuta C. S. 533.
— — obtusifolium Wats. 533.
— — typica C. S. 533.
— — — brevifolia C. S. 533.
Adnaria Raf. II. 546.
— brachycera O. Ktze. II. 547.
Adodendrum (Adodendron) Neck. II. 514.
— chamaecistus O. Ktze. II. 515.
Aegle sepiaria DC. II. 129.
Aesculus L. II. 246.
— arguta Buckl. II. 250.
— austrina Small II. 253.
— — × glabra II. 251.
— balgiana Andr. II. 247.
— Bushii C. S. II. 251.
— californica Nutt. II. 249.
— carnea Hayne II. 247.
— — Wats. II. 247.
— — × Hippocastanum II. 247.
— chinensis Bge. II. 249.
— — Hort. II. 246.
— discolor Pursh II. 252.
— — × octandra II. 252.
— flava Ait. II. 252.
— — purpurascens Gray II 252.
— glabra Willd. II 250.
— — arguta Rob. II. 250.
— — Buckleyi Sarg. II. 250/1.
— — marylandica Dipp. II. 251.
— — × octandra II. 251.
— Hippocastanum L. II. 246.
— — asplenifolia Ilt. II. 247.
— — Baumanni C. S. II. 247.
— — digitata Ht. II. 247.
— — dissecta Ilt. II. 247.
— — flore pleno Lemaire II. 247.
— — Henkeli Henk. II. 246.
— — heterophylla Ilt. II. 247.
— — incisa Dipp. II. 246.
— — laciniata Dipp. II. 247.
— — Memmingeri Rehd. II. 247.
— — × Pavia II. 247.
— — pumila Dipp. II. 247.
— — pyramidalis S.-Louis II. 247.
— — Schirnboferi Voss II. 247.
— — umbraculifera Rehd. II. 247.
Aesculus Hippoc. variegata Loud. II. 247.
— humilis Lodd. II. 252.
— hybrida DC. II. 252.
— indica Hook. II. 248.
— intermedia Andr. II. 247.
— japonica Ilt. II. 246.
— lutea Wangh. II. 252.
— — discolor Dipp. II. 252.
— macrostachya Mchx. II. 253.
— marylandica Booth II. 251.
— neglecta Ldl. II. 252.
— octandra Marsh. II. 252.
— — discolor Rehd. II. 252.
— — hybrida Sarg. II. 252.
— — marylandica Koeb. II. 251.
— — × Pavia II. 252.
— — purpurascens C. S. II. 250.
— ohioensis DC. II. 251.
— pallida Willd. II. 251.
— Parryi Gray II. 249.
— parviflora Walt. II. 253.
— Pavia L. II. 252.
— — arguta Ldl. II. 252.
— — atrosanguinea Rehd. II. 252.
— — carnea Rehd. II. 252.
— — humilis Voss II. 252.
— — nana Dipp. II. 252.
— — pendula Rehd. II. 252.
— — Whitleyi Rehd. II. 252.
— plantièrensis Andr. II. 247.
— rubicunda Loisel. II. 247.
— turbinata Bl. II. 246.
— versicolor Dipp. II. 252.
Aethionema R. Br. 357.
— cordatum Boiss. II. 928.
— grandiflorum B. et Hoh. 357.
— Moricandianum Boiss. II. 928.
Agave L. II. 867.
— americana L. II. 867.
— europaea Vis. II. 868.
— Parryi Engm. II. 868.
— ramosa Mnch. II. 868.
Ageratum arbutifolium K. II. 754.
Agnus-castus incisa Carr. II. 594.
— — multifida Carr. II. 594.
— robusta Carr. II. 594.
— vulgaris Carr. II. 594.
— — alba Carr. II. 594.
— — diversifolia Carr. II. 594.
Allanthus Desf. II. 130, 1019.
— erythrocarpa Carr. II. 130.
— Giraldii Dode II. 1019.
— glandulosa Desf. II. 130.
— — erythrocarpa Rehd. II. 130.
— — pendulifolia Carr. II. 130.
— — spinosa Bois II. 131.
— japonica Hort. II. 130.
— rubra Hort. II. 130.
— sutchuenensis Dode II. 1019.
— Vilmoriniana Dode II. 130.
Akebia Decne. 296.
— lobata Decne. 296.
— quinata Decne. 296.
Alangium platanifolium Harms II. 433.
Alaternus angustifolia Mill. II. 1032.
— latifolia Mill. II. 1032.

Albizzia Duraz. II. 3.
— Julibrissin Duraz. II. 3.
Alhagi Desv. II. 105.
— camelorum Fisch. II. 105.
Alnaster fruticosus Ledeb. 121.
— viridis Spach 121.
Alnus Gaertn. 119, II. 887.
— acuminata Kunth 132.
— — Spachii Rgl. 132.
— Alnobetula Hart. 120.
— — brembana Call. 121.
— — corylifolia Call. 121.
— — genuina Rgl. 121.
— — graudifolia Call. 121.
— — laciniata Call. 121.
— — micropbylla Call. 121.
— — mollis Call. 121.
— — repens Call. 121.
— — — Wkl. II. 887.
— — stenophylla Wkl. II. 888.
— — typica Beck 121.
— ambigua Beck 130.
— Aschersoniana Call. 132.
— — fallax Call. 132.
— — pommeranica Call. II. 891.
— — vulgaris Call. 132.
— autumualis Hart. 132.
— — × incana 132.
— barbata subincana Simonk. 130.
— Beckii Call. 130.
— brembana Rota 121, II. 887.
— castaneaefolia Mirb. 132.
— cordata Desf. 125.
— — genuina Rgl. 125.
— — × glutinosa 125.
— — rotuudifolia Rgl. 125.
— — villosa Rgl. 125 II. 889.
— cordifolia Ten. 125.
— — subcordata Rgl. 125.
— — villosa Rgl. II. 889.
— corylifolia Keru. 121.
— cremastogyne Burk. 120, II. 891.
— crispa Pursh 122.
— denticulata C. A. M. 129.
— — barbata Call. 129.
— Dieckii Call. 125.
— elliptica Req. 125.
— fallacina Call. II. 890.
— ferruginea Kunth 132.
— Fiekii silesiaca Call. 130.
— firma S. et Z. 123.
— — multinervis Rgl. 123.
— fruticosa Rupr. 121.
— — mandscburica Call. 121.
— — — grandifolia Call. II. 888.
— — — normalis Call. II. 888.
— — typica Call. 121.
— — — macrophylla Call. II. 888.
— — — vulgaris Call. II. 888.
— glutinosa Gaertn. 128, II. 890.
— — Birkiana Ilt. 129.
— — cylindrostachya Wkl. II. 890.
— — denticulata Ledeb. 129.
— — imberbis Bornm. 129.
— — × incana 130.
— — japonica Mats. II.
Alnus glutinosa pyramidalis Dipp. 129.
— — × rugosa 130.
— — × subcordata 125.
— — vulgaris Spach 129.
— — — imberbis Call. 129.
— — — imperialis Kirchn. 129.
— — — incisa W. 129.
— — — laciuiata W. 129.
— — — parvifolia O. Ktze. 129.
— — — puberula Call. 129.
— — — quercifolia Call. 129.
— — — rubrinervia Dipp. 129.
— — — sorbifolia Dipp. 129.
— — — typica Call. 129.
— — — variegata Call. 129.
— Harinoki Sieb. 123, 126.
— hirsuta Turcz. 133.
— — Cajanderi Call. 133.
— — vulgaris Call. 133.
— — — glabrescens Call. 133.
— hybrida Br. II. 891.
— — Neum. 130.
— — intermedia Call. 804.
— — pubescens Call. 804.
— — subincana Call. 804, II. 891.
— — viridior Call. II. 991.
— incana Mnch. 134, II. 891.
— — acuminata Rgl. 135.
— — arcuata Tkerm. 136.
— — argentata Norrl. 135.
— — — acutiloba Call. 135.
— — — pinnatipartita Norrl. 135.
— — — typica Call. 135.
— — aureo-variegata Ht. 136.
— — borealis Norrl. 136.
— — — glabra Call. 136.
— — emarginata Mats. II. 891.
— — glauca Auct. 135.
— — — Shiras. 134.
— — glaucophylla Call. 135.
— — — coccinea Call. 135.
— — — monstrosa Cal. 135.
— — hirsuta Spach 134.
— — hypochlora Call. 135.
— — — Bolleana Schwerin 135.
— — hirsuta Ilt. 134.
— — iucisa Dipp. 136.
— — laciniata Schelle 136
— — lobulata Call. 136.
— — monstrosa Dipp. 135.
— — orbicularis Call. 136.
— — parvifolia Ht. 136.
— — — Rgl. 136.
— — pendula nova Ht. 135.
— — pinuata Call. 136, 804.
— — pinnatifida Dipp. 135.
— — — Rchb. 136.
— — — Wahbg. 136, 804.
— — — vulgaris Rgl. 136.
— — × rugosa 132.
— — sibirica Ilt. 134.
— — — Ledeb. 133.
— — × subcordata 125.
— — subrotunda Call. 135.
— — tomentosa Dipp. 135.
— — virescens Wahlbg. 136.

Alnus incana virescens Wats. 133.
— — vulgaris Spach 135.
— — — acuminata Call. 135.
— — — aurea Call. 135.
— — — dubia Call. 135.
— — — pendula Call. 135.
— — — typica Call. 135.
— — — variegata Call. 135.
— japonica S. et Z. 126.
— — arguta Call. II. 890.
— — formosana Call. II. 890.
— — genuina Call. II. 890.
— — × incana 126.
— — koreana Call. II. 890.
— — minor Miq. II. 890.
— — × subcordata II. 890.
— jorullensis Kunth 132.
— Koehnei Call. 125.
— — plurinervis Call. 125.
— — typica Call. 125.
— maritima Mühlenbg. 126.
— — arguta Rgl. II. 890.
— — formosana Burk. II. 890.
— — japonica Rgl. 126.
— — obtusata Fr. et S. II. 890.
— Matsumurae Call. II. 891.
— Maximowiczii Call. 122.
— — parvifolia Call. II. 888.
— — typica Call. II. 888.
— Mayri Call. 126.
— microphylla Arv. Touv. 121.
— Mirbelii Spach 132.
— Mitchelliana Curt. II. 888.
— multinervis Call. 123.
— — nikkoënsis Call. 123.
— — typica Call. 123.
— nepalensis Don 120, II. **889.**
— nitida Endl. 119, II. **889.**
— oblongata Rgl. 126.
— oblongifolia Torr 132. II. **890.**
— oregona Nutt. 132.
— oxyacanthaefolia Lodd. 129.
— occidentalis Dipp 133.
— orientalis Decne. 124, II. **889.**
— — pubescens Dipp. 125.
— pendula Matsum. 123, 804.
— pubescens Hartm. 136.
— — Tausch 130.
— — pinnatifida Koch. 135.
— Purpusi Call. 132.
— repens Wormsk. 121.
— rhombifolia Nutt. 127.
— rotundifolia Bert. 125.
— — Mill. II. 890.
— rubra Bong. 132, 804.
— rugosa Sprgl. 131.
— — × serrulata II. 890.
— — × tenuifolia 132.
— Schneideri Call. II. 890.
— serrulata W. 127.
— — genuina Rgl. 127
— serrulatoides Call. II. 890.
— sibirica Fisch. 133.
— — oxyloba Call. II. 890.
— — paucinervia Call. II. 890.
— — typica Call. II. 890.
Alnus Sieboldiana Matsum. 123.
— silesiaca Fiek 130.
— — macrocarpa Call. II. 891.
— — vulgaris Call. II. 891.
— sinuata Rydbg. 123 804.
— — kamtschatica Call. II. 888.
— — stenophylla Call. II. 888.
— — typica Call. II. 888.
— sitchensis Sarg. 122.
— — kamtschatica Call. 123.
— — typica Call. 123.
— Spachii Call. 132.
— Spaethii Call. II. 890.
— spectabilis Call. 126.
— spuria Call. 130, 804.
— — ambigua Call. 130, 804.
— — Beckii ambigua viridior Call. II. 891.
— — Figerti Call. 130.
— — hybrida A. Br. 130, 804.
— — intermedia Call. 130, 804.
— — Tauschiana Call. 130, 804.
— — — badensis Lang 130.
— snaveolens Requien 121.
— subcordata C. A. M. 125.
— — cerasifolia Bornm II. 889.
— — typica Call. II. 889.
— — villosa Wkl. II. 889.
— tenuifolia Nutt. 133.
— — Dippelii Koch. 133.
— — occidentalis Call 133.
— — Purpusi Koch. 133.
— — virescens Call. 133.
— — viridescens Koch. 133, 804.
— tinctoria Sarg. 134
— — glabra Call. II. 891.
— — mandschurica Call. II. 891.
— — obtusilobs Call. II. 891.
— — typica Call. II. 891.
— tomentosa Ht 125.
— viridis Lam. et DC. 121, II. **887.**
— — cordifolia Zap. II. 887.
— — Foucaudii Briq. II. 887.
— — microphylla Call. II. 887.
— — — hirtella Call. II 887.
— — — typica Call. II. 887.
— — minor Parl. II. 888.
— — pumila Ces. II. 887.
— — — pilosa Call. II. 888.
— — — typica Call. II. 888.
— — repens Call. II. 887.
— — — macrophylla Call. II. 887.
— — — pubescens Call. II. 887.
— — — typica Call. II 887.
— — sibirica Rgl 121, 122.
— — — sitchensis Rgl. 123.
— — sinuata Rgl. 123.
— — stenophylla Winkl. 123
— — subvestita Zap. II. 887.
— — typica Call. II. 887.
— — — grandifolia Call. II. 887.
— — — — glabra Call. II. 887.
— — — — hirta Call. II. 887.
— — — mollis Call. II. 897.
— — — subvestita Call. II. 887
— — — vulgaris Call. II. 887.
— vulgaris Hill II. 890.

Alnus Yasha Matsum. 123.
— — marcocarpa Call. II. 889.
— — microcarpa Call. II. 889.
— — typica Call. II. 889.
Aloe yuccaefolia Gr. II. 859.
Alsenosmia Cunn. II. 632.
Althaea frutex Ht. II. 1038.
Alyssum L. 358, II. 928.
— argenteum Vitm. 359.
— medium Host 359.
— montanum L. 359.
— repens Baumg. 359.
— saxatile L. 359.
— spinosum L. II. 928.
— utriculatum L. 359.
Amelanchier Med. 731, II. 1001.
— alnifolia Auct. 735.
— — Nutt. 738.
— — elliptica Nels. 739.
— — florida C. S. 739.
— — pumila C. S. 739.
— — typica C. S. 739.
— asiatica Endl. 736.
— — × rotundifolia 732.
— — sinica C. S. 736.
— — typica C. S. 736.
— Bakeri Greene 742.
— Botryapium Borkh. 734.
— canadensis Med. 734.
— — alnifolia T. et Gr. 740.
— — asiatica Koidz. II. 1001.
— — Botryapium T. et Gr. 734
— — oblongifolia T. et Gr. 734.
— — obovalis Sarg. 734
— — oligocarpa T. et Gr. 737
— — pumila Nutt. 739.
— — × rotundifolia 732.
— — Scharnkeana Graeb. 734.
— — spicata Sarg. 738.
— — tomentula Sarg. 734
— crenata Greene 742.
— cretica DC. 733.
— — chelmea Hal. 733.
— — typica Hal. 733.
— cuneata Pip. 739.
— Cusicki Fern. 735.
— denticulata Koch. 743.
— — nervosa C. S. 744.
— elliptica Nels. 739.
— florida Ldl. 739.
— Gurmani Greene 739.
— glabra Greene 735.
— gracilis Hell. 735.
— integrifolia B. et H. 733.
— intermedia Spach 734.
— mormonica C. S. 740.
— nervosa Koch. 744.
— obovalis Ashe 734.
— oligocarpa Roem. 737.
— oreophila Nels. 740.
— ovalis Borkh. 738.
— — Med. 732.
— oxyodon Koch. 739.
— pallida Greene 742.
— parviflora Boiss. 733
— — pisidica Boiss. 733.
Amelanchier pisidica Boiss. 733.
— polycarpa Greene 735.
— Pringlei Koch. 742.
— prunifolia Greene 740
— — psilantha C. S. 743.
— racemosa Ldl. 494.
— rotundifolia Dum.-Cours. 731.
— — Roem. 737.
— — acutifolia Rouy et Ca. 732.
— — genuina R. et Ca. 732.
— — grandifolia R. et Ca. 732.
— — tomentella R. et Ca. 732.
— rubescens Greene 740.
— — cinerea Good. 742.
— sanguinea Ldl. 757.
— siskiyouensis C. S. 735.
— spicata Britt. 737.
— — Decne. 734.
— — Koch. 737.
— subintegra Greene 742.
— suborbicularis Borkh. 733.
— ulmifolia Greene 739.
— utahensis Koch. 747.
— venulosa Greene 741.
— vulgaris Moench 732.
— — integrifolia Boiss. 733.
Ammodendron Fisch. II. 20.
— Conollyi Bge. II. 20.
— — longisiliquum Litw. II. 20.
Ammyrsine Pursh II. 512.
Amorpha L. II. 68.
— angustifolia Boynt. II. 72.
— californica Hook. et Arn. II. 71.
— — Nutt. II. 71.
— canescens Nutt.' II. 70.
— — glabrata Gray II. 70.
— — glabrescens Zabel II. 70.
— — leptostachya Engelm. II. 70.
— — typica C. S. II. 70.
— caroliniana Croom II. 72.
— croceolanata Watson II. 73.
— cyanostachya Curtis II. 72.
— elata Hayne II. 73.
— fruticosa Hayne II. 73.
— — L. II. 72.
— — angustifolia Pursh II. 72.
— — crispa Kirchn. II. 72.
— — croceolanata C. S. II. 73.
— — humilis C. S. II. 73.
— — pendula Dipp. II. 73.
— — subglabra Gray II. 72, 74.
— — typica C. S. II. 72.
— — — crispa C. S. II. 72.
— — — pendula C. S. II. 73.
— glabra Boynt. II. 72.
— — Desf. II. 72.
— — Poir. II. 71.
— herbacea Walt. II. 69.
— — Boyntoni C. S. II. 69.
— — typica C. S. II. 69.
— hispidula Greene II. 71
— humilis Tausch II. 73.
— laevigata Boynt. II. 74.
— — Nutt. II. 74.
— — pubescens Gray II. 74.
— — — mollis C. S. II. 74.

Amorpha laevigata typica C. S. II. 74.
— Lewisi Ht. II. 72.
— microphylla Pursh II. 70.
— montana Boynt. II. 72.
— nana Nutt. II. 70, 73.
— nitens Boynt. II. 74.
— nonperforata Schkuhr II. 73.
— paniculata Torr. et Gray II. 74.
— pendula Carr. II. 73.
— perforata Schkuhr II. 73.
— pubescens Schlecht. II. 73.
— — Willd. II. 70.
— pumila Mchx. II. 70.
— Rabiae Llave et Lex II. 68.
— Roemeriana Scheele II. 74.
— Schwerini C. S. II. 71.
— subglabra Heller II. 74.
— tennessensis Shuttl. II. 72.
— texana Buckley II. 74.
— — mollis Boynt. II. 74.
— virgata Small II. 74.
Ampelocissus Planch. II. 300, 1032.
Ampelopsis Mchx. II. 300, 318, 1032, 1034.
— aconitifolia Bge. II. 321.
— — cuneata G. et D. II. 321.
— — dissecta Koeh. II. 321.
— — glabra Diels et Gilg II. 321.
— — setulosa Diels et Gilg II. 321.
— — tomentella Diels et Gilg II. 321.
— aegyrophylla Planch. II. 318.
— arborea Koehne II. 321.
— bipinnata Mchx. II. 322.
— brevipedunculata Koeh. II. 319.
— cantoniensis Ht. II. 323
— — Planch. II. 323, 1032.
— citrulloides Ht. II. 320.
— cordata Mchx. II. 318.
— cordifolia Raf. II. 318.
— Delavayana Diels et Gilg II. 320.
— — Planch. II. 320.
— dissecta Carr. II. 321.
— gilgitensis Koeh. II. 318.
— Graebneri Bolle II. 317.
— — Ht. II. 317.
— hederacea DC. II. 317.
— — dumetorum Focke II. 315.
— — hirsuta Jaeg. II. 317.
— — murorum Focke II. 317.
— heptaphylla Buckl. II. 316.
— heterophylla S. et Z. II. 320.
— — amurensis Planch. II. 319.
— — citrulloides Ht. II. 320.
— — elegans Rgl. II. 320.
— himalayana Royl. II. 314.
— hirsuta Roem. et Schult. II. 317.
— Hoggi Ht. II. 1021.
— humulifolia Bge. II. 320.
— hylopus Desm. II. 317.
— japonica C. S. II. 320.
— — Ilt. II. 315.
— latifolia Tausch II. 317.
— leeoides Planch. II. 323.
— Lowii Ht. II. 1033.
— macrophylla Ilt. II. 315.
— major Ilt. II. 315.
Ampelopsis megalophylla Diels et Gilg II. 322.
— mirabilis Diels et Gilg II. 320.
— muralis Leng. II. 317.
— napaeformis Carr. II. 320.
— orientalis Planch. II. 321.
— pubescens Schlecht. II. 317.
— quinquefolia Michx. II. 317.
— — angustifolia Dipp. II. 317.
— — cirrhata Jaeg. et Beissn. II. 317.
— — Engelmanni Rehd. II. 317.
— — Graebneri Rehd. II. 317.
— — heptaphylla Bail. II. 316.
— — laciniata Dipp. II. 315.
— — latifolia Dipp. II. 315.
— — murorum Rehd. II. 317.
— — pubescens Bail. II. 317.
— — radicantissima Rehd. II. 317.
— — vitacea Knerr II. 316.
— radicantissima Schelle II. 317.
— Roylei Kirchn. II. 315.
— rubricaulis Carr. II. 321.
— sempervirens Ht. II. 300.
— serjaniaefolia Bge. II. 320.
— striata Ht. II. 300.
— tricuspidata Sieb. et Zucc. II. 315.
— tuberosa Carr. II. 320.
— Veitchi Ht. II. 315.
— vitifolia Planch. II. 318.
Ampelovitis Davidi Carr. II. 302.
— Romaneti Ht. II. 1033.
Amphicome Royle II. 621, 1053.
— arguta Ldl. II. 1053.
Amphirapis albescens DC. II. 757.
Amygdalopsis Lindleyi Carr. 595.
— virgata Ht. 595.
Amygdalus L. 589, II. 973.
— agrestis Boiss. 590.
— amara Hayne 593.
— Andersoni Greene 597.
— arabica Oliv. 590.
— argentea Lam. 591.
— Balansae Boiss. 592.
— Besseriana Schott 599.
— Boissieri Carr. 597.
— communis L. 593.
— — albopiena Zbl. 593.
— — amara DC. 593.
— — amygdalopersica Spach 593.
— — compacta Zbl. 593.
— — dulcis DC. 593.
— — fragilis Ser. 593.
— — macrocarpa Ser. 593.
— — pendula Zbl. 593.
— — persicoides Ser. 593.
— — purpurea Zbl. 593.
— — roseoplena Zbl 593.
— — tangutica Bat. II. 973.
— discolor Roem. 591.
— divaricata Ilt. 593.
— ehurnea Spach 600.
— — leiocalyx Boiss. 600.
— elacagrifolia Spach 591.
— — Kotschyi Boiss. 592.
— fasciculata Greene 598.

Amygdalus Iragilis Borkh. 593.
— furcata Spach 600.
— georgica Desf. 599.
— glandulosa Hook. 597.
— hippophaeoides Bornm. 603.
— humilis Edgew. 601.
— incana Pall. 603.
— kermanensis glabra Bornm. 591.
— — velutina Bornm. 591.
— Kotschyi Hoh. 592.
— lancifolia Carr. 973.
— latifolia Ht. 599.
— — alba Ht. 599.
— leiocarpa Boiss. 591.
— lycioides Spach 600.
— — Reuteri B. et B. 601.
— microphylla Kunth 599.
— nana L. 599.
— — campestris Ser. 599.
— — georgica Ser. 599.
— — Gessleriana Ht. 599.
— noctarina Ait. 594.
— orientalis Mill. 591.
— — discolor Spach 591.
— pedunculata Pall. 597.
— persica L. 595.
— — nucipersica L. 594.
— persico-amygdala Rchbg. 593.
— persicoides Spach 593.
— Petunnikowii Litw. II. 973.
— pilosa Turcz. 597, II. 974.
— pumila Sims II. 977.
— salicifolia Boiss. et Bal. 592.
— scoparia Spach 590.
— spartioides Spach 590.
— spathulata Boiss. 600.
— spinosissima Bge. 601.
— Stocksiana Boiss. 599.
— tangutica Korsh. II. 973.
— variabilis Bornm. 591.
— — latifolia Bornm. 591.
— Webbi Spach 592.
— — pubescens Bornm. II. 973.
— — reticulata Bornm. II. 973.
— — salicifolia Boiss. 592.
Anabasis Ammodendron Mey. II. 908.
Anagyris L. II. 21.
— foetida L. II. 21.
Andrachne L. II. 1019.
— chinensis Bge. II. 1019.
— colchica F. et Mey. II. 1019.
— cordifolia M. Arg. II. 1019.
— phyllanthoides M. Arg. II. 1019.
— Roemeriana M. Arg. II. 1019.
Andromeda L. II. 524.
— acuminata Ait. II. 530.
— adenothrix Miqu. II. 537.
— angustifolia Pursh II. 534.
— arborea L. II. 535.
— axillaris Lam. II. 530.
— baccata Wangh. II. 548.
— calyculata L. II. 534.
— — angustifolia Ait. II. 534.
— — nana Lodd. II. 534.
— campanulata Miqu. II. 521.
— cassinefolia Vent. II. 526.
Andromeda cassinefolia nuda Vent. II. 526.
— — pulverulenta Vent. II. 527.
— Catesbaei Walt. II. 530.
— cernua Miqu. II. 523.
— — rubens Maxim. II. 523.
— ciliicalyx Miqu. II. 512.
— coerulea L. II. 519.
— coriacea Ait. II. 531.
— crispa Poir. II. 534.
— cupressina Hook. II. 524.
— Davisiae C. Schn. II. 530.
— dealbata Ldl. II. 527.
— elliptica S. et Zucc. II. 532.
— ferruginea Walt. II. 532.
— — arborescens Mchx. II. 532.
— — fruticosa Mchx. II. 533.
— floribunda Pursh II. 528.
— formosa Wall. II. 528.
— frondosa Pursh II. 533.
— glaucophylla Link II. 526.
— hypnoides L. II. 524.
— japonica Thbg. II. 528.
— — albo-marginata C. Schn. II. 528.
— — pygmaea Max. II. 528.
— laurina Mchx. II. 530.
— ligustrina Muhl. II. 533.
— — loliosiflora C. Schn. II. 533.
— lucida Jacqu. II. 530.
— — Lam. II. 531.
— lycopodioides Pall. II. 523.
— marginata Duham. II. 532.
— Mariana Jacqu. II. 531,
— — L. II. 532.
— Mertensiana Bong. II. 524.
— nikoensis Maxim. II. 522.
— nitida Bartr. II. 531.
— ovalifolia Maxim. II. 532.
— — Wall. II. 532.
— paniculata Ait. II. 534.
— — loliosiflora Mchx. II. 533.
— perulata Miqu. II. 521.
— polifolia L. II. 526.
— — angustifolia Ait. II. 526.
— — ericoides Dipp. II. 526.
— — grandiflora Lodd. II. 526.
— — latifolia Ait. II. 526.
— — major Ht. II. 526.
— — minor Ht. II. 526.
— — revoluta Lodd. II. 526.
— populifolia Lam. II. 530.
— pulverulenta Bartr. II. 526.
— — nuda C. Schn. II. 526.
— — typica C. Schn. II. 526.
— racemosa L. II. 528.
— recurva Buckl. II. 529.
— reticulata Walt. II. 530.
— rhomboidalis Veill. II. 533.
— rigida Pursh II. 532.
— rosmarinifolia Pursh II. 526.
— speciosa glauca Wats. II. 527.
— — nitida Mchx. II. 526.
— — pulverulenta Mchx. II. 527.
— spicata Wats. II. 528.
— spinulosa Pursh II. 530.
— Stelleriana Pall. II. 524.

Digitized by Google

Andromeda subsessilis Miqu. II. 522.
— taxifolia Pall. II. 519.
— tetragona L. II. 523.
— vaccinoides Ilt. II. 534.
— Walteri Willd. II. 530.
Androsaemum hircinum Spach II. 338.
— officinale All. II. 337.
Anisostichus Bureau II. 621.
— capreolatus Bureau II. 621.
Anona triloba L. 347.
Anthodendron flavum Rehb. II. 499.
Anthomeles Douglasi Roem. 775.
Anthyllis L. II. 63.
— Asphalathi DC. II. 63.
— Barba Jovis L. II. 63.
— cytisoides L. II. 63.
— Genistae Duf. II. 63.
— Hermanniae L. II. 63.
— — Asphalathi Rouy II. 63.
— — cretica Fiori II. 63.
— Jacquini Kern. II. 63.
— montana L. II. 63.
— — Jacquini Rehb. II. 63.
Aphananthe Planch. 226.
— aspera Planch. 227.
Aphanochilus polystachyos B. II. 1048.
Aplopappus Cass. II. 755.
— Bloomeri Gray II. 756.
— cuneatus Gray II. 755.
Aralia L. II. 427, 431, **1041**.
— canescens Sieb. et Zucc. II. 431.
— chinensis L. II. 431.
— — canescens C. S. II. 431.
— — — Koch. II. 431.
— — elata Rebd. II. 431.
— — glabrescens C. S. II 431.
— — mandschurica Rehd. II. 431.
— elata Seem. II. 431.
— Fargesii Fr. II. 1041.
— Henryi Harms II. 1041.
— hispida Vent. II. 432.
— japonica Ilt. II. 431.
— mandschurica Seem. II. 431.
— Maximowiczii van Houtte II. 429.
— pentaphylla S. et Z. II. 427.
— — Thbg. II. 427.
— spinosa L. II. 431.
— — canescens Fr. et Sav. II. 431.
— — — Sarg. II. 431.
— — elata Sarg. II. 431.
— — glabrescens Fr. et Sav. II. 431.
Aranjia serificera Brot. II. 851.
Arbutus Adans. II. 541.
— alpina L. II. 545.
— Andrachne L. II. 542.
— — × Unedo II. 541.
— andrachnoides Link II. 541.
— arizonica Sarg. II. 543.
— hybrida Ker. II. 541.
— integrifolia Lam. II. 542.
— Menziesii Pursh II. 542.
— mucronatus L. II. 540.
— procera Dougl. II. 543.
— serratifolia Lodd. II. 541.
— — Salisb. II. 541.
— tomentosa Pursh II. 545.
Arbutus Unedo L. II. 541.
— — integerrima Sims II. 541.
— — rubra Ait. II. 541.
— Unedo-Andrachne Boiss. II. 541.
— uva-ursi L. II. 543.
— xalapensis arizonica Gray II. 543.
Arceuthobium M. B. 251, 806.
— oxycedri M. B. 251.
Arctostaphylos Adans. II. 543.
— alpina Spr. II. 545.
— californica Ilt. II. 543.
— grandis Ilt. II. 543.
— intermedia Greene II. 544.
— Manzanita Parry II. 544.
— media Greene II. 544.
— nevadensis Gray II. 543.
— officinalis Wim. et Grab. II. 543.
— procumbens E. Mey. II. 543.
— pungens H. B. K. II. 544.
— tomentosa Dougl. II. 545.
— — × uva-ursi II. 544.
— uva-ursi Spr. II. 543.
— — californica Zbl. II. 543.
— — grandis Zbl. II. 543.
— — leucocarpus Asch. et Mag. II. 543.
— viscida Parry II. 544.
Arctous Niedenzu II. 545.
— alpina Nied. II. 545.
Ardisia Swartz II. 571.
— crenata Roxb. II. 572.
— crenulata Ilt. II. 572.
— crispa A. DC. II. 572.
— glabra DC. II. 571.
— hortorum Max. II. 572.
— japonica Blume II. 571.
— pusilla DC. II. 572.
— villosa Mez II. 572.
Argyrolobium Eckl. et Zeyh. II. 24.
— argenteum Willk. II. 24.
— Linneanum Walp. II. 24.
Aria Host 686.
— alnifolia Decne. 703.
— ambigua Decne. 697.
— chamaemespilus Host 698.
— Crantzi Beck 698.
— crenata Decne. 685.
— cuspidata Roem. 684.
— Decaisneana Lav. 688, II. 997.
— flabellifolia Roem. 689.
— gracilis Koch. 679.
— graeca Roem. 690.
— Hosti Jacq. f. 694.
— japonica Decne. 703.
— kumaonensis Roem. 691.
— lanata Decne. 684.
— majestica Lav. 688.
— Mougeoti Beck 694
— — austriaca Beck 694.
— nivea Host 688.
— — cyclophylla Beck 688.
— scandica Roem. 692, 694.
— semiincisa Beck 695.
— suecica Koch. 692.
— Szovitsi Decne. 686.
— tiliaefoliae Decne. 703.
— torminalis Beck 696.

Aria torminalis mollis Beck 696.
— vestita Roem. 684.
Aristolochia L. 252, II. 905.
— frutescens Marsh. 253.
— birsuta Mühl. 253.
— macrophylla Lam. 253.
— mansburiensis Kom. II. 905.
— moupinensis Fr. II. 905.
— pubescens Page II. 905.
— sempervirens L. 252.
— Sipho L'Hér. 252.
— tomentosa Sims 253.
Aristotelia L'Hér. II. 365.
— Maqui L'Hér. II. 365.
Armeniaca brigantiaca Pers. 634.
— dasycarpa Borkh. 633.
— Mume Sieb. 637.
— sibirica Pers. 636.
— vulgaris Lam. 637.
Aronia Pers. 698, II. 997.
— alnifolia Nutt. 740.
— alpina Dipp. 698.
— — grandifolia Zbl. 689.
— — superaria Zbl. 689.
— arbutifolia Ell. 699, II. 997.
— — atropurpurea C. S. II. 997.
— — Baenitziana C. S. II. 997.
— — depressa C. S. II. 997.
— — × melanocarpa II. 997.
— — × Sorbus aria II. 997.
— — × — aucuparia II. 996.
— aria-chamaemespilus Rchb. 697.
— asiatica S. et Z. 736.
— atropurpurea Britt. 698.
— densiflora Spach 689.
— depressa Spach 699.
— erythrocarpa Ht. II. 997.
— floribunda Spach 699, II. 997.
— — glabrescens C. S. II. 997.
— glabrescens Spach 699.
— grandifolia Spach 700.
— heterophylla Zbl. 676.
— hybrida Zbl. 676.
— — superaucuparia Zbl. 676.
— melanocarpa Ell. 700, II. 997.
— — grandifolia C. S. II. 997.
— — × Sorbus americana II. 996.
— — × — Aria II. 997.
— — × — Aucuparia II. 996.
— — subpubescens C. S. II. 997.
— monstrosa Zbl. 677.
— nigra Dipp. 700.
— — decumbens Zbl. 699.
— — grandifolia Dipp. 700.
— — pubescens Dipp. 700.
— pubens Spach 699.
— Sargenti Zbl. 677.
— sorbifolia Spach 676.
— spuria Roem. 676.
— Watsoniana Roem. 677.
— Willdenowi Zbl. 689.
Artemisia L. II. 762.
— Abrotanum L. II. 763.
— arborescens L. II. 765.
— camphorata Vill. II. 764.
Artemisia frigida Willd. II. 764.
— procera Willd. II. 764.
— Rothrocki Gray II. 763.
— sericea Nutt. II. 764.
— suavis Jord. II. 764.
— tridentata Nutt. II. 763.
— vallesiaca All. II. 762.
Arthrocnemum Moq. 265.
— fruticosum Moq. 266.
— glaucum Ung.-Sternbg. 265.
— macrostachyum Morr. et Delp. 265.
Aseyrum L. II. 339.
— hypericoides L. II. 339.
— stans Mchx. II. 339.
Asimina Adans. 347.
— triloba Dun. 347.
Aspalathus chamlagu Ktze. II. 1012.
— cretica L. II. 63.
— spinosa Ktze. II. 1014.
Aster cabulicus Ldl. II. 757.
— ferrugineus Edgew. II. 757.
Astragalus L. II. 105, **1016.**
— angustifolius Lam. II. 1017.
— arborescens Bge., II. 1017.
— aristatus L'Hér. II. 105, 1016.
— — S. et Sm., II. 1016.
— Drusorum Boiss., II. 1016.
— massiliensis Lam. II. 105.
— Parnassii Boiss., II. 1016.
— paucijugus C. A. Mey., II. 1017.
— sempervirens Lam. II. 105, 1016.
— Tragacantha L. II. 105, 1016.
Atragene L. 283.
— alpina L. 284.
— koreana Ht. II. 912.
— occidentalis Horn. 285.
— sibirica L. 284.
Atraphaxis L. 255, II. **906.**
— Billardieri Jaub. et Sp. 255.
— buxifolia J. et Sp. 256.
— frutescens Koch 256.
— lanceolatum Meissn. 257.
— latifolia Koch 257.
— Muschketowii Krassn. II. 906.
— spinosa L. 255.
Atriplex L. 261, II. 908.
— canescens James 262, II. 908.
— confertifolium Wats. 262.
— corrugata Wats. 262.
— Halimus L. 261.
— plagiostomum Koch. 262.
— portulacoides L. 261, II. 908.
Aucuba Thbg. II. 454.
— chinensis Benth. II. 455.
— himalaica Hk. II. 455.
— japonica Thbg. II. 454.
— — longifolia Nak. II. 455.
Aucuparia silvestris Med. 674.
Audibertia incana Benth. II. 602.
Axyris ceratoides L. 264.
Azalea L. II. 497.
— alba Sweet II. 504.
— albiflora O. Ktze. II. 509.
— amoena Ldl. II. 505.
— arborescens Pursh II. 500.
— aurantiaca Dietr. II. 500.

Azalea calendulacea Mchx. II. 500.
— — crocea Mchx. II. 500.
— — flammea Mchx. II. 500.
— californica Ht. II. 501.
— calyciflora Hit. II. 506.
— canadensis O. Ktze. II. 494.
— canescens Mchx. II. 502.
— crispiflora Hook. II. 506.
— dahurica K. Koch II. 471.
— Danielsiana Paxt. II. 506.
— dilatata O. Ktze. II. 497.
— fragrans Adams II. 481.
— — Raf. II. 500.
— gandavensis Rehd. II. 499.
— glauca Pursh II. 502.
— hispida Pursh II. 502.
— hybrida Daviesii Bretschn. II. 499.
— indica L. II. 506.
— — Sims II. 506.
— — alba Ldl. II. 504.
— — amoena Rehd. II. 505.
— — crispiflora van Houtte II. 506.
— — Kaempferi Rehd. II. 506.
— — lateritia Ldl. 506.
— — obtusa alba Rehd. II. 506.
— — — calyciflora Rehd. II. 506.
— japonica Gray II. 499.
— kamtschatica O. Ktze. II. 507.
— Laetitia Hit. II. 488.
— lapponica L. II. 477.
— ledifolia Hook. II. 504.
— — phoenicea Hook. II. 504.
— linearifolia J. D. Hook. II. 504.
— Lndoviciae Ht. II. 488.
— lutea L. II. 500.
— macrantha Bge. II. 506.
— molle-sinensis Ht. II. 499.
— mollis Auct. et Hort. II. 499.
— — Bl. II. 497.
— — glabrior Rgl. II. 499.
— narcissiflora Fort. II. 504.
— nitida Pursh II. 502.
— nudiflora L. II. 502.
— — canescens Rehd. II. 502.
— — coccinea Hit. II. 500.
— obtusa Ldl. II. 506.
— occidentale Torr. et Gr. II. 501.
— ovata Ldl. II. 509.
— periclymenoides Mchx. II. 502.
— pilosa Michx. II. 511.
— pontica L. II. 499, 1046.
— — albiflora Sims II. 499.
— — sinensis Ldl. II. 497.
— procumbens L. II. 513.
— punicea Sweet II. 504.
— ramentacea Ldl. II. 506.
— reticulata Koch II. 497.
— rhombica O. Ktze. II. 497.
— rosmarinifolia Burm. II. 504.
— — alba Rehd. II. 504.
— — narcissiflora Rehd. II. 504.
— — punicea Rehd. II. 504.
— — purpurea Rehd. II. 504.
— semibarbata O. Ktze. II. 509.
— serpyllifolia Gray II. 507.
— Seymouri Ldl. II. 494.
Azalea sinensis Hort. II. 499.
— — Lodd. II. 497.
— speciosa Willd. II. 500.
— Tschonoski O. Ktze. II. 507.
— Vaseyi Rehd. II. 495.
— viscosa L. II. 502.
— — glauca Mchx. II. 502.
— — hispida Britt. II. 502.
— Weyrichi O. Ktze. II. 495.
Azaleastrum albiflorum Rydb. II. 509.
Azaleodendron Rodigas II. 488.
Azara R. et Pav. II. 359.
— dentata R. et Pav. II. 360.
— Gilliesii Hook. et Arn. II. 359.
— integrifolia R. et Pav. II. 359.
— microphylla Hook. II. 359.
Azarolus heterophylla Borkh. 676.
— pinnatifida Borkh. 674.
— Pollvilleriana Borkh. 667.

Baccharis L. II. 758.
— halimifolia L. II. 759.
— patagonica Hook. et Arn. II. 759.
— pilularis DC. II. 759.
— salicifolia Nutt. II. 758.
— salicina T. et Gr. II. 758.
Baea violacea Pers. II. 1049.
Ballonia juncea Bentb. et Hk. II. 590.
Ballota L. II. 602.
— frutescens Woods II. 602.
— spinosa Link II. 602.
Baptisia nepalensis Hook. II. 22.
Barbula sinensis Lour. II. 596.
Basilima Raf. 486.
— alpina Zbl. 488.
— millefolium Greene 492.
— sorbifolia Raf. 489.
Basteria Mill. 343.
Batodendron Nutt. II. 549.
— andrachneforme Small II. 549.
— arboreum Nutt. II. 550.
Batis vermiculata Hook. 266.
Baumgartia scandens Mnch. II. 925.
Benthamia Ldl. II. 454.
— capitata Nak. II. 454.
— florida Nak. II. 454.
— fragifera Ldl. II. 454.
— japonica S. et Z. II. 454.
— Nuttalli Nak. II. 454.
Benthamidia Spach II. 453.
— florida Spach II. 454.
Benzoin Fabric. 351.
— aestivale Nees 351.
— Benzoin Coult. 351.
— glaucum S. et Z. 352.
— hypoglaucum C. S. 352, II. 928.
— hypoleucum Ktze. II. 928.
— melissaefolium Nees 351.
— membranaceum Ktze. 351.
— obtusilobum Ktze. 352.
— odoriferum Nees 351.
— praecox S. et Z. 352.
— sericeum S. et Z. 352.
— — glabratum C. S. 352.
— Thunbergii S. et Z. 351.
— umbellatum Ktze. 351.

Digitized by Google

Berberidopsis Hook. F. II. 358.
— corallina Hook. II. 358.
Berberis L. 297, II. **912**.
— actinacantha Mart. 300, II. 923.
— — crispa Reiche 300.
— acuminata Fr. II. 916.
— — Stapf II. 916.
— aetnensis Presl 308, II. 921.
— aggregata C. S. II. 918.
— altaica Pall. 309.
— amurensis Rupr. 315, II. **921.**
— Andreana Naud. 302.
— Andrieuxii Hk. et Arn. 321.
— angulizans Massias 313.
— angulosa Wall. 309, II. 914.
— — brevipes Fr. II. 914.
— — puberella Ust. 309.
— angustifolia Hartw. 320.
— approximata Sprag. II. 914.
— Aquifolium Pursh 318.
— — repens T. et Gr. 317.
— arguta C. S. II. 916.
— aristata DC. 313, II. **916.**
— — Sims 305.
— — floribunda Hk. et Th. 313.
— — × vulgaris II. 916.
— asiatica Ht. 313.
— — Roxb. 299, II. 917.
— atrovirens Wall. 304.
— australis C. S. II. 921.
— — Hackeliana C. S. II. 920.
— — typica C. S. II. 921.
— Bealei Fort. 323.
— Boissieri C. S. 308.
— brachybotrys Edgew. 310, II. **922.**
— brachypoda Max. II. 922.
— — salicaria C. S. II. 922.
— Bretschneideri Rehd. II. 922.
— brevipaniculata C. S. II. 922.
— brevipes C. S. II. 914.
— — Greene II. 914.
— buxifolia Lam. 302, II. 923.
— — macracantha Phil. 302.
— — microphylla Speg. 302.
— — papillosa C. S. 302.
— — spinosissima Reiche 302.
— — typica C. S. 302.
— — — inermis C. S. 302.
— — — nana C. S. 302.
— — — pygmaea C. S. 302.
— calliobotrys Aitch. 310, II. 920.
— — Bien. 310.
— canadensis Mill. 313, II. 921.
— candidula C. S. II. 915.
— caraganaefolia DC. II. 1012.
— Caroli C. S. 307.
— caroliniana Loud. 313.
— cerasina Schr. II. 921.
— chitria Ham. 313.
— — Ldl. 305, II. 916.
— chocboco Schdl. 321.
— Claussenii Cit. II. 924.
— concinna Hook. 299, II. **914.**
— congestiflora Gay 300, II. 924.
— — hakeoides Hook. 299.
— coriaria Royle 313.
Berberis crataegina DC. 308, II. 920.
— — Schr. II. 920.
— crenulata Schr. II. 921.
— cretica L. 308, II. 920.
— crispa Gay 300, II. 924.
— Darwini Hook. 300, II. 924.
— — × empetrifolia 298.
— dasystachya Max. 306, II. **922.**
— dealbata Ldl. 299, II. **923.**
— declinata Schr. II. 921.
— densiflora Bois. et B. 308, II. **917.**
— — macracantha Boiss. 314.
— diaphana Max. 305, II. **914.**
— dictyophylla Franch. 309, II. 913.
— dictyota Jeps. 320.
— dolichobotrys Fed. II. 922.
— dubia C. S. II. 920.
— dulcis Sweet 302.
— Duthieana C. S. II. 917.
— Edgeworthiana C. S. II. 922.
— Ehrenbergii Kze. 322.
— elegans C. S. 312, II. 918.
— emarginata W. 310, II. 914.
— empetrifolia Lam. 298, II. 923.
— fascicularis Ht. 318.
— — Sims 320.
— Fendleri Gray 314, II. 921.
— Fineti C. S. II. 918.
— floribunda Wall. 313, II. **916.**
— Fortunei Ldl. 323.
— fraxinifolia Hook. 322.
— Fremontii Torr. 321.
— Gagnepaini C. S. II. 914.
— — Hemsl. II. 915.
— garhwalensis C. S. II. 917.
— Gilgiana Fed. II. 922.
— glaucescens Ht. 306.
— — St. Hil. 302, II. 924.
— glumacea Spreng. 322.
— gracilipes Oliv. 322.
— gracilis Hartw. 320.
— gratissima Klotzsch 305.
— Guimpeli Koch 312, II 921.
— haematocarpa Woot. 321.
— hakeoides C. S. 299, II. 923.
— handsworthensis Ht. 298.
— Hartwegii Benth. 322.
— heterophylla Juss. 300, II. 923.
— heteropoda Schrk. 311, II. 917.
— — oblonga Rgl. 311.
— hispanica B. et R. II. 921.
— — Hackeliana C. S. II. 920.
— Hookeri Lem. 303, II. **916.**
— — candidula C. S. 303, II. **915.**
— — typica C. S. II. 916.
— — viridis C. S. II. 916.
— horrida Gay 299, II. 923.
— hypoleuca Ldl. 299, II. 917.
— iberica C. S. 312, II. **920.**
— — paphlagonica C. S. 312.
— ignorata C. S. II. 918.
— iliciifolia Forst. 301, II. 924.
— — Ht. 316, II. **924.**
— — Scheele 320.
— integerrima Bge. 308, II. **917.**
— — pyrocarpa Rgl. 307.

Berberis integerrima stenophylla Max. 307.
— Jaeschkeana C. S. 309.
— — Usteriana C. S. 309.
— Jamesoni Ht. 303.
— japonica C. S. 315, 806, II. 921.
— — R. Br. 323.
— Koehneana C. S. II. 922.
— koreana Palib. II. 922.
— kumaonensis C. S. 309, II. 914.
— kunawarensis Royle 315, II. 922.
— lagenaria Poir. 301.
— lanceolata Benth. 320.
— latifolia Ht. II. 924.
— laurina Billbg. 302, II. 924
— laxiflora Schr. II. 921.
— Leschenaultiana Wall. 323.
— levis Fr. II. 916.
— libanotica Ehrbg. 310, II. 920.
— lucida Schr II. 921.
— Lycium Royle 306, II. 917.
— macracantha Schrad. II. 916.
— macrosepala Hk. II. 914.
— Maximowiczii Rgl. 310.
— miccia Hamilt. 323.
— microphylla Forst. 302.
— — nana Dipp. 302.
— minutiflora C. S. II. 914.
— mitis Schr. II. 921.
— — × Poireti II. 921.
— nana Greene 317.
— nepalensis Ht. 313.
— — Lodd. II. 916.
— — Spreng. 323.
— nervosa Pursh 322.
— Neuberti Baum. 316, 806, II. **924.**
— — ilicifolia Ht. II. 924.
— Nevinii Gray 321.
— nitens Schr. II. 920.
— nummularia Bge. 307, II. 917.
— — pyrocarpa C. S. 307.
— — Schrenkiana C. S. 307.
— — sinica C. S. II. 917.
— oblonga C. S. 311, II. 917.
— obovata Schr. II. 920.
— orientalis C. S. 315.
— orthobotrys Bien. 310, II. **920.**
— pachyacantha Bien. 308.
— — Koch. 314, II. 921.
— pallida Hartw. 322.
— papillifera Koch. II. 918.
— parvifolia Sprag. II. 914.
— pinnata Ht. 318.
— — Lag. 320.
— Poireti C. S. II. 920.
— provincialis Audib. II. 921.
— polyantha Hemsl. II. 923.
— pruinosa Franch. 301, II. 916.
— pubescens Pamp. II. 922.
— pumila Greene 318.
— pycnantha Bien. 310.
— pygmaea Koch. 302.
— Regeliana Koch. 315, 806, II. 921.
— Rehderiana C. S. 312, II. 921.
— repens Ht. 318
— — Ldl. 317.
Berberis repens rotundifolia Ht. 317.
— revoluta Sm. 298.
— ruscifolia Ht. 306.
— — Lam. 302, II. 924.
— salicaria Fod. II. 922.
— sanguinea Franch. 303, II. 916.
— sanguinolenta Schr. II. 921.
— Schiedeana Schlecht. 320.
— — Wats. 320.
— Sellowiana C. S. II. 924.
— serotina Lge. 310, II. 921.
— serrata Koch. 310, II. **921.**
— sibirica Pall. 309, II. 914.
— Sieboldii Ht. 315.
— — Miq. 312, II. 921.
— Sikokiana Yat. 312.
— sinensis C. S. II. 920.
— — Desf. 312, II. **920.**
— — Ht. 313.
— — Poir. II. 920.
— — angustifolia Rgl. 312.
— — elegans Franch. 312.
— Soulieana C. S. II. 916.
— spathulata Schr. II. 920.
— Stapfiana C. S. II. 919.
— stenophylla Hance 303, II. 916
— — Ldl. 298, II. 923.
— — super-darwini Zbl. 299.
— subcaulialata C. S. II. 919.
— subtriplinervis Franch. 322.
— Swaseyi Bouckl. 321.
— tenuifolia Ldl. 322.
— thibetica C. S. II. 920.
— Thunbergi DC. 309, II. 918.
— — Maximowiczii Rgl. 310.
— — minor Rehd. 310.
— — papillifera Fr. II. 918.
— — typica pluriflora Koch. 310.
— — — uniflora Dieck 310.
— tinctoria Lesch. 299.
— Tischleri C. S. II. 917.
— triacanthophora Fed. II. 916.
— trifolia Roem. et Sch. 320.
— trifoliata Hartw. 320.
— trifoliolata Moric. 320.
— trifurca Fort. 323.
— Tschonoskyana Rgl. 311, II. 917.
— umbellata C. S. 306, II. 917.
— — Wall. 306, II. **917.**
— umbellicata Ht. 306.
— umbellulata Poepp. 300.
— verruculosa Hemsl. et W. II. 914.
— virescens Hk. 305, II. **918.**
— vulgaris L. 315, II. **921.**
— — aetnensis Herb. 315.
— — amurensis Rgl. 315.
— — atropurpurea Rgl. II. 924.
— — australis Boiss. II. 921.
— — brachybotrys Hk. et Th. 310.
— — elegans Ht. 306.
— — iberica Stev. 312, II. 920
— — japonica Rgl. 315.
— — × Mahonia aquifolium 316.
— Wallichiana DC. 304, II. 916.
— — Ht. 303
— arguta Fr. II. 916.

Berberis Wallichiana pallida Bois II. 915.
— — microcarpa Hk. et Th. 303.
— — xanthoxylon C. S. 305.
— Wilcoxii Brit. et Kearn. 320.
— Wilsonae Hemsl. et W. II. 918.
— xanthoxylon Hassk. 305.
— yunnanensis Franch. 306, II. **914.**
— Zabeliana C. S. 314.
Berchemia Neck. II. 262.
— Giraldiana C. S. II. 263.
— lineata DC. II. 262.
— racemosa S. et Z. II. 262, 1031.
— scandens K. Koch II. 262.
— volubilis DC. II. 262.
Betula L. 97, **881.**
— acuminata Ehrh. 112.
— — Wall. II. 882.
— alaskana Sarg. 115, II. **886.**
— alba L. 113, 119, 804.
— — Roth 116.
— — arbuscula Fries 112.
— — carpatica × nana II. 885.
— — dalecarlica L. 112.
— — × glandulosa 108.
— — × humilis 108.
— — latifolia Rgl. 112.
— — microphylla Wim. 112.
— — × nana 108.
— — occidentalis Rgl. 115.
— — × pendula 114.
— — populifolia Rgl. 112.
— — pubescens parvifolia Rgl. 117.
— — × pumila 109.
— — songarica Rgl. 119.
— — tortuosa C. S. 117.
— — — alpigena C. S. 119.
— — — carpatica C. S. 119.
— — — eutortuosa C. S. 117.
— — — genuina Rgl. 118.
— — — Kusmischeffii Rgl. 118.
— — — Murithii C. S. 118.
— — — songarica C. S. 119.
— — × utilis 103.
— — verrucosa Wallr. 112.
— — — resinifera Rgl. 115.
— — — vulgaris sterilis Rgl. 112.
— — — — oycowiensis Rgl 112.
— — vulgaris C. S. 117.
— — — enpubescens C. S. 117.
— — — — ovalifolia C. S. 117.
— — — — parvifolia C. S. 117.
— — — — rhomhifolia C. S. 117.
— — — expansa Rgl. 112.
— — — glahra C. S. 117.
— — — — ovata C. S. 117.
— — — — rhomboidea C. S. 117.
— — — nudata C. S. 117.
— — — — euodorata C. S. 117.
— — — — Ullepitschiana C. S. 117.
— — — typica C. S. 117.
— — — — ovalis C. S. 117.
— — — — rhomboidalis C. S 117.
— — — urticifolia C. S. 117.
— Alnohetula Ehrh. 121.
— alnoides Buch. 97, II. **882.**
— — acuminata Whl. II. 882.
Betula alnoides cylindrostachya Wkl. II. 882.
— Alnus L. II. 891
— — Thbg. 123.
— — glutinosa L. 130.
— — incana L. 136.
— alpestris Fries 108.
— ambigua Hampe 114.
— Aschersoniana Hay. II. 886.
— aurata Borkh. 114.
— — Callieri C. S. 114.
— — atropurpurea C. S. 114.
— — pseudoalba C. S. 114.
— — Wettsteinii C. S. 114.
— Baeumkeri Winkl. 97, II. **882.**
— bhojpattra Wall. 102.
— Borggreveana Zbl. 109.
— caerulea Bl. II. 886.
— — Blanchardi Sarg. II. 886.
— — grandis Bl. II. 886.
— carpatica Auct. 117.
— — W. 119.
— carpinifolia Ehrh. 99.
— — S. et Z. II. 884.
— chinensis Max. II. 884.
— — Delavayi C. S. II. 884.
— cordata Lois. 125.
— cordifolia Rgl. II. 886.
— corylifolia Ht. 112.
— — Rgl. et Max. 99.
— costata Trautv. 101.
— crenata Rydbg. II. 885.
— crispa Ait. 122.
— cylindrostachya Ldl. 97, II. **882.**
— davurica Ledeb. 117.
— — Pall. 109.
— — × lenta 111.
— Delavayi Fr. 98, II. **884.**
— divaricata Ledeb. 107.
— echinus Winkl. 98, II. 884.
— Elrodiana Butl. II. 884.
— Ermani Cham. 102.
— exalata Moore II. 884.
— excelsa Ait. 108.
— — Pursh 100.
— — Borggreveana C. S. 109.
— — × nana 108.
— — typica C. S. 109.
— Fargesii Franch. 98, II. **884.**
— fennica Doerfl. 108.
— Fetisowi Ht. 108.
— fontinalis Sarg. 115, II. **886.**
— fruticosa Bess. 105.
— — Pall. 103.
— — divaricata Rgl. 107.
— — × pendula 107.
— glandulifera Butl. II. 885.
— glandulosa Mchx. 105.
— — × intermedia 108.
— — × pumila 108.
— glohispica Shirai 101.
— glutinosa L. II. 891.
— — Wallr. 114.
— Gmelini Bge 108.
— grandis Schrd. 115.
— grossa S. et Z. II. 884.

Betula Hallii How. II. 885.
— Hornei Butl. II. 885.
— bumilis Schrk. 103.
— — × pendula 108.
— — × pubescens 108.
— — Zabelii Dipp. 108.
— bupehensis C. S. II. 882.
— hybrida Bechst. 114, 804.
— — Blom. 112.
— incana Roth 136.
— insignis Franch. 98, II. **884.**
— intermedia Thom. 108.
— — alpestris Winkl. 108.
— — typica C. S. 108.
— Jackii C. S. 102.
— japonica Sieb. 112.
— kenaica Evans 115, II. **886.**
— Koehnei C. S. 114.
— lanulosa Mchx. 99.
— latifolia Tausch 116.
— lenta L. 99.
— — laciniata Rehd. II. 884.
— — lutea Rgl. 100.
— — × lutea II. 884.
— — persicifolia Winkl. 100.
— — × pumila 102, 804.
— lobulata Kanitz 113.
— Laucheana C. S. 109.
— luminifera Winkl. 97, II. **882.**
— lutea Mchx. 100.
— — persicifolia Dipp. 100.
— — × pumila 102.
— Lyalliana Koch. 115, II. **886.**
— macrophylla Ht. 115.
— Maximowicziana Mayr II. 883.
— Maximowiczii Rgl. 97.
— Medwediewii Rgl. 101.
— Michauxii Spach 106.
— montanensis Butl. II. 787.
— Murithii Gand. 118.
— Middendorffii Trautv. et M. 105.
— nana L. 106.
— — intermedia Hartm. 108.
— — × pendula 108.
— — × pumila 108.
— — sibirica Ledeb. 105.
— — × verrucosa 108.
— nigra Duroi 99.
— — L. 99.
— — Mur. 118.
— obovata Butl. II. 887.
— obscura Kot. 112.
— occidentalis Hook. 114, II. **886.**
— — Lyall 115.
— — Sarg. 115, II. **886.**
— odorata Bechst. 119.
— — Rchb. 112.
— oycoviensis Bess. 112.
— palmata Borkh. 112.
— papyracea Ait. 116.
— — occidentalis Dipp. 115.
— papyrifera Marsh. 115.
— — communis Rgl. 115.
— — — cordifolia C. S. 115.
— — — elongata C. S. 115.
— — — grandis C. S. 115.
Betula papyr. communis typica C. S. 115.
— — Lyalliana Koch. 115, II. **886.**
— — × pendula 114.
— — × pumila 108.
— pendula Roth 112, II. **886.**
— — arbuscula C. S. 112.
— — japonica Rehd. 112.
— — — mierodonta C. S. 112.
— — — typica C. S. 113.
— — oycoviensis C. S. 112.
— — pyramidalis Dipp. 112
— — — parvula C. S. 112.
— — typica C. S. 112.
— — — cuneata Ht. 112.
— — — dalecarlica C. S. 112.
— — — denticulata C. S. 112.
— — — expansa C. S. 112.
— — — nana C. S. 112.
— — — obscura C. S. 112.
— — — purpurea C. S. 112.
— — — tristis C. S. 112.
— — — Youngi C. S. 112.
— pinnata Swartz 136.
— Piperi Britt. II. 886.
— populifolia Marsb. 112.
— — × pumila 109.
— — purpurea C. S. 112.
— pseudo-utilis C. S. 103.
— pubescens Ehrb. 116.
— — atropurpurea Ht. 114.
— — glabra Fiek 117.
— — Hornemanni Rgl. 117.
— — Murithii Gill. 118.
— pumila L. 107.
— — dahurica Ht. 108.
— — glabrescens Rgl. 107.
— — glandulifera Rgl. II. 885.
— — Grayi Koch. II. 885.
— — setarioides Wkl. II. 885.
— — typica Rgl. 107.
— Purpusii C. S. 102.
— — luteoides C. S. 102.
— — typica C. S. 102.
— quebeckensis Ht. 105.
— Raddeana Trautv. 98, II. **884.**
— resinifera C. S. 115.
— rhombifolia Nutt. 115, II. **886.**
— Rosae Wkl. II. 885.
— Rosenvingei C. S. 108.
— rubra Mchx. 99.
— rugosa Ehrb. 132.
— serrulata Mchx. 127, 132.
— Sandbergi Britt. II. 887.
— Schmidtii Rgl. II. 884.
— Seideliana Missb. II. 885.
— Sokolowii Jacq. 105.
— subcordata Rydb. II. 887.
— Sullivantii C. S. 108.
— tomentosa R. et A. II. 886.
— torfacea Schleich. 114.
— tortuosa Ledeb. 117.
— ulmifolia S. et Z. 101, II. **884.**
— — costata Rgl. II. 884.
— urticifolia Rgl. 117.
— utahensis Britt. II. 886.
— utilis Don 102, II. **884.**

Betula verrucosa Ehrh. 113, II. **886.**
— — elegans Youngi Ht. 112.
— — fastigiata Schel. 112.
— — nana Ht. 112.
— — Youngi Ht. 112.
— virgultosa Fries 117.
— viridis Chaix 121.
— Warnstorfii C. S. 108.
— Wilsoniana C. S. II. 882.
— Winklerii C. S. 108.
— Zabelii Schelle 108.
— Zimpelii Jge. II. 885.
Beurera fertilis Ktze. 345.
— florida Ktze. 343.
Beurreria Ehret 343.
Bigelowia DC. II. 755.
— acuminata Sm. II. 792.
— Douglasii Gray II. 755.
— graveolens Gray II. 755.
Bignonia capreolata L. II. 621.
— Catalpa L. II. 625.
— chinensis Lam. II. 623.
— crucigera L. II. 621.
— grandiflora Thnnb. II. 623.
— linearis Cav. II. 621.
— radicans L. II. 623.
— sempervirens L. II. 543.
— tomentosa Thbg. II. 618.
Biltia Vaseyi Small II. 495.
Bladhia Thbg. II. 571.
— crispa Thbg. II. 572.
— glabra Thbg. II. 571.
— japonica Thbg. II. 571.
— villosa Thbg. II. 572.
Boehmeria Jacq. 246, II. 905.
— bifida Bl. II. 905.
— biloba Wedd. II. 905.
— longispica Steud. 246.
— macrophylla Don 246.
— nivea Hook. et Arn. 246.
— platyphylla Don 246.
Boelia Webb II. 27.
— sphaerocarpa Webb II. 27.
Boenninghausenia albiflora Rchb. II. 117.
Bollwillería Zbl. II. 995.
— auricularis Zbl. II. 995.
— bulbiformis Zbl. II. 995.
— malifolia Zbl. II. 995.
Boretta Neck. II. 515.
— cantabrica O. Ktze. II. 515.
Borya acuminata Willd. II. 792.
— ligustrina Willd. II. 792.
Bosea (Bosia) Yerva Mora L. II. 1061.
Brachyglottis elaeagnifolius Hook. II. 766.
Brachyris Euthamiae Nutt. II. 755.
Bradburya virginiana Ktze. II. 114.
Bradlea (Bradleya) Adans. II. 75.
— frutescens Britt. II. 76.
— macrostachya Small II. 77.
Brandisia Hook. et Thoms. II. 618.
— racemosa Hemsl. II. 618.
Brassaiopsis ricinifolius Seem. II. 429.
Brickellia californica Gray II. 754.
Bridgesia spicata Ht. et Arn II. 908.
Brocchia dichotoma Mauri II. 141.
Broussonetia L'Hér. 240.
Broussonetia dissecta Senécl. 241.
— Kaempferi Sieb. 241, 242.
— Kazinoki 241.
— papyrifera L'Hér. 240.
— — cucullata Ser. 241.
— — laciniata Ser. 241.
— secundiflora Orteg. II. 19.
— Sieboldii Bl. 241.
— tinctoria Torr. 239.
Bruckenthalia Rchb. II. 567.
— spiculiflora Drude II. 567.
— spiculifolia Rchb. II. 567.
Brunnichia Banks 259.
— cirrhosa Banks 260.
Bryanthus S. G. Gmel. II. 517.
— Breweri A. Gray II. 517.
— coeruleus Dipp. II. 519.
— erectus Lindl. II. 515.
— glanduliflorus A. Gr. II. 519.
— Gmelini Don II. 517.
— taxifolius A. Gr. II. 519.
Buckleya Torr. 248.
— distichophylla Torr. 248, II. 905.
Buddleja (Buddleia, Bnddleya) L. II. 843.
— albiflora Hemsl. II. 845.
— — Hemsleyana C. S. II. 845.
— asiatica Hk. II. 844.
— — Lour. II. 844.
— capitata Jacq. II. 843.
— Colvilei Hk. et Th. II. 843.
— — Ht. II. 844.
— curviflora André II. 847
— Giraldii Diels II. 845
— globosa Lam. II. 843.
— Hemsleyana Koeh. II. 845.
— insignis Carr. II. 847.
— intermedia Carr. II. 847.
— — insignis Rehd. II. 847.
— japonica Hemsl. II. 847.
— — carnea Wils. II. 847.
— — insignis Wils. II. 847.
— — × Lindleyana. II. 847.
— — salicifolia Wils. II. 847.
— Lindleyana Fort. II. 847.
— — sinuato-dentata Hemsl. II. 847.
— nivea Duthie II. 844.
— officinalis Max. II. 845.
— paniculata Wall. II. 844.
— prostrata Ht. II. 846.
— salicifolia Ht. II. 847.
— variabilis Hemsl. II. 845.
— — Ht. II. 845.
— — gigantea Ht. II. 847.
— — magnifica Wils. II. 846.
— — prostrata C. S. II. 846.
— — superba Veitch. II. 847.
— — Veitchiana Wils. II. 847.
— — Wilsoni Wils. II. 847.
— — typica Wils. II. 845.
Buergeria floribunda Miq. II. 16.
— salicifolia S. et Z. 329.
— stellata S. et Z. 331.
Bumelia Swartz II. 573.
— lanuginosa Pers. II. 573.
— lycioides Gaert. II. 573.
Buplenrum L. II. 432.

Bupleurum fruticosum L. II. 432.
Buprestis fruticosa Sprgl. II 432.
Butneria Duh. 343, 806.
Butneria fertilis Kearn. 343.
— — ferax C. S. 344.
— — — nana C. S. 344.
— — × florida 343.
— — glauca C. S. 344.
— — — oblongifolia C. S. 344.
— florida Kearn. 343.
— — asplenifolia C. S. 343.
— — bullata C. S. 343.
— — lutea C. S. 343.
— — ovata C. S. 343.
— — typica C. S. 343.
— — variegata C. S. 343.
— Mobrii Small 343.
— nana Small 345.
— occidentalis Greene 345.
— praecox C. S. 347.
Buxus L. II. 137.
— angustifolia Mill. II. 140.
— arborescens Mill. II. 140.
— — grandifolia Müll.-Arg. II. 140.
— balearica Willd. II. 137.
— chinensis Link II. 141.
— Fortunei Carr. II. 138.
— — Ht. II. 140.
— halepensis Carr. II. 138.
— Harlandi Hance II. 139.
— — platyphylla C. S. II. 139.
— japonica Müll.-Arg. II. 139.
— — microphylla Müll.-Arg. II. 140.
— liukiuensis Mak. II. 140.
— longifolia Boiss. II. 138.
— — Jacqu. II. 139.
— — Ht. II. 140.
— microphylla S. et Z. II. 140.
— mucronata Ht. II. 140.
— myrtifolia Lam. II. 140.
— obcordata Ht. II. 140.
— papillosa C. S. II. 139.
— rosmarinifolia Ht. II. 140.
— salicifolia Ht. II. 140.
— saligna Don II. 136, 1020.
— sempervirens Auct. II. 139.
— — L. II. 140.
— — arborescens L. II. 140.
— — — argentea Loud. II. 140.
— — — aurea Loud. II. 140.
— — — aureo-marginata Loud. II. 140.
— — angustifolia Loud. II. 140.
— — japonica Mak. II. 140.
— — liukiuensis Mak. II. 140.
— — microphylla Bl. II. 140.
— — — Hook. II. 140.
— — myrtifolia Loud. II. 140.
— — rosmarinifolia Baill. II. 140.
— — rotundifolia Baill. II. 140.
— — suffruticosa L. II. 140.
— — — myrtifolia C. S. II. 140.
— — — rosmarinifolia C. S. II. 140.
— stenophylla Hance II. 139.
— suffruticosa Mill. II. 140.
— Wallichiana Baill. II. 139.
Caesalpinia L. II. 15.
Caesalpinia japonica Sieb. et Z. II. 15.
— sepiaria Auct. II. 15.
Calamintha rupestris Host II. 603.
Calampelis scaber Don II. 1054.
Calceolaria L. II. 1049.
— Sinclairi Hk. II. 1049.
— violacea Cav. II. 1049.
Callicarpa L. II. 591.
— americana L. II. 591.
— chinensis Ht. II. 594.
— dichotoma K. Koch II. 593.
— Giraldiana Hesse II. 1048.
— gracilis S. et Z. II. 593.
— japonica Thbg. II. 593.
— — × mollis II. 591.
— longifolia Lam. II. 594.
— mollis S. et Z. II. 591.
— purpurea Juss. II. 593.
— Shikokiana Mak. II. 593.
— Shirasawana Mak. II. 591.
— tosaensis Mak. II. 593.
— Zollingeriana Schauer II. 591.
Calligonum L. 257.
— aphyllum C. S. 258.
— Pallasia L'Hér. 258.
— polygonoides L. 257.
— — Wsll. 257.
Calluna Salisb. II. 562.
— Erica DC. II. 563.
— glabra Neilr. II. 563.
— vulgaris Hull II. 562.
— — alba Don II. 562.
— — — Hammondi Ht. II. 562.
— — Alporti Kirchn. II. 563.
— — ciliaris Döll II. 563.
— — decumbens Don II. 563
— — dumosa Kirchn. II. 563.
— — genuina Rgl. II. 562.
— — gracilis Kirchn. II. 563.
— — hirsuta Gray II. 563.
— — lutescens Kirchn. II. 563.
— — nana Kirchn. II. 563.
— — plena Rgl. II. 562.
— — prostrata Kirchn. II. 563
— — pubescens Koch II. 563.
— — purpurea Don II. 562.
— — Reginae Kirchn. II. 563.
— — tomentosa Don II. 563.
— — variegata Rgl. II. 563.
Calophaca Fisch. II. 104
— grandiflora Rgl. II. 105.
— Hoveni Schrenk II. 104.
— wolgarica Fisch. II. 104.
Calothyrsus Spach II. 248.
— californica Spach II. 250.
Calycanthus L. 343, **806**.
— ferax Mchx. 344.
— fertilis Walt. 345, 806.
— floridus L. 343, 806.
— — asplenifolius Loud. 343.
— — bullatus Koch 343.
— — luteus Behnsch 343.
— — variegatus Ht. 343.
— glaucus W. 344, 806.
— — oblongifolius Nutt. 344.
— inodorus Ell. 344.

Calycanthus laevigatus W. 344.
— nanus Lois. 345.
— occidentalis H. et A. 345, 806.
— ovatus Ait. 343, 806.
— praecox L. 347.
— sterilis Walt. 343, 806.
Calycocarpum Nutt. II. 925.
— Lyoni Nutt. II. 925
Calycotome Lk. II. 59.
— infesta Guss. II. 60.
— spinosa Lk. II. 60.
— — infesta Fiori II. 60.
— — villosa Rouy II. 60.
— villosa Lk. II. 60.
Calyptrostigma Trautv. et Meyer II. 751.
— Middendorffiana Tr. et M. II. 752.
Calysphyrum floridum Bge. II. 748.
Camellia L. II. 1035.
— japonica L. II. 1035.
— Sasanqua Thbg. II. 1035.
Campsis Lour. II. 622.
— adrepens Lour. II. 623.
— chinensis Voss II. 623.
— — aurantiaca Voss II. 623.
— — Princei Voss II. 623.
— — Thunbergi Voss II. 623.
— grandiflora K. Schum. II. 623.
— hybrida C. S. II. 1053.
— intermedia C. Schn. 623.
— radicans Seem. II. 623.
— — atropurpurea Voss II. 623.
— — × chinensis II. 623.
— — praecox C. Schn. II. 623.
— — speciosa Voss II. 623.
— — sanguinea praecox Voss II. 623.
Campylotropis Benth. II. 111.
Cantua pungens Torr. II. 587.
Capparis L. 354.
— rupestris S. et Sm. 355.
— spinosa L. 354.
Caprifolium Adans. II. 733.
— acuminatum normale Kuntze II. 729.
— alhiflorum Koch II. 739.
— alpigenum Gärtn. II. 707.
— alpinum Lam. II. 707.
— Altmanni Kuntze II. 700.
— Amhersti Kuntze II. 703.
— Amherstianum Kuntze II. 710.
— angustifolium Kuntze II. 684.
— arboreum Kuntze II. 726.
— asperifolium Kuntze II. 702.
— atropurpureum Ht. II. 742.
— Ancheri Kuntze II. 698.
— balearicum Dum. II. 740
— hiflorum Kuntze II. 730.
— Borhasianum Kuntze II. 694.
— brachypodum Gord. II. 733.
— bracteolare Kuntze II. 700.
— bracteosum Mich. II. 739.
— Brandtii Kuntze II. 711.
— Bungeanum Kuntze II. 692.
— californicum Koch II. 737.
— caucasicum Kuntze II. 713.
— cerasinum Kuntze II. 695.
— Chamissoi Kuntze II. 713.
— chinense Loud. II. 732.
Caprifolium chrysanthum Kuntze II. 722.
— ciliatum Kuntze II. 692.
— ciliosum Pursh II. 736.
— coerulescens Kuntze II. 717.
— coeruleum Lam. II. 695.
— conlusum Spach II. 730.
— conjugale Kuntze II. 711.
— cyrenaicum Koch II. 744.
— decipiens Kuntze II. 714.
— dentatum Raf. II. 739.
— dimorphum Kuntze II. 744.
— dioecum Roem. et Schult. II. 739.
— distinctum Moench II. 745.
— Douglasi Lindl. II. 737.
— dumetorum Lam. II. 721.
— dumosum Koch II. 739.
— etruscum Roem. et Schult. II. 744.
— flavescens Kuntze II. 704.
— flavum Dum. de Cours. II. 740.
— — Ht. II. 734.
— — Ral. II. 744.
— flexuosum Ht. II. 733.
— florihundum Kuntze II. 719.
— fragrantissimum Kuntze II. 698.
— Fraseri Pursh II. 740.
— fuchsioides Kuntze II. 727.
— germanicum Del. II. 741.
— — Dum. de Cours. II. 745.
— — Roehl. II. 745.
— glabratum Kuntze II. 727.
— glaucum Moench II. 739.
— Glehnii Kuntze II. 707.
— glutinosum Kuntze II. 708.
— gracilipes Kuntze II. 693.
— gratum Borkh. II. 742.
— gynochlamydeum Kuntze II. 695.
— Hallianum Ht. II. 731.
— hellenicum Kuntze II. 709.
— Hemsleyanum Kuntze II. 711.
— Henryi Kuntze II. 727.
— heterophyllum Kuntze II. 710.
— hirsutum Dens. II. 737.
— hispidulum Kuntze II. 701.
— — Lindl. II. 737.
— hortense Lam. II. 741.
— hypoleucum Kuntze II. 698.
— ihericum Kuntze II. 697.
— implexum Dum. II. 741.
— involucratum Kuntze II. 705.
— italicum Med. II. 741.
— — album Roem. et Sch. II. 741.
— — rubrum R. et Sch. II. 742.
— japonicum Don II. 729
— — Dum. de Cours. II. 733.
— Karelini Kuntze II. 710.
— Ledebourii Kuntze II. 705.
— ligustrinum Kuntze II. 695.
— linderiifolium Kuntze II. 692.
— longiflorum Sab. II. 733.
— Maacki Kuntze II. 724.
— macranthum Don II. 729.
— Maximowiczii Kuntze II. 712.
— mexicanum Kuntze II. 693.
— micranthum Kuntze II. 717.
— microphyllum Kuntze II. 692.
— Morrowii Kuntze II. 719.

Caprifolium nervosum Kuntze II. 714.
— Niaguarilli Ht. II. 698.
— nigrum Kuntze II. 715.
— nummularia Kuntze II. 726.
— nummulariilolium Kuntze II. 726.
— oblongifolium Kuntze II. 707.
— — Sweet II. 734.
— obovatum Kuntze II. 688.
— occidentale Lindl. II. 736.
— Olgae Kuntze II. 700.
— orientale Kuntze II. 713.
— pallidum Schur II. 741.
— parviflorum Pursh II. 739.
— parvilolium Kuntze II. 684.
— perfoliatum Rochl. II. 741.
— — genuinum Schur II. 742.
— — pallidum Schur II. 741.
— Periclymenum Del. II. 745.
— phyllocarpum Kuntze II. 698.
— pilcatum Kuntze II. 695.
— pilosum Ht. II. 737.
— — Humb., Bonpl., Kunth II. 736.
— praecox Kuntze II. 704.
— proliferum Kirchn. II. 739.
— pubescens Goldie II. 737.
— pnniceum Kirchn. II. 734.
— purpurascens Kuntze II. 687.
— pyrenaicum Lam. II. 704.
— quercifolium Dum. de Cours. II. 745.
— quinqueloculare Kuntze II. 725.
— ramosissimum Kuntze II. 686.
— reflexum Kirchn. II. 739.
— reticulatum Kuntze II. 730.
— roseum Lam. II. 715.
— rotundifolium Med. II. 742.
— — Moench II. 741.
— rupicolum Kuntze II. 685.
— Ruprechtianum Kuntze II. 719.
— Schmitzianum Kuntze II. 713.
— segreziense Kuntze II. 722.
— Semenovii Kuntze II. 701.
— semperflorens Ht. II. 745.
— sempervirens Moench II. 734.
— serotinum Dnm. de Cours. II. 745.
— simile Kuntze II. 729.
— spinosum Kuntze II. 686.
— splendidum Koch II. 743.
— Stahianum Kuntze II. 742.
— Standishii Kuntze II. 698.
— Sullivantii Kuntze II. 739.
— sylvaticum Lam. II. 745.
— syringanthum Kuntze II. 685.
— tanguticum Kuntze II. 690.
— tataricum Kuntze II. 717.
— Tatarinovii Kuntze II. 712.
— tenuiflorum Kuntze II. 700.
— Thomsoni Kuntze II. 701.
— tomentellum Kuntze II. 686.
— tragophyllum Kuntze II. 742.
— Tschonoskii Kuntze II. 711.
— turcomannicum Kuntze II. 726.
— uniflorum Sieb. II. 693.
— utahense Kuntze II. 692.
— venulosum Kuntze II. 694
— Vidalii Franch. et Sav. II. 711.
— vulgare Med. II. 741.
Caprifolium Xylosteum Gärtn. II. 721.
Caragana Lam. II. 94, **1012.**
— acanthophylla Kom. II. 1015.
— Aitchisoni Prain II. 97.
— Altagana Poir. II. 97.
— amhigua Stocks II. 98, 1015.
— arborescens Lam. II. 95, **1016.**
— — Prain II. 97.
— — alhescens Bois II. 95.
— — amurensis Max. II. 95.
— — arenaria Sims II. 95.
— — cuneilolia C. S. II. 95.
— — Iruticosa Dipp. II. 95, 1016.
— — Lorhergi Koeh. II. 95.
— — lutescens Zhl. II. 95.
— — × microphylla II. 1016.
— — nana Ht. Späth II. 95.
— — pendula Dipp. II. 95.
— — sophoraelolia Dipp. II. 95.
— — typica C. S. II. 95.
— — — Lorbergi C. S. II. 95.
— — — sophoraelolia C. S. II. 95.
— arenaria Dipp. II. 102.
— — Loud. II. 95.
— argentea Lam. II. 94.
— aurantiaca Koeh. II. 102, 1013.
— halchaschensis Krasn. II. 1012.
— bicolor Kom. II. 1015.
— Boisi C. S. II. 96, 1016.
— brevicalyx Pamp. II. 1012.
— brevilolia Kom. II. 1013.
— brevispina Royle II. 98, 1015.
— Bungei Led. II. 95, 1015.
— — sericea Korsh. II. 1015.
— — viridis Korsh. II. 1015.
— Camilli-Schneideri II. 1013.
— catenata Kom. II. 1015.
— chamlagu Lam. II. 102, 1012.
— chumhica Prain II. 99, 1015.
— conlerta Benth. II. 101, 1014.
— cuneata Mnch. II. 103.
— cuneilolia Dipp. II. 95.
— decorticans Hemsl. II. 97, 1015.
— densa Kom. II. 1013.
— digitata Lam. II. 103.
— erinacea Kom. II. 1014.
— lerox Lam. II. 100.
— Franchetiana Kom. II. 1015.
— Irutescens DC. II. 103.
— — angustilolia DC. II. 102.
— — flor. roscis Turcz. II. 1012.
— — grandiflora Rehd. II. 103.
— — latifolia DC. II. 103.
— — mollis DC. II. 102.
— — turfanensis Krassn. II. 103, 1013.
— frutex K. Koch II. 102, **1013.**
— — grandiflora Koeh. II. 103, 1013.
— — latilolia C. S. II. 103, 1013.
— — mollis C. S. II. 102, 1013.
— — spinescens Rgl. II. 102.
— — suhulata Kom. II. 1013.
— — typica C. S. II. 102, 1013.
— — xerophytica C. S. II. 102, 1013.
— Iruticosa Bess. II. 95, 1016.
— Gerardiana Royle II. 100, 1014.

Digitized by Google

Caragana Gerardiana glabrescens Fr. II. 1015.
— bokoleuca Bge. II. 1014.
— grandiflora DC. II. 110, **1012.**
— — balchaschensis Kom. II. 1012.
— — Biebersteini C. S. II. 101, 1012.
— — songarica Kom. II. 1012.
— — scythica Kom. II. 1012.
— — Steveni C. S. II. 101. 1012.
— incana Herb. II. 102.
— inermis Mnch. II. 95.
— jubata Poir. II. 99, 1015.
— — erecta Rgl. II. 1015.
— — pygmaea Rgl. II. 1015.
— Korshinskyi Kom. II. 1016.
— Kozlowi Kom. II. 1014.
— laeta Kom. II. 1013.
— lencospina Kom. II. 1014.
— Leveilléi Kom. II. 1012.
— Litwinowi Kom. II. 1016
— microphylla Lam. II. 97, 1016.
— — crasse-aculeata Bois II. 96
— — dahurica Kom. II. 97.
— — megalantha C. S. II. 97.
— — manshurica Kom. II. 97.
— manshurica Kom. II. 1016.
— Maximowicziana Kom. II. 1014.
— mollis Bess. II. 102, 1013.
— Moorcroftiana Benth. II. 18.
— opulens Kom. II. 1013.
— pekinensis Kom. II. 1016.
— pendula Ht. II. 102.
— polourensis Kom. II. 1013.
— polyacantha Royle II. 98, 1015.
— Potanini Kom. II. 1016.
— Praini C. S. II. 97, 1015.
— pruinosa Kom. II. 1014.
— pygmaea DC. II. 101, **1013.**
— — acicularis Kom. II. 1013.
— — altaica Kom. II. 1013.
— — angustissima C. S. II. 102, 1013.
— — arenaria Fisch. II. 102.
— — aurantiaca erecta Ht. II. 102.
— — canescens Herb. II. 102.
— — grandiflora Dipp. II. 101.
— — onratensis Kom. II. 1013.
— — Pallasiana Kom. II. 1013.
— — typica C. S. II. 102.
— — viridissima Kom. II. 1013.
— Redoffski Kirchn. II. 95.
— Redowski DC. II. 95.
— — Fisch. [et Koch.] II. 95, 1016.
— Roborowskyi Kom. II. 1014
— rosea Turcz. II 1012.
— sericea Pamp. II. 1016
— sophoraelolia Bess. II. 1016.
— — Hort. II. 95.
— spinifera Kom. II. 1014.
— spinosa DC. II. 100, 1014.
— — × tragacanthoides II. 1014.
— spinosissima Benth. II. 99, 1014.
— — K. Koch II. 100.
— stipitata Kom. II. 1015.
— sukiensis C. S. II. 99, 1015.
— tangutica Max. II. 1015.
— tibetica Kom. II. 1014.
Caragana tragacanthoides Poir. II. 99.
— — Bongardiana F. et M. II. 100, 1014.
— — leucophylla F. et M. II. 100, 1014.
— — Pallasiana F. et M. II. 100, 1014.
— — pleiophylla Rgl. II. 1014.
— — tibetica Maxim. II. 100, 1014.
— — villosa Rgl. II. 1014.
— triflora Ldl. II. 1015.
— turcestanica Kom. II. 1015.
— turfanensis Krassn. II. 1013.
— ulicina Stocks II. 99, 1015.
— versicolor Benth. II. 1013.
— Zahlbruckneri C. S. II. 96, 1016
Cardiandra S. et Z. 383.
— alternifolia S. et Z. 383.
— — mirabilis Tak. II. 937.
Carlomohria Greene II. 582.
Carmichaelia R. Br. II. 79.
— australis R. Br. II. 79.
— flagelliformis Col. II. 79.
— odorata Col. II. 79.
Carpenteria Torr. 361.
— californica Torr. 361.
Carpinus L. 136, II. **892.**
— americana Mchx. 141.
— Betulus L. 139, II. 893.
— — carpinizza Neilr. 140.
— — columnaris Schelle 140.
— — cucullata Kirchn. II. 140.
— — fastigiata Schelle 140.
— — heterophylla Kirchn. 140.
— — incisa Ait. II. 140.
— — pendula Kirchn. 140.
— — purpurea Dipp. II. 140.
— — pyramidalis Dipp. 140.
— — — cucullata C. S. 140.
— — quercifolia Desf. II. 140.
— — serrata Beck 140.
— — — albo-variegata C. S. 140.
— — — aureo-variegata C. S. 140.
— — — horizontalis C. S. 140.
— — — incisa C. S. 140.
— — — purpurea C. S. 140.
— — — quercifolia C. S. 140.
— — virginiana Marsh. 141.
— caroliniana Walt. 140, II. 893.
— carpinizza Kit. 140.
— Carpinus Sarg. 137.
— cordata Bl. 137.
— — chinensis Fr. II. 892.
— Davidii C. S. II. 893.
— duinensis Scop. 141.
— edentula W. et K. 140.
— Fargesii Fr. II. 894.
— intermedia Wierzb. 140.
— japonica Bl. 137, 804.
— — cordifolia Wkl. II. 892.
— laxilolia Bl. 138, II. **894.**
— — Fr. II. 893.
— — Davidii Fr. II. 893.
— — Fargesii Burk. II. 894.
— — macrostachya Oliv. II. 894.
— Londoniana Wkl. II. 894.
— macrocarpa Wkl. II. 895.
— orientalis Mill. 141, II. 895.
— — macrocarpa Willk. II. 895.

Carpinus Ostrya L. 143.
— oxycarpa Wkl. II. 893.
— Paxii Wkl. II. 895.
— pubescens Burk. II. 895.
— schuschaeensis Wkl. II. 893.
— Seemeniana Diels II. 895.
— stipulata Wkl. II. 895.
— Turczaninowii Hance II. 895.
— viminea Ldl. II. 894.
— virginiana Mill. 143.
— vulgaris Mill. 140.
— yedoënsis Max. 138.
Carrierea Franch. II. 362, 1038.
— calycina Franch. II. 362.
— Dunniana Lév. II. 1038.
Carya Nutt. 76, **803**.
— alba K. Koch 82, 803.
— — Nutt. 80.
— — × Pecan 803.
— — × tomentosa 78.
— amara Nutt. 78.
— aquatica Nutt. 78, 803, II. 872.
— borealis C. S. 803.
— carolinae-septentrionalis C. S 803.
— cordiformis C. S. 803, II. 1008.
— — × Pecan 803.
— glabra Spach 803, II. **872**.
— — microcarpa C. S. 803.
— — villosa Rob. II. 872.
— illinoënsis K. Koch 77.
— laciniosa C. S. 804.
— — × Pecan 803.
— microcarpa Nutt. 79.
— myristicaeformis Nutt. 78, 803.
— olivaeformis Nutt. 77.
— ovata C. S. 803.
— Pekan Engl. et Gr. 803, II. 1008.
— porcina Nutt. 79.
— sulcata Nutt. 83.
— — × tomentosa 78.
— texana DC. 77.
— tomentosa Nutt. 82.
— villosa C. S. 803.
Caryopteris Bunge II. 595.
— divaricata Maxim. II. 596.
— incana Miqu. II. 595.
— — candida C. Schn. II. 596.
— Mastacantbus Schauer II. 595.
— — candida Schelle II. 596.
— mongolica Bge. II. 597.
— sinensis Dipp. II. 596.
— tangutica Maxim. II. 596.
Cassandra D. Don II. 534.
— angustilolia Don II. 534.
— calyculata Don II. 534.
— — angustifolia Gray II. 534.
— racemosa Spach II. 528.
Cassine caroliniana Lam. II. 165
— — Walt. II. 169.
Cassinia R. Br. II. 760.
— Iulvida Hook. II. 760.
— Vauvilliersii Hook. F. II. 760.
Cassiope D. Don II. 523.
— ericoides Don II. 523.
— fastigiata D. Don II. 523.
Cassiope hypnoides Don II. 524.
— — lycopodioides Don II. 523.
— Mertensiana Don II. 524.
— Redowskii Don II. 523.
— selaginoides Hook. II. 523.
— Stelleriana DC. II. 524.
— tetragona Don II. 523.
Castanea Mill. 156, II. **898**.
— alnifolia Nutt. II. 899.
— americana Raf. 156.
— Bungeana Bl. II. 899.
— Castanea Karst. 156.
— — argenteo-variegata C. S. 157.
— — asplenifolia C. S. 157.
— — aureomaculata C. S. 157.
— — cochleata C. S. 157.
— — glabra C. S. 157
— — pendulifolia C. S. 157
— — prolifera C. S. 157.
— — pubinervis Sarg. 159.
— chrysophylla Hook. 159.
— crenata S. et Z. 158, 804, II. 899.
— Davidii Dode II. 899.
— dentata Borkh. 156, II. 899.
— — × pumila II. 899.
— Duclouxii Dode II. 899.
— Fargesii Dode II. 899.
— bupehensis Dode II. 899.
— japonica Bl. 159, II. 899.
— mollissima Bl. II. 899.
— nana Muehl. 159.
— neglecta Dode II. 899.
— pubinervis C. S. 158, 804.
— pumila Mill. 159, II. 899.
— sativa Mill. 157, 804, II. 899.
— — argenteo-variegata C. S. 157.
— — asplenifolia C. S. 157.
— — aureo-maculata C. S. 157.
— — cochleata C. S. 157.
— — glabra C. S. 157.
— — monstrosa Dipp. 157.
— — pendulifolia C. S. 157.
— — prolifera K. Koch 157.
— — pubinervis Mak. II. 899.
— Seguinii Dode II. 899.
— stricta S. et Z. 159.
— vesca Bl. 159.
— — Gaertn. 156.
— — americana Mchx. 156
— — asplenifolia Lodd. 157.
— — cochleata Lodd. 157.
— — fol. arg.-var. Kirchn. 157.
— — — aur.-mac. Kirchn. 157.
— — glabra Lodd. 157.
— — pubinervis Hassk. 159.
— Vilmoriniana Dode II. 899.
— vulgaris Lam. 157.
Castanopsis Spach 159.
— chrysophylla A. DC. 159.
Catalpa Scop. II. 623.
— bignonioides Walt. II. 623.
— — aurea Lavallée II. 624.
— — Kaempferi DC. II. 625.
— — × Kaempferi II. 625.
— — Koehnei Hesse II. 624.
— — nana Bur. II. 624

Catalpa bignonioides × ovata II. 625.
— — purpurea Rehd. II. 624.
— — umbraculifera Bur. II. 626.
— — variegata Bur. II. 624.
— Bungei C. A. Meyer II. 626.
— — Hort. II. 626.
— — heterophylla C. A. Meyer II. 627.
— — nana Dode II. 626.
— — — Lav. II. 625.
— — umbraculifera Dode II. 626.
— Catalpa Karst. II. 625.
— cordifolia Jaume II. 625.
— — Moench II. 625.
— Duclouxii Dode II. 625, 1054.
— erubescens Carr. II. 625.
— — purpurea Dode II. 625.
— Fargesi Bureau II. 627, 1054.
— Galleana Dode II. 625.
— Henryi Dode II. 625, 1054
— heterophylla Dode II. 627.
— hybrida Späth II. 625.
— japonica Dode II. 625.
— Kaempferi S. et Z. II. 625.
— nana Hort. II. 626.
— ovata Don II. 625, 1054.
— — × speciosa II. 625.
— speciosa Warder II. 625.
— — albovariegata Schwer. II. 1054
— — atropurpurea Hort. II. 625.
— sutchuenensis Dode II. 627, 1054.
— syringaefolia Bunge II. 627.
— — Sims II. 625.
— — nana Kirchn. II. 624.
— Teasi Penhallow II. 625.
— Teasiana Dode II. 625.
— umbraculifera Hort. II. 626.
— vestita Diels II. 627.
Cayratia Juss. II. 1032.
— japonica Gagnep. II. 1032.
Ceanothus L. II. 291.
— americanus L. II. 293.
— — × azureus II. 294.
— — intermedius Trel. II. 293.
— — × thyrsiflorus II. 294.
— Andersonii Parry II. 297.
— Arnouldi Koeh. II. 294.
— azureus Desf. II. 295.
— cuneatus Nutt. II. 298.
— dentatus Torr. et Gr. II. 297.
— — × thyrsiflorus II. 294.
— divaricatus Nutt. II. 296.
— Fendleri Gray II. 296.
— hirsutus Nutt. II. 294.
— hybridus Hort. II. 294.
— integerrimus Auct. II. 297.
— — Hook. et Arn. II. 297.
— intermedius Hort. II. 292.
— — Pursh II. 293.
— Lobbianus Hook. II. 294.
— microphyllus Hort. 295.
— — Michx. II. 295.
— mollissimus Torr. II. 292.
— nevadensis Kellogg II. 297.
— oregonus Nutt. II. 292.
— ovalis Big. II. 292.
— — var. β Torr. et Gr. II. 292.
Ceanothus ovatus Desf. II. 292.
— — roseus Carr. II. 294.
— — × thyrsiflorus II. 292.
— pallidus Hort. II. 292.
— papillosus Torr. et Gr. II 297.
— perennis Pursh II. 294.
— prostratus Bentb. II. 298.
— pubescens Rydb. II. 292.
— rigidus Nutt. II. 298.
— — × thyrsiflorus II. 294.
— roseus Koeh. II. 294.
— sanguineus Pursh II. 292.
— — × thyrsiflorus II. 292.
— thyrsiflorus Eschs. II. 294
— trinervus Moench II 294.
— Veitchianus Hook. II. 294
— velutinus Dougl. II. 294.
— verrucosus Hook. II. 298.
— versaillensis C. S. II. 295.
Cebatha Forsk. 326.
— carolina Koeh. 327.
— orbiculata Ktze. 327.
— — triloba C. S. 327.
— — typica C. S. 327.
— virginica Ktze. 327.
Cedrela P. Br. II. 131.
— sinensis Juss. II. 132.
Celastrus L. II. 182, **1025.**
— alatus Thbg. II. 172, 1023.
— angulata Maxim. II. 184.
— articulata DC. II. 183.
— — punctata Mak. II. 1025.
— ciliidens Miqu. II. 183.
— dependens Wall. II. 185.
— flagellaris Rupr. II. 183.
— hypoglauca Hemsl. II. 185.
— hypoleuca Warb. II. 185.
— japonica K. Koch II. 122.
— kiusianus Fr. et Sav. II. 1025
— latifolia Hemsl. II. 184, **1025.**
— orbiculata Thbg. II. 183.
— — punctata Rehd. II. 184.
— paniculata Willd. II. 185, 1025.
— punctata Thbg. II. 184, 1025.
— scandens L. II. 185.
— striatus Thbg. II. 172, 1023.
Celtis L. 228.
— australis L. 231.
— betulaefolia Vandas 231.
— Bungeana Bl. 228.
— caucasica Willd. 231.
— crassifolia Lam. 232, 233.
— Davidiana Carr. 228.
— georgiana Small 233.
— glabrata Stev. 231.
— Helleri Small 233.
— japonica Planch. 229.
— koraiensis Nak. II. 905.
— laevigata W. 234.
— mississippiensis Bosc 233, 234.
— — reticulata Sarg. 234
— Muku Sieb. 227.
— orientalis Mill. 231.
— — Thbg. 229.
— — occidentalis L. 232, 233

Celtis integrifolia Nutt. 234.
— — pumila Muehl. 234.
— — reticulata Sarg. 234.
— — tenuifolia Pers. 234.
— pumila Pursh 233.
— Tournefortii Lam. 231.
— — aetnensis Tenore 229.
— — hetulaefolia C. S. 231.
— — glabrata Boiss. 231.
— reticulata Torr. 233, 234.
— sinensis Pers. 228.
— Smallii Beadle 233.
— tenuifolia Nutt. 234.
— Willdenowiana R. et Sch. 229.

Centrosema virginianum L. II. 114.

Cephalanthus L. II. 630.
— angustifolius Ht. II. 630.
— occidentalis L. II. 630.
— — angustifolius André II. 630.

Cerasaidos apetala S. et Z. 608.

Cerasus Juss 601.
— acida cucullata Kirchn. 616.
— — fl. pl. Kirchn. 606.
— — fol. variag. Kirchn. 606.
— — Rhexi Kirchn. 616.
— acuminata Wall. 649.
— avium Moench 616.
— — asplenifolia Kirchn. 616.
— — fl. pl. Kirchn. 616.
— — pendula Kirchn. 616.
— Boissieri Hasku. 604.
— horealis Mchx. 619.
— brachypetala Boiss. 604.
— brasiliensis Ch. et Schl. 648.
— calilornica Greene 618.
— Capollin DC. 614.
— capricida Wall. 646.
— caproniana DC. 615.
— — fl. ros. pl. V. Htte. 617.
— Capuli Ser. 645.
— caroliniana Mchx. 650.
— chamaecerasus Lois. 614.
— cornuta Wall. 639.
— decumana De Lann. 616.
— demissa Nutt. 642, II. 993.
— — melanocarpa Nels. II. 993.
— diffusa B. et H. 606.
— Duerincki Mart. 642.
— dulcis Gaertn. 616.
— duracina DC. 616.
— effusa Host 616.
— emarginata Dougl. 618.
— Fontanesiana Spach 617.
— glandulosa Kell. 618.
— — Lois. 612.
— glauca Moench 613.
— glaucifolia Wall. 639.
— Griffithi Boiss. 603.
— hippophaeoides Bornm. 603.
— humilis Host 614.
— ilicifolia Nutt. 648.
— incana Spach 603.
— — angustifolia Spach 603.
— — latifolia Spach 603.
— — viridis Spach 603.
— — vulgaris Spach 603.

Cerasus incisa Boiss. 604.
— — Lois. 608.
— integrifolia Presl 648.
— intermedia Host 614.
— Jacquemonti Bus. 601.
— japonica Lois. 612.
— Juliana DC. 616.
— Lannesiana Carr. 611, II. 984.
— Lanrocerasus Lois. 647. [4–1
— — brachystachia Medw. et Alh. 647.
— — laurilolia Alb. 647.
— Lindleyana Wall. 639.
— lusitanica Lois. 646.
— Mahaleb Mill. 617.
— marasca Host 615.
— martabanica Wall. 648.
— microcarpa Boiss. 606.
— mollis Dougl. 618.
— napaulensis Ser. 639.
— nigra Lois. II. 989.
— — Mill. 616.
— nigricans Ehrh. 616.
— orientalis Spach 606.
— Padus DC. 640.
— — aucuhaefolia Kirchn. 640.
— — bracteosa Ser. 640.
— pectinata Spach II. 976.
— pendula Sieb. II. 9 82.
— — rosea Dombr. II. 982.
— pennsylvanica Lois. 619.
— persicifolia Lois. 619.
— phoshia Hamilt. 606.
— prostrata Lois. 604.
— pseudocerasus Don II. 983.
— — „James Veitch" Hort. II. 984.
— puhescens Ser. II. 990.
— puddum Wall. 606.
— pumila Mchx. 613.
— rufa Wall. 609.
— salicifolia DC. 645.
— semperflorens DC. 616.
— serotina Lois. 643.
— — asplenifolia Kirchn. 643.
— — cartilaginea Kirchn. 643, II. 991.
— serratifolia Ldl. 611.
— serrulata Don II. 984.
— Sieboldi Carr. 611, II. 938.
— tomentosa Wall. 602.
— tortuosa B. et H. 605.
— umbellata Torr. et Gr. 625.
— undulata Ser. 646.
— virginiana Lois. 643.
— — pendula Kirchn. 643.
— vulgaris Mill. 616.

Ceratonia L. II. 8.
— Siliqua L. II. 8.

Ceratostigma Bunge II. 572.
— plumbaginoides Bunge II. 572.

Cercidiphyllum S. et Z. 424.
— japonicum S. et Z. 424.
— ovale Max. 425.

Cercis L. II. 4.
— californica Torr. II. 7.
— canadensis L. II. 5.
— — alba Rehd. II. 1008.
— — fl. pleno Zhl. II. 5.

Cercis canadensis plena C. S. II. 5.
— — pubescens Pursh II. 6.
— chinensis Bge. II. 5.
— glabra Pamp. II. 1008.
— Griffithii Bois. II. 7.
— japonica Sieb. II. 5.
— occidentalis Auct. II. 6.
— — Torr. II. 7.
— — texensis Wats. II. 6.
— racemosa Oliv. II. 4.
— reniformis Englm. II. 6.
— Siliqnastrum L. II. 7.
— — alba Carr. II. 1008.
— — albida C. S. II. 8.
— — fl. albido Lond. II. 8.
— — parviflora DC. II. 7.
— texensis Sarg. II. 6.
Cercocarpus Kunth 529.
— arizonicus Jones 532.
— betulaefolius Nutt. 531.
— — minor C. S. 531.
— — typicus C. S. 531.
— betuloides Nutt. 531.
— breviflorus Gr. 530.
— — eximius C. S. 530.
— fothergilloides Kunth 530.
— intricatus Wats. 532.
— ledifolius Nutt. 532.
— macrophyllus C. S. 530.
— mojadensis C. S. 530.
— parvifolius Nutt. 532.
— — betuloides Sarg. 531.
— — glaber Wats. 531.
— — birsutissimus C. S. 532.
— — minimus C. S. 532.
— — paucidentatus Wats. 532.
— paucidentatus Britt. 532.
— Traskiae Eastw. 530.
— Trelcasei C. S. 530.
Cestrum L. II. 614.
— Parqui L'Hèr. II. 614.
Chaenomeles Ldl. 728, 808, II. 1001.
— alpina Koeh. 731.
— catbayensis C. S. 730.
— japonica Ldl. 730, II. 1001.
— — alpina Max. 731.
— — Maulei Lav. 731.
— — × Maulei 731.
— — pygmaea Max. 731.
— Lagenaria Koidz. II. 1001.
— Maulei C. S. 731, II. 1001.
— — alpina C. S. 731.
— — typica C. S. 731.
— sinensis Koeh. 728.
Chamaebatia Benth. 532.
— foliolosa B. 532.
Chamaebatiaria Max. 491.
— millefolinm Max. 491.
Chamaebuxus alpestris Spach II. 134.
— — heterocbroa Borb. II. 134.
Chamaecerasus Alberti Carr. II. 686.
— alpigenus Del. II. 707.
— — nana Carr. II. 707.
— coerulea Delarb. II. 695.
— dumetorum Del. II. 722.
— — Dum. de Cours. II. 722.
— iberica Bill. II. 697.
Chamaecerasus Ledebourii Bill. II. 705.
— Niaguarilli Ht. II. 698.
— nigra Del. II. 715.
— pyrenaica Bill. II. 704.
— Standishii Lesc. II. 698.
— tataricus Bill. II. 717.
— Xylosteum Bill. II. 722.
Chamaecistus Oeder II. 513.
— procumbens O. Ktze. II. 513.
Chamaedaphne Mönch II. 534.
— calyculata Mnch. II. 534.
— — angustifolia Rehd. II. 534.
— — nana Rehd. II. 534.
Chamaeledon Link II. 513.
Chamaemeles Ldl. 761.
— coriacea Ldl. 761.
— mexicana Baill. 708.
Chamaespartium Adans. II. 35.
Chamitea Kern. 40.
— reticulata Kern. 40.
Chenopodium angustatum All. 264.
— fruticosum L. 267.
Chesneya II. 94.
Chilopsis Don II. 621.
— linearis DC. II. 621.
— saligna Don II. 621.
Chimaphila Pursh II. 464.
— astyla Maxim. II. 466.
— corymbosa Pursh II. 465.
— japonica Miqu. II. 466.
— maculata Pursh II. 465.
— Menziesii Spreng. II. 466.
— umbellata Nutt. II. 465.
Chimonanthus Ldl. 346, II. 928.
— fragrans Ldl. 347.
— — grandiflorus Ldl. II. 928.
— praecox Lk. 346.
— — concolor Mak. II. 928.
— — grandiflorus Mak. II. 928.
Chlogenes Salisb. II. 539.
— hispidula Torr. et Gr. II. 539.
— — japonica Mak. II. 539.
— japonica A. Gray II. 539.
— serpyllifolia Salisb. II. 539.
Chionanthus L. II. 792.
— chinensis Maxim. II. 793.
— cotinifolia Willd. II. 793.
— maritima Raf. II. 793.
— retusa Ldl. et Paxt. II. 793.
— trifida Mnch. II. 793.
— vernalis Salisb. II. 793.
— virginica L. II. 792.
Chiranthodendron californicum Baill. II. 392.
Chloromeles sempervirens Decne. 725.
Choenomeles Ldl. 728, 808.
Choisya Kunth II. 122.
— grandiflora Regel II. 122.
— ternata Kunth II. 122.
Chondrophora nauseosa Britt. II. 755.
Chondrospermum smilacifolium Wall. II. 841.
Chrysobotrya Spach 416, II. 953.
— intermedia Sp. II. 953.
— Lindleyana Sp. II. 953.
— revoluta Sp. II. 953.
Chrysocoma graveolens Nutt. II. 755.

Chrysocoma nauseosa Pursh If 755.
Chrysothamnus nauseosus B. et B. II. 755.
— puberulus Greene II. 755.
— pumilus Nutt. II. 755.
— viscidiflorus Nutt. If. 755.
Cionura erecta Grisb. II. 853.
Cissus L. II. 300, 1032.
— aegyrophylla Bge. II. 318.
— bipinnata Ht. II. 1034.
— brevipedunculata Maxim. II. 319.
— cantoniensis Hk. et Arn. II. 1032.
— capreolata Roy. If. 312.
— elegans Ht. If. 320.
— hederacea Pers. ff. 317.
— — hirsuta Pursh II. 317.
— japonica Willd. If. 300, **1032.**
— obtecta Wall. II. 313.
— orientalis Lam. II. 321.
— quinquefolia Sims fI. 315.
— serrulata Roxh. II. 313.
— stans Pers. fI. 322.
— striata R. et P. If. 300.
— vitifolia Boiss. II. 318.
Cistus L. If. 346.
— alhidus L. II. 347.
— alpestris Jacqu. If. 355.
— apenninus L. II. 351.
— arabicns L. If. 356.
— canadensis L. If. 350.
— canus L. If. 353.
— corsicus Lois. fI. 348.
— creticus L. II. 348.
— cyprius angustifolius Willk. II. 348.
— florihundus Tausch If. 349.
— foetidus Jacqu. ff. 352.
— Fumana L. II. 355.
— glutinosus L. If. 356.
— grandiflorus Scop. If. 352.
— Helianthemum L. II. 352.
— hirsutus Thuifl. ff. 351.
— incanus Savi II. 348.
— italicus L. II. 354.
— ladaniferns L. ff. 348.
— — albiflorns Dun. fI. 348.
— — maculatus Dun. If. 348.
— — — angustifolius C. S. fI. 348.
— — stenophyllus Gross. fI. 348.
— laurifolius L. II. 349.
— monspeliensis L. If. 347.
— nudifolius Lam. II. 355, 1038.
— nummularius L. ff. 352.
— oelandicus L. ff. 353.
— pilosus L. fI 348.
— polifolius L. ff. 351, 1038.
— pulverulentus Thuill. II. 351.
— roseus Jacqu. ff. 351.
— salvifolius L. II. 348.
— — hiflorus Willk. If. 348.
— — cymosus Gross. ff. 348.
— — macrocalyx Willk. If. 348.
— — vnlgaris Willk. fI. 348.
— — — biflorus Gross. II. 348.
— — — hrevipedunculatus Willk. II. 348.
— — — cymosus Gross. II. 348.
Clstus salvifolius vulgaris longipedunculatus Willk. ff. 348.
— serpyllifolius Crtz. II. 351.
— stenophyllus Link II. 348.
— thymifolius L. ff. 356.
— tomentosus Smith If. 352.
— villosus L. II. 347.
— — villosus Janch. If. 348.
— — corsicus Grosser If. 348.
— — creticus Boiss. If. 348.
— — incanus Spach II. 348.
— vinealis Willd. fI. 353.
— vulgaris villosus Spach If. 348.
Cftharexylon cyanocarpum Hk. et Arn II. 590.
— ligustrinum Dipp. II. 590.
Citrus L. II. 128.
— Aurantium L. If. 129.
— — × trifoliata If. 1019.
— japonica Hook. fI. 129.
— — Thbg. II. 129.
— medica L. If. 129.
— — Limonum Hook. If. 129.
— nobilis Lour. II. 129.
— sinensis Engl. If. 129.
— trifolia Thbg. II. 129.
— trifoliata L. II. 128.
— triptera Desf. II. 1019.
Cladothamnus Bong. ff. 467.
— campanulatus Greene fI. 468.
— pyrolaeflorus Bong. If. 467, 1042.
Cladrastis Raf. II. 16.
— amurensis Benth. et H. II. 16.
— — Buergeri Max. fI. 16.
— — floribunda Shir. II. 16.
— fragrans Raf. fI. 16.
— lutea Koch II. 16.
— platycarpa Mak. ff. 16.
— Shikokiana Mak. II. 17.
— sinensis Hemsl. fI. 16, **1008.**
— Tashiroi ftabe If. 16.
— tinctoria Raf. II. 16.
Cfematis L. 273, fI. **908**
— Addisonii Britt. 277.
— aethusaefolia Turcz. 283.
— — latisecta Max. 283.
— alpina Milf. 284.
— — occidentalis Gray 284.
— — sibirica Ktze. 284.
— — Wenderothii Steud. 283.
— anemonoides Don 290.
— — Houtt. 287.
— angustifolia Jacq. 288.
— apiifolia DC. 290.
— — praecox Sim.-Louis 290.
— Armandi Fr. fI. 910.
— aromatica Lenné 279.
— balearica Rich. ff. 909.
— banatica Schur 291.
— Bergeroni Lav. ff. 909.
— hiternata DC. 291.
— hrevicaudata DC. 291.
— brevifolia Howell 292.
— Buchaniana DC. 283, fI. **909**
— — vitifolia Henry If. 909.
— calyculata Ift. II. 909.
— campaniflora Brot. 285.

Clematis campaniflora × viticella 286.
— campestris St.-Hil. 292.
— canadensis Mill. 292.
— Catesbyana Pursh 292.
— chrysocoma Fr. II. 910.
— cirrhosa L. II. 909.
— coccinea Engl. 277.
— — × Jackmani 279.
— — × Pitcheri II. 909.
— coccineo-Pitcheri Mor. II. 909.
— coerulea Ldl. 288.
— connata DC. 283, II. 909.
— cordata Pursh 292.
— — ligusticifolia Nutt. 292.
— cordifolia Moench 292.
— crispa L. 276.
— — × integrifolia 279.
— — × Viticella 279.
— — Walteri Gray 276.
— cylindrica Sims 279.
— Davidiana Decne. 281.
— — bybrida II. 909.
— — × stans II. 909.
— — × Vitalba 283.
— divaricata Jacq. 279.
— Drummondii S. et Gr. 292.
— Durandi Dur. 279, II. 909.
— eriopoda Koch. 294.
— eriostemon Decne. 279.
— flaccida Small 277.
— Flammula L 288.
— — caespitosa Rchb. 289.
— — × integrifolia 279.
— — rotundifolia DC. 289.
— — rubromarginata Cripps II. 909.
— — tricomposita Ktze. 289.
— — × Viticella 286.
— flava Moench 294.
— florida Thbg. 286.
— — venosa Lav. 286.
— — × Viticella 286.
— Fortunei Moore 286, II. **909**.
— fragrans Ten. 289.
— Fremonti Wats. 276.
— fusca Turcz. 277.
— — violacea Max. 279.
— Gattingeri Small 276.
— Gebleriana Bong. 288.
— glauca W. 293.
— glaucophylla Small 277.
— grata Ht. 283.
— — Wall. 290.
— graveolens L. 294.
— Guascoi Lem. 286.
— hakonensis Fr. et Sav. 286.
— Hendersoni Koch 279.
— — × lanuginosa 279.
— heracleifolia DC. 281.
— Hookeri Decne. 281.
— iantbina Koch. 279.
— integrifolia L. 276.
— — alba Ht. 276.
— — × Jackmani II. 909.
— — × lanuginosa 279.
— — semperflorens Ht. 279.
— — × viorna 279.
— — × Viticella 279, 909.
Clematis integrifolia × Viticella × lanuginosa 279.
— intermedia Bon. 279.
— Jackmani Moore 279, II. 909.
— japonica Thbg. 284.
— Jouiniana C. S. 283.
— Kousabotan Decne. 281.
— lanuginosa Ldl. 286.
— — × Viticella 279, 286.
— latisecta Prtl. 283.
— Lavallei Decne. 283.
— — × stans 281.
— ligusticifolia Nutt. 292.
— — brevifolia Nutt. 292.
— longecaudata Ledeb. 294.
— macropetala Led. 285.
— maritima L. 288.
— mendozina Phil. 292.
— Meyeniana Walp. II. 910.
— missouriensis Rydb. 292.
— montana Buch. 290, II. **909**.
— — anemoniflora Ktze. 290.
— — grandiflora Hook. 290.
— — lilacina Lem. II 909.
— — normalis rubens Ktze. II. 909.
— — perfecta Lem. II. 909.
— — rubens Jouin II. 909.
— — Wilsoni Sprag. II. 909.
— nutans Ilt. II. 909.
— — Royle II. 909.
— obliqua C. S. 277.
— ochroleuca Ait. 276.
— orientalis L. 294.
— — longecaudata Boiss. 294.
— — normalis Ktze. 293.
— — tangutica Max. 294.
— ovata Ht. 276.
— paniculata Thbg. 289.
— parviflora DC. 286.
— patens Mor. et Decne. 288.
— — × Viticella 286, II. 909.
— Pitcheri T. et Gr. 276.
— polymorpha Viv. II. 909.
— pseudococcinea C. S. 279.
— pulchella Pers. 285.
— recta L. 288.
— repens F. et G. II. 908.
— — Ht. II. 909.
— reticulata Walt. 277.
— revoluta Desf. 286.
— Robertsiana Aitch. et Hemsl. 283.
— rubiginosa Ht. 286.
— rubromarginata Jouin II. 909.
— scandens Hut. 285.
— serratifolia Rehd. II. 911.
— sibirica Mill. 284.
— Sieboldi Don 287.
— Simsii Sweet 276.
— songarica Bge. 288.
— — Gebleriana Ktze. 288.
— — integrifolia Trautv. 288.
— — serratifolia Trautv. 288.
— splendida Sim.-Louis 279.
— stans Sieb. et. Zucc. 281.
— — Konsabotan C. S. 281.
— — Lavallei C. S. 281
— suaveolens Salisb. 289.

Clematis Suksdorfii Rob. 292.
— tangutica Andr. 294.
— taurica Bess. 291.
— tenuifolia Royle 294.
— texensis Buckl. 277.
— tubulosa Turcz. 281.
— — Hookeri C. S. 281.
— venosa Kramp. 286, II. **909**.
— — Royle 286.
— versicolor Small 277.
— verticillaris DC. 283.
— violacea DC. 286.
— Viorna L. 277.
— viornoides Britt. 277.
— virginiana L. 292.
— virginica Pursh 292.
— Vitalba L. 291.
— — syriaca Boiss. 291.
— — taurica Ktze. 291.
— Viticella L. 285.
— — campaniflora W. et Lge. 285.
— — nana Carr. 285.
— — normalis villosa Ktze. 285.
— — — albiflora Ktze. 285.
— — — gigantiflora Ktze. 285.
— — — maxima Ktze. 285.
— — — pulchella Ktze. 285.
— — pilostylis Ktze. 285.
— Walteri Pursh 276.
Clematoclethra Maxim. II. 1034.
— Hemsleyi Baill. II. 1034.
— tomentella Fr. II. 1034.
Clerodendron L. II. 595.
— Bungei Steud. II. 595.
— divaricatum S. et Z. II. 596.
— Fargesii Dode II. 1048.
— foetidum Bge. II. 595.
— serotinum Ht. II. 595.
— trichotomum Thbg. II. 595.
— — Fargesii Ht. II. 1048.
Clethra L. II. 461.
— acuminata Mchx. II. 462.
— — × alnifolia II. 462.
— alnifolia L. II. 463.
— — rosea Rehd. II. 463.
— — paniculata Rehd. II. 464.
— — pubescens Ait. II. 462.
— — tomentosa Mchx. II. 462.
— — × tomentosa II. 463.
— arborea Ait. II. 464.
— barbinervis S. et Z. II. 464.
— canescens Auct. II. 464.
— Delavayi Franch. II. 464.
— Fargesii Franch. II. 464.
— incana Pers. II. 462.
— paniculata Ait. II. 464.
— pubescens Willd. II. 462.
— scabra Pers. II. 462.
— tomentosa Lam. II. 462.
Clethropsis nepalensis Spach II. 889.
— nitida Spach II 889.
Cleyera japonica Ht. II. 1035.
— — S. et Z. II. 1035.
— ochnacea DC. II. 1035.
Cliftonia Banks II. 157.
— monophylla Britt. II. 157.
Cliftonia nitida Gaertn. II. 157.
Clinopodium graecum Brand II. 604.
— rupestre Brand II. 603.
Clistoyucca Trel. II. 859.
— arborescens Trel. II. 859.
Cneorum L. II. 116.
— tricoccum L. II. 116.
Cocculus DC. 326, 806.
— carolinus DC. 327, **806**.
— diversifolius Miq. 326, II. 925.
— heterophyllus H. et W. II. 925.
— japonicus Ht. 328.
— orbiculatus C. S. 806.
— Thunbergii DC. 327.
— trilobus DC. 327.
Coleogyne Torr. 533.
— ramosissima Torr. 533.
Colletia Comm. II. 300.
— cruciata Hook. et Arn. II. 300.
— horrida Ht. II. 300.
— longispina Hook. II. 299.
— ulicina Gill. et Hook. II. 300.
Colutea L. II. 85.
— abyssinica Kth. et Bché. II. 93.
— annua Murr. II. 93.
— aperta Moench II. 93.
— arborescens L. II. 87.
— — brevialata Dipp. II. 87.
— — crispa Kirchn. II. 88.
— — melanotricha Freyn II. 88.
— — nepalensis Bak. II. 91.
— — × orientalis II. 89.
— armata Hemsl. et Lace II. 87.
— armena Boiss. et Hnet. II. 90.
— brevialata Lange II. 87.
— cilicica Boiss. et Bal. II. 90.
— cruenta Ait. II. 93.
— Delavayi Franch. II. 92.
— gracilis Freyn. et Sint. II. 91.
— halepica Herb. II. 93.
— — Lam. II. 87.
— humilis Scop. II. 93.
— istria Mill. II. 87.
— longialata Koeh. II. 90.
— media Willd. II. 89.
— melanocalyx Boiss. II. 90.
— microphylla Delile II. 87.
— nepalensis Sims II. 91.
— orientalis Mill. II. 89, **92**.
— Paulseni Freyn II. 92.
— persica Boiss. II. 90.
— — Buhsei Boiss. II. 90.
— Pococki Ait. II. 87.
— sanguinea Pall. II. 93.
— uniflora Beck II. 86.
Comandra Nutt. 247.
— elegans Rchb. 247.
Comanthosphace Spenc. le Moore II. 606.
— japonica Le Moore II. 607.
Comarum Salessowi Bge. 525.
Comptonia L'Hér. 73.
— asplenifolia Ait. 74.
— peregrina Coult. 74.
Convolvulus L. II. 585.
— argenteus Lam. II. 585.
— Cneorum L. II. 585.

Coprosma Forst. II. 631.
— acerosa Cunn. II. 631.
— Petriei Cheesem. II. 631
— repens Hook. II. 631.
Corchorus birtus Thbg. 226.
— japonicus Thbg. 502.
— serratus Thbg. 806.
Corchoropsis S. et Z. II. 366.
— crenata S. et Z. II. 366.
Cordia thyrsiflora S. et Z. II. 588.
Corema Don II. 141.
— album Don II. 142.
— Conradi Torr. II. 141.
Corethrodendron scoparium Fisch. et Mey. II. 108.
Coriaria L. II. 142.
— japonica Gray II. 143.
— myrtifolia L. II. 143.
— nepalensis Hort. II. 1021.
— — Wall. II. 143.
— ruscifolia L. II. 142.
— sinica Maxim. II. 143.
— terminalis Hemsl. II. 144. **1020.**
Cornus Spach 683.
— domestica Spach 683.
— florentina Decne. 724.
— Ioliolosa Franch. 683.
— lanata Koeh. 684.
— trilobata Decne. 726.
— Tschonoskii Koidz. II. 1001.
Cornidia R. et P. 393.
— integerrima Hk. et A. 393.
— — Ht. 394.
Cornus L. II. 436, **1041.**
— alba L. II. 439.
— — Wang. II. 440.
— — angustipetala Woll II. 1041.
— — argenteo-marginata Rehd. II. 439.
— — Baileyi Wang. II. 440.
— — Behnschi Schelle II. 440.
— — coloradensis Koeh. II. 440.
— — elata Koeh. II. 440.
— — elongata Koeh. II. 440.
— — flaviramea Späth II. 440.
— — nitida Koeh. II. 440.
— — sibirica Lodd. II. 439.
— — Spaethi C. S. II. 440.
— — — Wittm. II. 440.
— — splendens Demck. II. 1041.
— — stolonifera coloradensis Wang. II. 440.
— — — elata Wang. II. 440.
— — — elongata Wang. II. 440.
— — — flaviramea Wang. II. 440.
— — — nitida Wang. II. 440.
— albida Ehrh. II. 441..
— alterna Marsh. II. 439.
— alternifolia L. II. 438.
— — argentea Rehd. II. 438.
— — umbraculifera Dieck II. 438.
— — — ochroleuca Rehd. II. 439.
— Amomum Ht. II. 447.
— — Mill. II. 447.
— — undulifolia Koeh. II. 448.
— Arnoldiana Rehd. II. 441.
— aspera Wang. II. 446.
Cornus asperifolia Mchx. II. 442.
— australis Auct. II. 450.
— — C. A. Mey. II. 450.
— Baileyi Coult. et Ev. II. 440.
— brachypoda C. A. Mey. II. 444, **1041.**
— — Koch II. 438, 1041.
— Bretschneideri Henry II. 446.
— californica C. A. Mey. II. 441.
— candidissima Marsh. II. 441.
— — Mill. II. 454.
— — × Purpusi II. 441.
— capitata Wall. II. 454.
— chinensis Wang. II. 452.
— cilicica Wang. II. 450.
— circinata L'Hér. II. 443.
— citrifolia Ht. II. 441.
— — Wahlenh. II. 450.
— citrina Ht. II. 448.
— coerulea Lam. II. 448.
— — Meerh. II. 442.
— controversa Hemsl. II. 437, 1041.
— coreana Wang. II. 450.
— corynostylis Koeh. II. 444, 1041
— crispula Hance II. 445.
— cyanocarpos J. F. Gmel. II. 442.
— — Moench II. 448.
— Drummondi Coop. II. 441.
— lastigiata Mchx. II. 442.
— femina Mill. II. 441.
— florida L. II. 453, 1041.
— — pendula Dipp. II. 454.
— — rubra André II. 454, 1042.
— glabrata Benth. II. 444.
— gracilis Koeh. II. 441.
— Hemsleyi C. S. et W. II. 446.
— Hessei Koeh. II. 439.
— ignorata K. Koch II. 448.
— — Shir. II. 444.
— japonica Koeh. II. 454.
— — Thbg. II. 643.
— Koenigi C. S. II. 449.
— Koehneana Wang. II. 450.
— Kousa Bürg. II. 454.
— lanuginosa Mchx. II. 448.
— macrophylla Koeh. II. 438.
— — Wall. II. 444, 1041.
— — Stracheyi Carke II. 444
— mas L. II. 451.
— — albocarpa C. S. II. 451.
— — argenteo-marginata Schelle II. 451.
— — aurea Schelle II. 451.
— — aureo-elegantissima Schel. II. 451.
— — crispa Dipp. II. 451.
— — lanceolata Kirchn. II. 451.
— — macrocarpa Dipp. II. 451.
— — Mietzschii Schwer. II. 1041.
— — nana Dipp. II. 449.
— — — Sim.-Louis II. 451.
— — pyramidalis Dipp. II. 451.
— mascula Lam. II. 451.
— microcarpa Nash II. 443.
— Monbeigi Hemsl. II. 446.
— Nelsoni Rose II. 440.
— nudiflora Dum. II. 451.
— Nuttalli And. II. 454, 1041
— obliqua Raf. II. 1041.

Digitized by Google

Cornus oblongata Ht. II. 441.
— occidentalis Cov. II. 441.
— officinalis S. et Z. II. 451.
— paniculata L'Hér. II. 441.
— paucinervis Hance II. 449.
— plicata Tausch II. 439.
— poliophylla C. S. et W. II. 447.
— Priceae Small II. 443.
— pubescens Nutt. II. 441.
— pumila Koehne II. 449.
— purpurea Tausch II. 440.
— Purpusi Koeh. II. 447, 1041.
— quinquenervis Franch. II. 449.
— racemosa Lam. II. 441.
— rubiginosa Ehrh. II. 448.
— rugosa Lam. II. 443.
— — × stolonifera II. 1041.
— sanguinea Auct. II. 450.
— — L. II. 448.
— — Marsh. II. 440.
— — aureo-marmorata Schwer. II. 1041.
— — australis Koeh. II. 450.
— — candidissima Dipp. II. 449.
— — fol. variegatis Kirchn. II. 449.
— — Mietzschii Schwer. II. 1041.
— — variegata Dipp. II. 448, 1041.
— — viridissima Dieck II. 448.
— scabrida Franch. II. 446.
— Schindleri Wang. II. 447.
— sericea L. II. 448.
— — asperifolia DC. II. 442.
— — occidentalis Torr. et Gray II. 441.
— sessilis Torr. II. 453.
— sibirica Lodd. II. 439.
— — Gouchaulti Carr. II. 440.
— — Kesselringi E. Wolf II. 1041.
— Slavinii Rehd. II. 1041.
— stolonifera Mchx. II. 440.
— — angustipetala C. S. II. 1041.
— — Behnschi C. S. II. 440.
— — coloradensis C. S. II. 440.
— — elata C. S. II. 440.
— — elongata C. S. II. 440.
— — flaviramea Rehd. II. 440.
— — nitida C. S. II. 440.
— — splendens C. S. II. 1041.
— Stracheyi Hemsl. II. 444.
— stricta Lam. II. 441.
— tatarica Mill. II. 439.
— — sibirica Koeh. II. 439.
— Theleriana Ht. II. 444.
— Thelicanis Leh. II. 444.
— tomentulosa Mchx. II. 444.
— Torreyi Wats. II. 441.
— ulotricha C. S. et W. II. 445.
— vernalis Salish. II. 451
— Walteri Wang II. 450.
— Wilsoniana Wang. II. 444.
Corokia A. Cunn. II. 434.
— buddleoides A. Cunn. II. 434.
— Cotoneaster Raoul II. 434.
Coronilla L. II. 105.
— emeroides Boiss. et Sprun. II. 106.
— Emerus L. II. 106.
— — anstriaca Heimerl II. 106.
Coronilla Emerus emeroides Wohlf. II 106.
— — multiflora Celak. II. 106.
— — typica Fiori II. 106.
— juncea L. II. 107.
— stipularis Lam. II. 107.
— valentina L. II. 107.
Corothamnus procumbens Presl II. 48.
Corylopsis S. et Z. 431, II. **954.**
— glabrescens Fr. et S. 432, II. 954.
— glandulifera Hemsl. II. 955.
— Griffithii Hemsl. II. 957.
— Henryi Hemsl. II. 957.
— himalayana Griff. 432, II. 957.
— — Hook. II. 957.
— Kesakii S. et Z. 432.
— macrostachya Pamp. II. 954.
— manipurensis Hemsl. II. 957.
— multiflora Hance 432.
— pauciflora S. et Z. 432, II. 955.
— sinensis Hemsl. II. 955.
— spicata S. et Z. 432, II. 955.
— Veitchiana Bean II. 955.
— Wilsonii Hemsl. II. 955.
Corylus L. 144, II. **895.**
— alba Lodd. 149.
— americana Walt. 146.
— — humilis Wangh. 146.
— arborescens Münchh. 145.
— atrosanguinea Ht. 149.
— Avellana L. 147.
— — atropurpurea Kirchn. 147.
— — aurea Kirchn. 147.
— — brachychlamys Spach 147.
— — × Colurna 145.
— — fusco-rubra Goesch. 147.
— — glandulosa Christ 147.
— — gloiotricha Beck 147.
— — glomerata Ait. 147.
— — laciniata Kirchn. 147.
— — pendula Goesch. 148.
— — pontica Winkl. 148.
— — schizochlamys Spach 147.
— — typica C. S. 147.
— — — alba-variegata C. S. 147.
— — — atropurpurea C. S. 147.
— — — aurea C. S. 147.
— — — aureo-marginata C. S. 147.
— — — brachychlamys C. S. 147.
— — — glandulosa C. S. 147.
— — — glomerata C. S. 147.
— — — quercifolia Kirchn. 147.
— — — schizochlamys C. S. 148.
— — — Zimmermanni C. S. 147.
— — — urticifolia C. S. 147.
— — urticifolia DC. 147.
— — Zimmermanni Hahne 147.
— calyculata Dipp. 146.
— chinensis Fr. II. 896.
— colchica Alb. 144, II. 896.
— Colurna L. 144.
— — arborescens Fisch. 145.
— — chinensis Burk. II. 896.
— colurnoides C. S. 145.
— cornuta Ht. 150.
— Davidiana Baill. 143.

Corylus Fargesii C. S. II. 896.
— ferox Wall. 144, II. 895.
— — thibetica Fr. II. 895.
— glandulosa Sbuttlew. 147.
— heterophylla Fisch. 145, II. **896**
— — Lodd. 147.
— — Crista-galli Burk. II. 896.
— — sutchuenensis Fr. II. 896.
— — yunnanensis Fr. II. 896.
— intermedia Lodd. 145.
— mandschurica Max. 150.
— — Fargesii Burk. II. 896.
— maxima Mill. 148.
— — alba C. S. 149.
— — atropurpurea Docbn. 149
— — rubra C. S. 149.
— — — normalis C. S. 149.
— — — purpurea C. S. 149.
— pontica K. Koch 148.
— purpurea Lodd. 149.
— rostrata Ait. 149.
— — californica DC. 150.
— — Fargesii Fr. II. 896.
— — Sieboldiana Max. 150.
— rubra Borkh. 149.
— Sieboldiana Bl. 150.
— silvestris Salisb. 148.
— thibetica Bat. II. 895.
— tubulosa W. 149.
Cotinus Scop. II. 146.
— americanus Nutt. II. 147.
— Coccygea K. Koch II. 146
— — atropurpurea Dipp. II. 146.
— — pendula Dipp. II. 146.
— Coggygria Scop. II. 146.
— — cinerea Engl. II. 146.
— — laevis Engl. II. 146.
— — — atropurpurea C. S. II. 146.
— — — pendula C. S. II. 146.
— — pubescens Engl. II. 146.
— cotinoides Britt. II. 147.
— velutina C. S. II. 146.
Cotoneaster Med. 744, II. **1001.**
— acuminata Ldl. 746.
— — prostrata Dipp. 746.
— — — Koeh. 746.
— — Simonsi Decne. 746.
— acutifolia Ldl. 750.
— — Turcz. 751. **1003.**
— — laetevirens R. et W. II. 1003.
— — pekinensis Koeb. 751.
— — villosula Rehd. 1003.
— adpressa Bois II. 1002.
— affinis DC. 753.
— — Ht. 758.
— — Ldl. 757.
— — bacillaris C. S. 757.
— — — obtusa C. S. 757.
— — typica C. S. 757.
— Aitchisoni C. S. 749.
— ambigua R. et W. II. 1003.
— amoena Wils. II. 1003.
— angustifolia Fr. 761.
— apiculata R. et W. II. 1002.
— applanata Veitch II. 1003.
— arborescens Zbl. 757.
Cotoneaster bacillaris Wall. 757.
— — affinis Hk. 757.
— — floribunda Zbl. 757.
— — obtusa Dipp. 757.
— — parvifolia Hk. 757.
— breviramea R. et W. II. 1004.
— bullata Bois 747, II. **1002.**
— — floribunda R. et W. II. 1002.
— — macrophylla R. et W. II. 1002.
— buxifolia Bak. 759.
— — Ldl. 753.
— — Wall. (et Auct.) 760.
— — cochleata Fr. 760, II. 1004.
— — lanata Zbl. 759.
— — melanotricha Fr. 760.
— — typica Zbl. 760.
— — uniflora Zbl. 760.
— — vellaea Fr. 760, II. 1004.
— coccinea Steud. 749.
— compta Ht. 758.
— comptus Lem. 758.
— congesta Bak. 760.
— coriacea Fr. 759, II. 1004.
— crenulata Koch 761.
— Dammeri C. S. 761, II. **1004.**
— — radicans C. S. 761, II. 1004.
— — typica C. S. 761.
— Davidiana Ht. 746.
— denticulata Kuntb 743.
— Dielsiana Pritzl. 749, II 1003.
— — elegans R. et W. II. 1003.
— disticha Lge. 745.
— — Duthieana C. S. 745.
— — tongolensis C. S. 745, II. 1002.
— — typica C. S 745.
— divaricata R. et W. II. 1002.
— Fontanesi Spach 754.
— — acutifolia Bornm. 754.
— — Desfontaini Rgl. 754.
— — Nummularia Rgl. 754.
— — ovalifolia Boiss. 754.
— — songarica Rgl. 754.
— Fortunei Wenz. 763.
— foveolata R. et W. II. 1002.
— Francheti Bois 750, II. 1004
— frigida Wall. 758.
— — affinis Wenz. 757.
— glabrata R. et W. II. 1004.
— glaucophylla Fr. 758, II. 1004.
— gracilis R. et W. II. 1003.
— granatensis Boiss. 756.
— — tomentosa Coss. 756.
— Harrowiana Wils. II. 1004.
— Henryana R. et W. II. 1004.
— himalayensis Ht. 758.
— Hookeri Ht. 745.
— horizontalis Decne. 745.
— — adpressa C. S. 745.
— — perpusilla C. S. 745, II. 1002.
— — typica C. S. 745.
— humifusa Duth. II 1004.
— hupehensis R. et W. II. 1004.
— ignava Wolf II. 1003.
— integerrima Med. 747.
— — depressa C. S. 747
— — glabrescens Beck 747.

Cotoneaster intermedia C. S. 747.
— — leucocarpa C. S. 747.
— — × tomentosa 748.
— — typica C. S. 747.
— — — glabrescens C. S. 747.
— — — oxyphylla C. S. 747.
— — uniflora Bge. 747.
— — var. β Med. 752.
— intermedia Coste 748.
— laevis Ht. 757.
— lanata Decne. 753.
— laxiflora Hook. 752.
— — Jacq. 752.
— Lindleyi Steud. 757.
— lucida Schlecht. 750.
— melanocarpa Lodd. 752.
— — commixta Hook. 752.
— — laxiflora C. S.. 752.
— — typica C. S. 752.
— — — paucillora C. S. 752.
— microphylla Wall. 760, II. **1004.**
— — buxifolia lanata Dipp. 759.
— — cochleata R. et W. II. 1004.
— — glacialis Hk. 760.
— — rotundifolia Wenz. 759.
— — thymaelolis Koch. 760.
— — uva-ursi Ldl. 759.
— — vellaea R. et W. II 1004.
— montana Lge. 746.
— monpinensis Franch. 747, II. 1002.
— — Stapl II. 1002.
— — floribunda Stapl II. 1002.
— mucronata Franch. 752, II. **1003.**
— multiflora Bge. 755, II. 1004.
— — calocarpa R. et W. II. 1004
— — granatensis Wenz. 756.
— nanchuanica Rgl. 746.
— nebrodensis Koch 754.
— nervosa Decne. 744.
— nigra Fries 752.
— — acutilolia Wenz. 750.
— — laxiflora Zbl. 752.
— — pauciflora Rgl. 752.
— — typica Zbl. 752.
— nitens R. et W. II. 1002.
— Nummularia Fisch. et M. 754.
— — Ldl. 757.
— — Lindleyi Wenz. 757.
— — racemillora Wenz. 754.
— obscura R. et W II. 1002.
— — cornilolia R. et W II. 1002.
— obtusa Wall. 757.
— orbicularis Schlecht. 754.
— orientalis Kern. 752.
— pannosa Fr. 754, II. 1004.
— parnassica Boiss. et Heldr. 749.
— peduncularis Boiss. et Hoh. 752.
— pekinensis Zbl. 751.
— prostrata Bak. 759.
— Pyracantba Spach 762.
— — fruct. albo Kirchn. 762.
— pyrenaica Ht. II. 1002.
— racemillora Koch 754, II. **1003.**
— — acutifolia C. S. 754.
— — Deslontainesi Zbl. 754.
— — Kotschyi C. S., 754.

Cotoneaste racemiflora Meyeri Zbl. 754.
— — microcarpa R. et W. II. 1003
— — nummularia Dipp. 754.
— — Royleana Dipp. 754.
— — songarica C. S. 754, II. 1003.
— — typica C. S. 754.
— radicans Dam. 761.
— reflexa Carr. 756.
— reticulata R. et W. II. 1002.
— rbytidophylla R. et W. II. 1004.
— rosea Edgew. 745.
— rotundifolia Bak. 745.
— — Wall. 759.
— — lanata C. S. 759.
— — uva-ursi C. S. 759.
— Royleana Ht. 745, 754.
— Roylei Ht. 754.
— rugosa Pritzl. 758, II. 1004.
— — Henryana C. S. 758.
— — Henryi Veitch II. 1004.
— — Pritzeli C. S. 758, II. 1004.
— — typica C. S. 758, II. 1004
— salicifolia Fr. 759, II. 1004.
— — floccosa R. et W. II. 1004.
— — rugosa R. et W. II. 1004.
— Silvestrii Pamp. II. 1003.
— Simonsi Bak. 746.
— spatbulata Wenz. 791.
— tenuipes R. et W. II. 1003.
— thymaelolia Bak. 760.
— tomentosa Ldl. 748.
— — intermedia Lec. et Lam. 748.
— — parnassica Wenz. 749.
— — plurillora C. S. 749.
— tomentoso-vulgaris Lamotte 748.
— uniflora Bge. 747.
— vulgaris Ldl. 747.
— — depressa DC. 747.
— — erythrocarpa Led. 748.
— — intermedia Rgl. 747.
— — leucocarpa Roem. 747.
— — lutea Fries 747.
— — melanocarpa Led. 752.
— — microphylla Auct. 747.
— — minutilolia Zbl. 747.
— — oxyphylla Zbl. 747.
— — peduncularis Boiss. 752.
— Zabeli C. S. 749, II. 1003.

Covillea divaricata Vail II. 116.

Cowania Don 527.
— alba Good. 528.
— ericaelolia Torr..527.
— Havardi Wats. 527.
— mexicana Don 527.
— plicata Don 528.
— purpurea Zucc. 528.
— Stansburiana Torr. 528.

Crataegomespilus Sim.-L. 765.
— Asnieresi C. S. 765.
— Dardari S.-L. 765.
— — crataegoides Zbl. 765.
— — mespilioides Zbl. 765.
— monogyna × Mespilus germanica 765, 766.

Crataegus L. 766, II. **1005.**
— acerifolia Moench 790.
— aestivalis T. et Gr. 794.
— alnifolia S. et Z. 703.
— altaica Lge. 773.
— — incisa C. S. 773.
— ambigua C. A. Mey. 785.
— — Hohenackeri C. S. 785.
— — pectinata Lge. 785.
— apiifolia Mchx. 790, II. 1007.
— apposita Sarg. II. 1008.
— aprica Beadle 792.
— arbutifolia Ait. 708.
— Aria L. 688.
— — scandica L. 692.
— arkansana Sarg. 798.
— Arnoldiana Sarg. 798.
— — suecica L. 692.
— aronia Bosc 788.
— atrocarpa Wolf II. 1005.
— atrofusca Stev. 777.
— azarella Griseb. 783.
— Azarolus L. 788.
— — × tanacetifolia 787.
— Bartramiana Sarg. II. 1007.
— berberifolia Ht. 795.
— — T. et Gr. 796.
— Bibas Lour. II. 999.
— blandita Sarg. II. 1008.
— Boissieri Willk. 783.
— Bornmülleri Zbl. 787.
— Boyntoni Beadle 802.
— brachyacantha Eng. et Sarg. 791.
— Brettschneideri C. S. II. 1005.
— brevispina Kze. 784.
— Canbyi Sarg. 796.
— Carrièrei Vauv. 795.
— Celsiana Bosc 778.
— — Dipp. 787.
— Chapmani Asbe 776, II. 1006.
— — Plukenetii Eggl. II. 1006.
— chitaensis Sarg. II. 1006.
— chlorocarpa Koch 771.
— chlorosarca Max. 773.
— — pubescens Wolf II. 1005.
— chrysocarpa Ashe II. 1008.
— Clarkei Hk. 788.
— coccinea L. 799, II. **1008.**
— — L. Herb. II. **1008.**
— — macracantha Dudl. 777.
— — mollis T. et Gr. 798.
— — pruinosa Dipp. 799.
— — rotundifolia Sarg. 799, II. 1008.
— — subvillosa Lge. 798.
— coccinoides Ashe 801, II. 1007.
— — dilatata Eggl. II. 1007.
— collicola Asbe 795.
— collina Chap. 795.
— — Lettermani Eggl. II. 1007.
— coloradensis Nels. II. 1006.
— colorado Ashe II. 1006.
— conjuncta Sarg. II. 1007.
— cordata Ait. II. 1007.
— crenulata Roxb. 761.
— crudelis Sarg. II. 1008.
— Crusgalli L. 796, II. **1007.**

Crataegus Crusgalli capillata Sarg. II. 1007.
— — exigua Eggl. II. 1007.
— — linearis DC. 796.
— — × macracantha II. 1007.
— — oblongata Sarg. II. 1007.
— — ovalifolia Ldl. 796.
— — × pentagyna 778.
— — prunifolia T. et Gr. 796, II. 1007.
— — × prunifolia 796.
— — × punctata 795.
— — pyracanthifolia Ait. 796. II. 1007.
— cuneata S et Z. 793.
— cuspidata Spach 684.
— dahurica Koeb. 773.
— dentata Thuill. 695.
— dilatata Sarg. II. 1007.
— Dippeliana Lge. 787.
— dissona Sarg. II. 1007.
— Dodgei Ashe II. 1008.
— Douglasi Ht. 776.
— — Ldl. 775.
— — rivularis Sarg. 775.
— dsungarica Zbl. 774, II. 1005.
— Eggerti Britt. II. 1007.
— exigua Sarg. II. 1007.
— Faxonii Sarg. II. 1008.
— fecunda Sarg. 796.
— fennica Kalm 691.
— Fischeri C. S. 789.
— flabellataLge. 800, II. 1008.
— — Heldr. 788, II. 1008.
— — Sarg. II. 1008.
— flabellifolia Spach 689.
— flava Ait. 793.
— florentina Zucc. 724.
— Fontanesiana Steud. 796.
— — × hiemalis 778.
— Fortunei C. S. 763.
— fruticosa Sarg. 794.
— glabra Lodd. II. 997.
— — Thbg. 707.
— glandulosa Ait. II. 1008.
— — W. 799.
— — macracantha Ldl. 777.
— glauca Wall. 713.
— graeca Spach 690.
— granatensis Boiss. 784.
— grandiflora Koch 766.
— Grayana Egglst. II. 1008.
— Greggiana Eggl. II. 1007.
— Heldreichi Boiss. 788.
— Henryi Dunn 770, II. 1005.
— heterophylla Flueg. 779.
— hiemalis Lge. 778.
— — erythrocarpa Lge. 778.
— — pubescens Dipp. 778.
— hirsuta Schur 781.
— Holmesiana Ashe 800, II. 1007.
— — villipes Ashe 800.
— hupehensis Sarg. II. 1005.
— hybrida Becbst. 688.
— — L. 691.
— hypolasia Koch II. 1007.
— indica L. 705.
— insegnae Bert. 783.

Crataegus intermedia Fuss 781.
— — Schur 781.
— intermixta Beck 781.
— intricata Lge. 802, II. 1008.
— — Sarg. II. 1008.
— josana C. S. 774.
— Komarowii Sarg. II. 1005.
— Korolkowi Henry 773, II. 1005.
— — Rgl. 770.
— kulingensis Sarg. II. 1005.
— kyrtostyla Fing. 781.
— laciniata Auct. 785.
— — Stev. 783.
— — Uer. 788.
— laevigata DC. 780.
— laevis Thbg. 710.
— Lagenaria F. et M. 786.
— Lalandi Ht. 762.
— Lambertiana Lge. 772.
— lasiocarpa Lge. 783.
— latifolia Lam. 695.
— latisepala Asbe II. 1007.
— Lavallei Her. 795.
— Lettermani Sarg. 794, II. 1007.
— leucoploeos Mnch. 776, II. 1006.
— linearis Pers. 796.
— lobata Bosc 766.
— luculenta Sarg. 794.
— macracantha Lodd. [et Koch.] 777, II. 1005.
— — minor Loud. 777.
— macrocarpa Heg. 780.
— macrosperma Asbe II. 1007.
— maloides Sarg. 794.
— Marshallei Eggl. II. 1007.
— maroccana Ldl. 789.
— — Pers. 788.
— Maura L. 788.
— Maximowiczi C. S. 771.
— media Bechst. 781.
— melanocarpa M. B. 777.
— — polyphylla Lge. 778.
— mexicana DC. 794, II. **1007**.
— microcarpa Ldl. 791.
— microphylla Koch 785.
— — × oxyacantha 786.
— modesta Sarg. II. 1008.
— mollis Auct. 798.
— — Scheele 798.
— — sera Eggl. II. 1007.
— monogyna Jacq. 781.
— — albo-plena Rehd. 781.
— — coriacea Podp. 783.
— — decussata Wallr. 782.
— — fastigiata Dipp. 781.
— — ferox C. S. 781.
— — filicifolia Lge. 782.
— — flabellata Lge. 782.
— — flexuosa Loud. 781.
— — hirsutior Boiss. 789
— — — Ilal. 783.
— — horrida Rehd. 781.
— — kyrtostyla Beck 781.
— — laciniata Ht. 782.
— — lanigera Beck 781.
— — mauriannensis Did. 782
Crataegus monogyna × nigra 778.
— — × oxyacantha 781.
— — pendula Loud. 781.
— — pteridifolia Rehd. 782.
— — punicea Rehd. 781.
— — × Pyrus communis 667.
— — quercifolia Rehd. 782.
— — rubroplena Rehd. 782.
— — schizophylla Beck 782
— — semperflorens Rehd. 782.
— — stricta Loud. 781.
— — typica Beck 781.
— Nelsonii Eggl. II. 1007.
— neofluviatilis Asbe II. 1006.
— nigra W. et K. 778.
— — obtusiloba Lge. 778.
— — × pinnatifida 779.
— — × sanguinea 772.
— nitida Sarg. 798.
— obtusata Spach 695.
— occidentalis Britt. II. 1005.
— odoratissima Andr. 788.
— Oliveriana Bosc 777.
— orientalis Pall. 787.
— — flabellata Boiss. 788.
— — Tourneforti C. S. 787.
— — × tanacetifolia 787.
— — typica C. S. 787.
— orthosepala Hsskn. et Bornm. 786.
— ovalifolia DC. 796.
— ovalis Kit. 781.
— oxyacantha L. 780.
— — aurea Loud. 780.
— — auriculata Mér. 780.
— — ferox Carr. 781.
— — filicifolia van Htte. 782.
— — genuina Rouy et C. 780.
— — horrida Carr. 781.
— — integrifolia Wallr. 780.
— — laciniata Fl. et Pao. 788.
— — laevigata Beck 780.
— — macrocarpa Le Gr. 780.
— — microphylla Lge. 780.
— — obtusata DC. 780.
— — obtusiloba Schur 780.
— — Oliveriana Ldl. 777.
— — oxyacanthoides Rchb. 780.
— — pteridifolia Loud. 782.
— — quercifolia Loud. 782.
— — semperflorens André 782
— — triloba Fior. et P. 781.
— — vernicosa Lge. 780.
— — vulgaris DC. 780.
— — — aurea C. S. 780.
— — — auriculata C. S. 780.
— — — Gireoudi C. S. 780.
— — — macrocarpa R. et C. 780.
— — — rubra C. S. 780.
— — — splendens C. S. 780.
— — — vernicosa C. S. 780.
— — xanthocarpa Lge. 780.
— oxycantho-germanica Gill. 766.
— oxycanthoides Thuill. 780.
— panachaica C. S. 783.
— parvifolia Ait. 793.
— Parryana Eggl. II. 1007.

Crataegus pausiaca Ashe 795.
— pectinata Bosc 779.
— — Hoh. 785.
— pentagyna W. et K. 777.
— peoriensis Sarg. 796.
— persimilis Sarg. II. 1007.
— Phaenopyrum Medic. II. 1007.
— philadelphica Sarg. II. 1007.
— pinnatifida Bge. 769.
— — geholensis C. S. 769.
— — major Br. 770, II. 1005.
— — psilosa C. S. 769.
— — typica C. S. 769.
— pinnatiloba Lge. 785.
— platyphylla Ldl. 778.
— polyacantha Jan 781.
— — Heldreichi Lge. 788
— pontica Koch 789.
— populifolia Walt. 790.
— Porteri Britt. II. 1007.
— praemora Ashe II. 1008.
— pratensis Sarg. 794.
— pruinosa Koch 799, II. 1007.
— prunifolia Bosc 796.
— — Ht. II. 1007.
— — Lam. II 1007.
— — Pers. 796.
— puhescens Steud. 794, II. 1007
— — Botteri Egglst. II. 1007.
— punctata Jacq. 794.
— — brevispina Dougl. 775.
— — × tanacetifolia 787.
— purpurea Bosc 773, II. 1006.
— pycnoloba Boiss. et H. 788.
— Pyracantha Med. 762.
— — crenulata Loud. 761.
— pyrifolia Ait 776.
— racemosa Lam. 734.
— rhombifolia Sarg. II. 1005.
— rivularis Nutt. 775.
— Rosei Egglst. II. 1007.
— rotundifolia Lam 732.
— — Mnch 799, II. 1008.
— — minor Dipp. 777.
— — puherula Sarg. II. 1008.
— — succulenta Dipp. 776.
— rubrinervis Lge. 778.
— — aberrans Lge. 779.
— ruscinonensis Gr. et Bl. 789.
— salicifolia Med. 796.
— saligna Greene 792.
— sanguinea Nutt. 775.
— — Pall. 771.
— — chlorocarpa C. S. 771.
— — — Koch. 773.
— — Douglasi T. et Gr. 775.
— — gennina Max. 771.
— — glabra Max. 771.
— — incisa Rgl. 773.
— — microphylla Wolf II. 1005.
— — Schroederi Rgl. 774
— — songorica Rgl. 773.
— — villosa Max. 771.
— — xanthocarpa Rgl. 771
— Sargenti Beadle 802.
— scandica L. II. 997.
Crataegus Schroederi Koch. 774, II. 1005.
— sera Sarg. II. 1007.
— serratifolia Desf. II. 997.
— sheridana Ncls. II. 1008.
— sinaica Boiss. 789.
— songorica Rgl. 773.
— spathulata Mchx. 791, II. 1007.
— speciosa Sarg. II. 1007.
— spicata Lam. 738.
— stipulosa Steud. 794, II. 1007.
— subfusca Led. 685.
— submollis Sarg. 798.
— suhserrata Benth. 794, II. 1007.
— suhvillosa Schrd. 797.
— succulenta Lnk. 776.
— — Schrad. II. 1006.
— tanacetifolia Pers. 786.
— — taurica DC. 788.
— tatarica Ht. 770.
— tenuifolia Bat. 771.
— — Britt. 798.
— texana Buckl. 798.
— tiliaefolia Koch 798.
— tomentosa L. 776 II. 1006.
— — Linn. Herh. II. 1006.
— — Chapmani Beadle II. 1006.
— — microcarpa Chap. II. 1006.
— torminalis L. 696.
— Tourneforti Grish. 787.
— triflora Chap. 797.
— triloba Pers. 781, 788.
— trilobata Lab. 726.
— umbellata Desf. 691.
— uniflora Muench. 793.
— villosa Cariot 784.
— — Thhg. II. 998.
— viridis L. 798.
— — nitida Br. et Br. 798
— Wattiana Hemsl. et Lace 773, II. 1005.
— — incisa C. S. II. 1005.
— Wilsonii Sarg. II. 1006.
Crataemespilus Cam. 766.
— grandiflora Cam. 766.
Crinitaria viscidiflora Hook. II. 755.
Crinodendron Mol. II. 364.
— dependens C. S. II. 365.
— Hookerianum Gay II. 365
— Patagua Mol. II. 364.
Cudrania Tréc. 242.
— tricuspidata Tréc. 242.
— triloba × Maclura pomifera II. 905
Cydonia Mill. 654.
— cathayensis Hemsl. 730.
— Cydonia Pers. 654.
— lusitanica Mill. 654.
— japonica Pers. 730.
— — alpina Rehd. 731.
— — typica Mak. II. 1001.
— — Lagenaria Mak. II 1001.
— Lagenaria Loisl. II. 1001.
— — lusitanica Pers. 654.
— Maulei Moore 731.
— maliformis Mill. 654.
— ohlonga Mill. 654.
— — lusitanica C. S 654
— — marmorata C. S. 654.

Cydonia oblonga maliformis C. S. 654.
— — pyramidalis C. S. 654
— — typica C. S. 654.
— Sargenti Lem. 731.
— sinensis Thouin 729.
— vulgaris Pers. 654.
— — marmorata Dipp. 654.
— — maliformis Kirchn. 654.
— — pyramidalis Dipp. 654.
— — pyriformis Kirchn. 654.
Cynanchum erectum L. II. 853.
— Willordii Max. II. 854.
Cynoxylum floridum Raf. II. 454.
Cyrilla Garden II. 156.
— racemiflora L. II. 156.
Cytisopsis spinosa Conr. II. 101.
Cytisus L. II. 40, II. 1009.
— absynthioides Janka II. 54.
— Adami Poit. II. 40.
— aeolicus Guss. II. 45.
— agnipilus Vel. II. 48.
— albus Hacq. II. 57.
— — Lk. II. 43.
— — × Ardoini II. 44.
— — durus Sim.-Louis II. 1009.
— — incarnatus Sw. II. 43.
— — × purgans II. 44.
— — × scoparius Andreanus II. 1010.
— alpestris Schur II. 53.
— — Thur. et Born. II. 52.
— alpinus Mill. II. 39.
— — macrostachys Wettst. II. 39.
— — microstachys Wettst. II. 39.
— — pendulus Loud. II. 39.
— — pilosus Wettst. II. 39.
— Alschingeri Vis. II. 38.
— ambiguus Adans. II. 48.
— angustifolius Mnch. II. 39.
— Ardoini Fourn. II. 45.
— — × biflorus II. 44.
— — × purgans II. 44.
— argenteus L. II. 24.
— atratus Schur II. 46.
— austriaco-capitatus Neilr. II. 55.
— austriacus L. II. 55.
— — Heuffeli C. S. II. 55.
— — pindicolus Deg. II. 55.
— — × supinus II. 55.
— — thessalus Boiss. II. 55.
— — typicus C. S. II. 55.
— — viresceus Kov. II. 55.
— Beani Nich. II. 44.
— biflorescens Host II. 54.
— biflorus L'Hér. II. 51.
— bisflorens Rouy II. 54.
— bosniacus Beck II. 50.
— canariensis O. Ktze. II. 41.
— candicans Lam. II. 42.
— cantabricus Rchb. II. 42.
— capitatus Scop. II. 54.
— — pauciflorus Ebel II. 56.
— — purpurascens Pach. II. 50.
— caramanicus Lav. II. 40.
— cetius Beck II. 52.
— chrysotrichus Boiss. II. 56.
— ciliatus Wahl. II. 53.
Cytisus ciliatus alpestris Beck II. 53.
— — bosniacus Beck II. 50.
— — Grisebachi C. S. II. 53.
— cinereus Vuk. II. 32.
— colchicus Alb. II. 51.
— Dallimorei Rolfe II. 1010.
— danubialis Vel. II. 56.
— decumbens Spach II. 48.
— — diffusus Rchb. II. 47.
— — humifusus Ces. II. 47.
— — pedunculatus Gr. et God. II. 48.
— — procumbens Rchb. II. 48.
— diffusus Vis. II. 47.
— — pindicolus Bald. II. 48.
— drepanolobus Boiss. II. 56.
— — hirsutissimus Post II. 56.
— elongatus Borkh. II. 46.
— — W. et K. II. 52.
— — × purpureus II. 50.
— — × ratisbonensis II. 51.
— emeriflorus Rchb. II. 45.
— eriocarpus Boiss. II. 54, 1009.
— laleatus W. et K. II. 53.
— filipes Webb. II. 43.
— Frivaldskyanus Deg. II. 57
— gallicus Kern. II. 54.
— Georgievi Dav. II. 55.
— germanicus Vis. II. 30.
— glaber L. F. II. 52.
— glabrescens Sart. II. 45.
— grandiflorus DC. II. 43.
— graniticus Rehm. II. 50.
— Heufleli Wirzb. II. 55.
— hirsutissimus Koch II. 52.
— hirsutus L. II. 52.
— — ciliatus Grisebachi Briq. II. 53.
— — — Haynaldi Briq. II. 53.
— — elongatus elongatus Briq. II. 52.
— — — glaber Briq. II. 52.
— — hirsutus genuinus Briq. II. 52.
— — — hirsutissimus Briq. II. 52.
— — — polytrichus Briq. II. 52.
— — leiocarpus Briq. II. 50.
— — pumilus Briq. II. 52.
— — ratisbonensis Briq. II. 51.
— — — biflorus Briq. II. 51.
— — alpestris Arc. II. 52.
— — — Beck II. 53.
— — elongatus Fiori II. 52.
— — genuinus C. S. II. 52.
— — hirsutissimus Boiss. II. 52.
— — leucotrichus Schur II. 53.
— — × purpureus II. 50.
— — × ratisbonensis II. 52.
— bolopetalus Fleischm. II. 27.
— humifusus Nym. II. 47.
— insubricus Wettst. II. 38.
— Jankae Vel. II. 55.
— Kerneri Blocki II. 51.
— kewensis Bean II. 44.
— Kitaibeli Vis. II. 48.
— Kovacevi Vel. II. 57.
— Kunzeanus Wilk. et Lge. II. 1009.
— Laburno-purpureus Mann II. 40.
— Laburnum L. II. 39.
— — Alschingeri Wettst. II. 38.

Cytisus Laburnum coccinenm Ldl. II. 40.
— — insubricus Gaud. II. 38.
— — Jacquinianus Beck II. 37.
— — — Wettst. II. 37, 38.
— — Linneanus Wettst. II. 37.
— — purpurascens Loud. II. 40.
— — quercifolium Loud. II. 37.
— — typicus Beck II. 37.
— — Weismanni Duc. II. 38.
— lanigerus DC. II. 60.
— lasiosemius Boiss. II. 54.
— — sericeus Hsskn. et Bornm. II. 54.
— leiocarpus Kern. II. 50.
— — subleiocarpus Simk. II. 50.
— lencanthus Vel. II. 57.
— — W. et K. II. 56.
— — microphyllus Boiss. II. 56.
— — obscurus Roch. II. 57.
— — pallidus Schrad. II. 56.
— — schipkaensis Dipp. II. 56.
— lencotrichus Schur II. 53.
— linifolius Lam. II. 41.
— Linki Janka II. 43.
— Lobeli Tausch II. 46.
— maderensis Masf. II. 41.
— medius Hal. II. 48.
— monspessulanus L. II. 41.
— mnltiflorus Ldl. II. 52.
— — Sw. II. 43.
— Nejceffi Urum. II. 57.
— nigricans L. II. 46.
— — Pall. II. 104.
— — australis Freyn. II. 46.
— — Carlieri Ht. II. 46.
— — comosa Beck II. 46.
— — elongatus W. II. 46.
— — × Laburnum anagyroides II. 38.
— — longespicatus Ilt. II. 46.
— — mediterraneus Pant. II. 46.
— — nanus Favr. II. 46.
— — spicatus Ht. II. 46.
— Noeanus Rchb. II. 55.
— palmensis Ht. II. 43.
— pauciflorus Beck II. 56.
— Petrovici Adam. II. 48.
— pilosus Vuk. II. 35.
— pindicolus Hal. II. 55.
— pinnatus Pall. II. 104.
— podolicus Blocki II. 53.
— polytrichus M. B. II. 52.
— ponticus Grisb. II. 53.
— praecox Bean II. 44.
— — intermedius Zbl. II. 44.
— — superalbus Zbl. II. 44.
— — superpurgans Koeb. II. 44.
— procnmbens Arrab. II. 48.
— — Sprg. II. 47.
— prostratus Scop. II. 53, 54.
— pseudopygmaeus David. II. 55.
— pulchellus Vis. II. 31.
— pumilns de Not. II. 52.
— purgans Bentb. II. 44.
— purpnreus Scop. II. 49.
— — albocarneus Kirchn. II 50.
— — albns Sweet II. 50.
— — amsanticus Kirchn. II. 50.
Cytisus purpnreus carneus Rehd. II. 50.
— — elongatus versicolor Kirchn. II. 50.
— — erectus Kirchn. II. 49.
— — × Laburnum alpinum II. 40.
— — × Laburnum anagyroides II. 40.
— — pendulus Dipp. II. 49.
— — × ratisbonensis II. 50.
— — × supinus II. 50.
— pygmaeus W. II. 56.
— radiatus Koch II. 27.
— ramentaceus Sieber II. 36.
— ratisbonensis Schaeff. II. 50.
— — biflorus Zbl. II. 51.
— — elongatus Koch II. 52.
— — purpurascens Koch II. 50.
— — typicus C. S. II. 51.
— — virgatus Heuff. II. 51.
— rectipilosus Adam. II. 48, 1009.
— Rocheli Wierzb. II. 57.
— ruthenicus Fisch. II. 51.
— sagittalis Koch II. 36.
— Saugeanus Burn. et Briq. II. 45.
— scoparius Lk. II. 42.
— — albus Loud. II. 42.
— — Andreanus Dipp. II. 42, 1009
— — ochroleucus Zbl. II. 42.
— sessilifolius L. II. 46.
— — leucantbus Dipp. II. 46.
— — Lobeli Koch. II. 46.
— silvestris innocua Vis. II. 29.
— — pungens Vis. II. 29.
— smyrnaeus Boiss. II. 55.
— — prostratus Boiss. II. 55.
— sordidus Koch II. 40.
— spinescens Presl II. 48.
— spinosus Lam. II. 60.
— stenopetalus Chr. II. 41.
— subleiocarpus Simk. II. 50.
— subspinescens Briq. II. 49.
— supinus L. II. 53.
— — albus microphylloides Briq. II. 56.
— — austriacus Heuffeli Briq. II. 55.
— — — virescens Briq. II. 55.
— — eriocarpus absynthioides Briq. II. 54.
— — gallicus C. S. II. 54.
— — genuinus C. S. II. 53.
— — lasiosemius C. S. II. 54.
— — supinus gallicus Briq. II. 54.
— — — genuinus Briq. II. 53.
— — — lasiosemius Briq. II. 54.
— — tmolaeus Noeannus Briq. II. 55.
— — — prostratus Briq. II. 55.
— tbessalus Hal. II. 55.
— Thirkeanus Koch II. 56.
— tmolaeus Boiss. II. 55.
— — prostratus C. S. II. 55.
— Tommasini Vis. II. 56.
— triangularis Vis. II. 32.
— triflorus L'Hér. II. 45.
— versicolor Dipp. II. 50.
— Villarsi Vis. II. 31.
— virescens Kern. II. 55.
— Watereri Wettst. II. 39.
— Weldeni Vis. II. 36.
— wolgaricus L. II. 104.

Daboecia D. Don II. 515.
— cantabrica K. Koch II. 515.
— polifolia Don II. 515.
Damnacanthus Gärtn. II. 1056.
— indicus Gaertn. II. 1056.
— — major Mak. II. 1056
— major S. et Z. II. 1056.
Danaë Med. II. 860.
— androgyna W. et B. II. 861.
— racemosa Mnch. II. 860.
Daphne L. II. 394.
— albiflora Wolf II. 402.
— alpina L. II. 401.
— — petiolata Keissl. II. 401.
— altaica Pall. II. 402.
— arbuscula Cel. II. 395.
— — glabrata Cel. II. 395.
— — hirsuta Cel. II. 395.
— Blagayana Frey. II. 398.
— buxifolia Vahl II. 397.
— candida Vitm. II. 401.
— caucasica Pall. II. 401.
— cneorum L. II. 396.
— — × sericea II. 397.
— — Verloti Meissn. II. 396.
— collina Auct. II. 397.
— — Smith II. 397.
— — neapolitana Ldl. II. 397.
— — — × odora II. 398.
— Daupbini Ht II. 398.
— Delpbini Ht. II. 398.
— Fioniana Auct. II. 397.
— Fortunei Ldl. II. 403.
— Gardneri Wall. II. 404.
— gemmata Pritz. II. 399.
— Genkwa S. et Z. II. 403.
— — Fortunei Franch. II. 403.
— Giraldi Nitsche II. 401.
— glandulosa Bert. II. 396.
— glomerata Lam. II. 398.
— gracilis Pritz. II. 396.
— Houtteana Ldl. II. 400.
— hybrida Ldl. II. 398.
— indica Lois. II. 399.
— japonica Paxt. II. 399.
— — S. et Zucc. II. 399.
— jasminea Sibth. II. 395.
— jezoensis Maxim. II. 403.
— kamtschatika Maxim. II. 403.
— Laureola L. II. 399.
— — × Mezereum II. 400.
— Lerchenfeldiana Schur II. 398.
— major Lam. II. 400.
— Mazeli Carr. II. 399.
— Mezereum L. II. 402.
— — alba Ait. II. 402.
— — — plena C. S. II. 403.
— — alba-plena Rehd. II. 403.
— — albida Meissn. II. 402.
— — atropurpurea Dipp. II. 400.
— — autumnalis Ht. II. 403.
— — fol. atropurp. Ht. II. 400.
— — grandiflora Dipp. II. 403.
— — maxima Ht. II. 403.
— — rubra Ait. II. 402.
— microphylla Meissn. II. 395.
Daphne myrtilloides Nitsche II. 401.
— neapolitana Koeb. II. 396.
— — Lodd. II. 397.
— odora Thbg. II. 398.
— — Mazeli Hemsl. II. 399.
— — rubra Sweet II. 399.
— odorata Lam. II. 396.
— oleoides Schreb. II. 396.
— — brachyloba Meissn. II. 397.
— — buxifolia Keissl. II. 397.
— — × collina II. 397.
— — Fioniana Rehd. II. 397.
— — glandulosa Keissl. II. 396.
— — — puberula Keissl. II. 397.
— — jasminea Meissn. II. 396.
— — — puberula C. S. II. 397.
— — puberula Jaub. et Spach II. 397.
— papyrifera Sieb. II. 404.
— petraea Leyb. II. 395.
— pontica L. II. 400.
— Pseudo-Mezereum Gray II. 403.
— rupestris Facch. II. 395.
— salicifolia Lam. II. 401.
— sericea Vahl II. 397.
— sinensis Lam. II. 399.
— — rubra C. S. II. 399.
— Sophia Kalenicz. II. 402.
— striata Tratt. II. 395.
— Vabli Keissl. II. 397.
— — glabrifolia Keissl. II. 397.
— Verloti Gren. et Godr. II. 396.
Daphniphyllum Bl. II. 135.
— glaucescens Bl. II. 135.
— — Maxim. II 135.
— himalayense Mnell.-Arg. II. 135.
— humile Maxim. II. 136.
— macropodum Miqu. II. 136.
Dasiphora Raf. 522.
— fruticosa Raf. 524.
Datisca hirta L. II. 154.
Davidia Baill. II. 458.
— involucrata Baill. II. 458.
— laeta Dode II. 459.
— tibetana Dav. II. 458.
— Vilmoriniana Dode II. 459.
Decaisnea Hk. et Th. II. 912.
— Fargesii Fr. II. 912.
Decamerion resinosum Nutt. II. 548.
Decumaria L. 394.
— barbara L. 394.
— radicans Moench 395.
— sinensis Oliv. 395.
Delavaya Franch. II. 257.
— toxocarpa Franch II. 257.
— yunnanensis Franch. II. 258.
Dendrium Desv. II. 512.
— Hugeri Small II. 512
— prostratum Small II. 513.
Dendromecon Benth. 354.
— flexile Greene 354.
— Harfordii Kell. 354.
— rigidum Benth. 354
Dendropanax Dcne. et Pl. II. 420
— japonicum Seem. II. 420.
Dendrospartum Spach II. 27.
— aetnense Spach II 27.

Desfontainea R. et P. II. 842.
— Hookeri Dunal II. 842.
— spinosa R. et P. II. 842.
— splendens Knth. II. 842.
Desmodium Desv. II. 108, **1017**.
— acuminatum DC. II. 110.
— calliantbum Franch. II. 109.
— canadense DC. II. 108.
— cinerascens Fr. II. 110.
— Dillenii Darl. II. 108.
— formosum Vog. II. 113.
— Gardneri Benth. II. 110.
— bamulatum Franch. II. 110.
— bispidum Fr. II. 110.
— japonicum Miqu. II. 110.
— nndiflorum DC. II. 110.
— nutans Wall. II. 110.
— paniculatum DC. II. 1017.
— — angustifolium T. et Gr. II. 1017.
— penduliflorum Oudem. II. 113.
— podocarpum DC. II. 110.
— racemosum S. et Z. II. 113.
— rhabdocladum Franch. II. 108.
— tiliaefolium Don II. 109.
— yunnanense Franch. II. 110.
Deutzia Thbg. 376, II. **930**
— albida Bat. 381, II. 935.
— aspera Rebd. II. 935.
— Baroniana Diels 380, II. 935.
— — insignis Pamp. II. 935.
— Bodinieri Rehd. II. 932.
— Brunoniana Wall. 380.
— calycosa Rebd. II. 935.
— canescens Ht. 379, 380.
— cinerascens Rehd. II. 932.
— coreana Lév. II. 936.
— coriacea Rebd. II. 932.
— corymbiflora Lem. 380, II. **932**.
— — erecta Lem. II. 932.
— corymbosa R. Br. 382, II. 936.
— — Hookeriana C. S. II. 936.
— — parviflora C. S. 382.
— — — × discolor purpurascens 382.
— — — × gracilis 378.
— — typica C. S. 382.
— crassifolia Rehd. II. 933.
— — bumilis Rehd. II. 933.
— crenata S. et Z. 379.
— — albo-pleno V. Htt. 380.
— — angustifolia Voss II. 931.
— — fl. albo-pleno Lem. 380.
— — fl. puniceo Lem. 380.
— — fol. albo-punctatis Lem. 380.
— — fol. variegatis Lem. 380.
— — Fortunei Lem. 380.
— — macropetala Zbl. 380.
— — plena Fort. 380.
— — punicea Schelle 380.
— — Watereri Lem. 380.
— — Wellsii Lem. 380.
— densiflora Rehd. II. 935.
— discolor Hemsl. 381, II. 934.
— — Max. 379.
— — albida C. S. 381.
— — major Veitch II. 934.
— — × mollis II. 934.
Deutzia discolor purpurascens Fr. 381, II. 934
— — — × gracilis 378.
— — — × Lemoinei 378.
— Faberi Rehd. II. 932.
— Fargesii Franch. 377, II. 933.
— Fauriei Lév. II. 936.
— Fortunei Voss 380.
— glaberrima Koeb II. 936.
— glabrata Kom. II. 936.
— globosa Duthie II. 934.
— glomernlifolia C. S. 380, II. **934**
— glomeruliflora Franch. 380, II. **934**
— — × longifolia II. 934.
— gracilis S. et Z. 377, II. 931.
— — albo-marmorata Lem. 378.
— — aurea Schelle 378.
— — aureo-marginata Ht. 378.
— — distincta C. S. 377.
— — — albomarmorata C. S. 378.
— — — aurea C. S. 378.
— — — aureomarginata C. S. 378.
— — typica C. S. 377.
— grandiflora Bge. 380, II. 935.
— — Baroniana Rehd. II. 935.
— — glabrata Max. II. 935.
— hamata Koeh. II. 935.
— Henryi Rebd. II. 933.
— hybrida Watereri Veitch 380.
— — Wellsii Veitch 380.
— bypoglauca Rehd. II. 937.
— hypoleuca Max. 379, II. 931
— kalmiaeflora Lem. 382.
— lancifolia Rehd. II. 932.
— Lemoinei Lem. 378.
— — compacta Lem. 378.
— — typica C. S. 378.
— longifolia Fr. 380, II. 935
— macrantha Hk. F. et Thoms 380, II. 934.
— mexicana Pringle 382, II. 937.
— — Pringlei C. S. 282.
— micrantha Engl. II. 936.
— mollis Duthie II. 936.
— myriantha Lem. 378.
— ningpoensis Rehd. II. 931.
— parviflora Bge. 382, II. 936.
— — corymbosa Fr. 382.
— — Musaei Lem. 382, II. 936.
— — purpurascens Fr. II. 936.
— pilosa Rehd. II. 932.
— — ochropbloeos Rebd. II. 932
— Pringlei C. S. 382.
— prunifolia Rebd. II. 935.
— pulebra Vid. 377, II. 931.
— purpurascens Rehd. II. 934.
— — pauciflora Rehd. II. 934.
— reflexa Duth. II. 934.
— rnbens Rehd II. 936.
— scabra S. et Z. 379.
— — Thbg. 379, II. 931.
— — crenata Rehd. 379, II. 931.
— — — albo-plena C. S. 380.
— — — albo-punctata C. S. 380.
— — — aureo-variegata C. S. 380.
— — — macropetala C. S. 380.

Deutzia scabra crenata plena C. S. 380.
— — — punicea C. S. 380.
— — typica C. S. 379.
— — vera Ht. 379.
— Schneideriana Rehd. II. 931.
— — laxiflora Rehd. II. 931.
— sessilifolia Pam. II. 936.
— setchuenensis Franch. 377, II. 932.
— — Hutch. II. 935.
— — corymbiflora Rehd. II. 932.
— — longidentata Rehd. II. 932.
— Sieboldiana Max. 379, II. 931.
— — Dippeliana C. S. 379.
— — typica C. S. 379.
— Sieboldii Koern. 379.
— Silvestrii Pamp. II. 932.
— staminea Brown 380, II. 934.
— — Brunoniana Max. 380.
— — typica C. S. 380.
— subsessilis Rehd. II. 934.
— taiwanensis C. S. 377, II. 932.
— uniflora Shir. II. 935.
— Vilmorinae Lem. 381, II. 934.
— Wilsonii Duthie II. 934.
Diapensia L. II. 570.
— barbulata Elliott II. 570.
— cuneifolia Salisb. II. 570.
— himalaica Hook. II. 570.
— lapponica L. II. 570.
— — asiatica Herd. II. 570.
Dichotomanthes tristaniaecarpa Kurz 707.
Diervilla Adans. II. 745.
— amabilis Carr. II. 750.
— canadensis Willd. II. 747.
— coraeensis DC. II. 749.
— fallax Boerh. II. 746.
— floribunda Sieb. et Zucc. II. 751.
— — grandillora Rehd. II. 751.
— — Lavalléei Rehd. II. 751.
— — Lowii Rehd. II. 751.
— — versicolor Rehd. II. 751.
— florida Sieb. et Zucc. II. 748.
— — alba Rehd. II. 748.
— — candida Rehd. II. 748.
— — × grandiflora II. 748.
— — Isoline Rehd. II. 748.
— — Kosteriana variegata Rehd. II. 748.
— — nana variegata Rehd. II. 748.
— — Sieboldi albomarginata Rehd. II. 748.
— grandillora Sieb. et Zucc. II. 749.
— hortensis S. et Z. II. 751.
— — alba S. et Z. II. 751.
— humilis Pers. II. 747.
— hybrida Dipp. [et Rehd.] II. 751.
— intermedia Zab. II. 748.
— — alba Zab. II. 748.
— — Desboisi Zab. II. 748.
— — Isoline Zab. II. 748.
— — Stelzneri Zab. II. 748.
— japonica DC. II. 751.
— — alba Mak. II. 751.
— — gratissima Rehd. II. 751.
— — hortensis Rbed. II. 751.
— — Looymansi aurea Rehd. II. 751.
— — nivea Rehd. II. 751.
Diervilla Lonicera Mill. II. 747.
— — × sessililolia II. 747.
— lutea Pursh II. 747.
— Middendorlfiana Carr. II. 751.
— multiflora Lem. II. 751.
— praecox Lem. II. 748.
— rivularis Gatt. II. 748.
— rosea Walp. II. 748.
— sessilifolia Buckl. II. 748.
— splendens Carr. II. 747.
— suavis Kom. II. 750.
— Tournelortii Mchx. II. 747.
— trifida Moench II. 747.
— Wolliana C. S. II. 1061.
Dimorphanthus elatus Miqu. II. 431.
— juglandifolius Ht. II. 432.
— mandschuricus Rupr. et Max. II. 431.
Diospyros L. II. 574.
— concolor Moench II. 576.
— costata Carr. II. 575.
— japonica Sieb. et Zucc. II. 576.
— Kaki L. II. 575.
— — costata André II. 575.
— — Mazeli Mouill. II. 575.
— Lotus L. II. 576.
— lucida Ht. II. 576.
— Mazeli Carr. II. 575.
— pubescens Pursh II. 576.
— Schi-Tse Bunge II. 575.
— virginiana L. II. 576.
— — pubescens Dipp. II. 576.
Diostea juncea Miers II. 590.
Diotis ceratoides W. 264.
Dipelta Maxim. II. 675.
— elegans Batal. II. 675.
— floribunda Maxim. II. 675.
— ventricosa Hemsl. II. 675.
— yunnanensis Franch. II. 676.
Diplacus glutinosus Nutt. II. 620.
— — puniceus Benth. II. 620.
— punicens Nutt. II. 620.
Diplarche Hk. F. et Tb. II. 514.
— multillora Hk. F. et Th. II. 514.
— paucillora Hk. F. et Tb. II. 514.
Diplopappus chrysophyllus Ht. II. 760.
Dipteronia Oliv. II. 192.
— sinensis Oliv. II. 192.
Dirca L. II. 404.
— occidentalis Gray II. 405.
— palustris L. II. 404.
Disanthus Max. 425.
— cercidifolia Max. 425, II. 954.
Discaria W. Hook. II. 299.
— longispina Miers II. 299.
Distegia Raf. II. 704.
— flavescens Cock. II. 704.
— involucrata Cock. II. 705.
— — serotina Cock. II. 704.
— Ledebourii Greene II. 705
— nutans Rafin. II. 705.
Distegocarpus S. et Z. 136.
— Carpinus S. et Z. 137.
Distyllum S. et Z. 428.
— chinense Franch. 428.
— indicum Benth. 428.
— racemosum S. et Z. 428.

Distylium racemosum chinense Franch. 428.
— stellare Ktze. 428.
Docynia Decsn. 727, II. 1001.
— Delavayi C. S. II. 1001.
— Doumeri C. S. II. 1001.
— Griffithiana Decne. 728.
— Hookeriana Dene. 728.
— indica Dene. 728, II. 1001.
Dolichos hirsutus Thbg. II. 115.
— polystachyos Thbg. II. 77, 1010.
Dorycnium Adans. II. 63.
— germanicum Rouy II. 64.
— suffruticosum Vil. II. 63.
Doxantha Miers II. 621.
— capreolata Miers II. 621.
Drimophyllum pauciflorum Nutt. 349
Drimys Forst. II. 925
— Winteri Forst. II. 925.
Dryas L. 525.
— depressa Bab. 525.
— Drummondi Rich. 526.
— integrifolia Vahl 526.
— lanata Stein 526.
— octopetala L. 525.
— — incanescens Kern. 526.
— — integrifolia Zbl. 526.
— — typica Beck 526.
— — lanata C. S. 526.
— — vestita Beck 526.
Drymospartum Presl II. 27.
— aetnense Presl II. 27.
Duranta umbilicata Miers II. 1047.
Duvaua Kunth II. 1021.
— dependens DC. II. 1021.
— spinescens Ten. II. 1021.
Dysoda fasciculata Lour. II. 631.

Eccremocarpus Ruiz et Pav. II. 627.
— scaber R. et P. II. 627.
Echinopanax DC. II. 429.
— horridum Dene. II. 430.
Echinus Lour. II. 134.
Echium petraeum Portschl. II. 590.
Edgeworthia Meissn. II. 403.
— chrysantha Ldl. II. 404.
— Gardneri Meissn. II. 404.
— papyrifera Zucc. II. 403.
Edwardsia Salisb. II. 1009.
Edwinia Heller 807.
— americana Hell. 807.
Ehretia L. II. 588.
— acuminata R. Br. 588.
— macrophylla Wall. II. 588.
— serrata Roxb. II. 588.
Elaeagnus L. II. 408.
— angustifolia L. II. 409.
— — angustifolia C. S. II. 409.
— — latifolia Ht. II. 410.
— — orientalis Dipp. II. 410.
— — sativa Ht. II. 410.
— — songarica Fisch. II. 410.
— — spinosa Dipp. II. 410.
— — spinosa C. S. II. 410.
— argentea Nutt. II. 406.
— — Pursh II. 411.
Elaeagnus crispa Dipp. II. 411.
— Davidi Franch. II. 411.
— edulis Sieb. II. 412.
— ferruginea Dipp. II. 413.
— — A. Rich. II. 413.
— glabra Ht. II. 413.
— — Thbg. II. 412.
— — × pungens II. 413.
— Henryi Warb. II. 414.
— hortensis Bieb. II. 410.
— — angustifolia Bieb. II. 410.
— — continentalis Serv. II. 410.
— — littoralis Serv. II. 410.
— — orientalis Bieb. II. 410.
— — songarica Bernh. et Schlecht. II. 410.
— — spinosa Bieb. II. 410.
— incana Lam. II. 410.
— inermis Mill. II. 410.
— lanceolata Warb. II. 414.
— — eulanceolata Serv. II. 414.
— — grandifolia C. S. II. 414.
— — — Serv. II. 414.
— — sticta Serv. II. 414.
— — typica C. S. II. 414.
— latifolia Ht. II. 411.
— longipes Gray II. 412.
— — crispa Maxim. II. 412.
— — hortensis Maxim. II. 412.
— — multiflora Maxim. II. 412.
— — ovata Maxim. II. 412.
— macrophylla Thbg. II. 415.
— — brunnea C. S. II. 415.
— — × pungens II. 413.
— — typica C. S. II. 415.
— mollis Diels II. 412.
— multiflora Thbg. II. 411.
— — edulis Maxim. II. 412.
— — typica Maxim. II. 412.
— — × umbellata II. 411.
— orientalis L. II. 410.
— parvifolia Wall. II. 411.
— pungens Thbg. II. 413.
— — eupungens Serv. II. 413.
— — reflexa Rehd. II. 413.
— — Simoni Rehd. II. 413.
— — subpungens Serv. II. 413.
— — typica C. S. II. 413.
— reflexa Morr. et Dec. II. 413.
— sativa Hort. II. 410.
— Simoni Carr. II. 413.
— sinensis Ht. II. 413.
— spinosa L. II. 410.
— submacrophylla Serv. II. 413.
— tomentosa Moench II. 410.
— umbellata Thbg. II. 411.
— — euumbellata Serv. II. 411.
— — parvifolia C. S. II. 411.
— — — Serv. II. 411.
— — typica C. S. II. 411.
— Yoshinoi Mak. II. 412.
— yunnanensis Serv. II. 414.
Eleutherococcus Max. II. 424.
— Henryi Oliv. II. 1040.
— leucorrhizus Oliv. II. 1040.
— senticosus Maxim. II. 424.

Elliottia Mühl. II. 467.
— racemosa Mühl. II. 467.
Elsholtzia W. II. 606, 1048.
— polystachya Benth. II. 606, 1048.
— Stauntoni Bnth. II. 1048.
Emerus Mill. II. 106.
— major Mill. II. 106.
Emmenopterys Oliv. II. 1055.
— Henryi Oliv. II 1055.
Empetrum L. II. 142.
— album L. II. 142.
— bilobum II. 142.
— Conradi Torr. II. 142.
— nigrum L. II. 142.
— — andinum DC. II. 142.
— — purpureum DC. II. 142.
— — rubrum DC. II. 142.
— — typicum Koch. II. 142
— purpureum Raf. II. 142.
— rubrum Vahl II. 142.
Emplectocladus fasciculatus Torr. 598.
Enantiosparton radiatum Koch II. 27.
Enkianthus Lour. II. 519.
— brachyphyllus Franch. II. 522.
— campanulatus Nich. II. 521.
— cernuus Mak. II. 523.
— — rubens Mak. II. 523.
— chinensis Franch. II. 521.
— deflexus C. Schn. II. 521.
— himalaicus Hk. II. 521.
— — chinensis Diels II. 521.
— japonicus Hook. II. 520.
— Meisteria Max. II. 523.
— — rubens Palib. II. 523.
— nikoënsis Mak. II. 522.
— nivalis Ht. II. 521.
— pauciflorus Wils. II. 521.
— perulatus C. Schn. II. 520.
— quinqueflorus Lour. II. 520.
— — serrulatus Wils. II. 519.
— reticulatus Ldl. II. 520.
— Rostborni Diels II. 522.
— serrulatus C. Schn. II. 519.
— subsessilis Mak. II. 522.
— unifforus Benth. II. 520.
Epigaea L. II. 535.
— asiatica Maxim. II. 535.
— repens L. II. 535.
Epipetrum bilobum Phil. II. 142.
Erclila Juss. 267.
— volubilis Juss. 267.
Eremanthe calycina Spach II. 1037.
Eremosparton Fisch. et Mey. II. 85.
— aphyllum F. et M. II. 85.
— turkestanum Franch. II. 85.
Erica L. II. 563.
— arborea L. II. 564.
— Bruckenthalii Spreng. II. 567.
— carnea L. II. 563.
— — alba Dipp. II. 563.
— — occidentalis Benth. II. 563.
— — purpurescens Rgl. II. 563.
— ciliaris L. II. 565.
— — Watsoni Benth. II 566.
— — × Tetralix II. 566.
— cinerea L. II. 566.
Erica cinerea alba Bedf. II. 566.
— — atropurpurea Lodd. II. 566.
— — pallida Lodd. II. 566.
— corsica DC. II. 566.
— Daboecia L. II. 515.
— herbacea Auct. II. 563.
— lugubris Salisb. II. 563.
— Mackayana Bab. II. 566.
— Mackayi Hook. II. 566.
— mediterranea L. II. 563.
— multicaulis Salisb. II. 566.
— multiflora Ht. II. 564.
— — L. II. 564.
— saxatilis Salisb. II. 563.
— scoparia L. II. 564.
— spiculifolia Salisb. II. 567.
— stricta Andr. II. 566.
— Tetralix L. II. 566.
— — alba Ait. II. 566.
— — canescens Rgl. II. 566.
— — Mackayana Loud. II. 566.
— — Martinesii Benth. II. 566.
— — rubra Bedf. II. 566.
— — tomentosa Zbl. II. 566.
— umbellifera Lois. II. 564.
— vagans Auct. II. 564.
— — L. II. 564.
— verticillata Forsk. II. 564.
— vulgaris L. II. 563.
— Watsoni Jacks. II. 566.
Erinacea Boiss. II. 61.
— pungens Boiss. II. 61.
Eriobotrya Ldl. 711.
— bengalensis Dunn II. 999.
— dubia Decne. 711.
— grandiflora R. et W. II. 999.
— japonica Ldl. 711.
— lasiogyna Fr. 707.
— prinoides R. et W. II. 999
— prionophylla Fr. 707, II. 998.
Eriodictyon Benth. II. 585.
— angustifolium Nutt. II. 585.
— californicum Greene II. 585.
— glutinosum Benth. II. 585.
Eriogynia Hook 485.
— caespitosa S. Wats. 485.
— Hendersonii Canby II. 961.
— pectinata Hook. 485.
— uniflora S. Wats. 485.
Eriolobus Roem. 725. II. **1001**.
— Delavayi C. S. 727.
— indica Rehd. 728.
— kansuensis C. S. 726.
— trilobata Roem. 726.
— — oxyloba C. S. 726.
— Tschonoski Rehd. 727.
— yunnanensis C. S. 727.
Eriogonum Mchx. 254.
— polyanthum bahiaeforme T. et Gr 254
— stellatum Benth. 254
— — bahiaeforme Wats. 254.
— umbellatum Torr. 254.
— Wrightii Torr. 255.
Erythrospermum hypoleucum Oliv. II. 185.

Escallonia Mutis 397.
— angustifolia Phil. 399.
— duplicato-serrata Remy 398.
— floribunda Kunth 399.
— — Rcbbg. 399.
— — montevidensis Ch. et Schl. 399.
— illinita Presl 398.
— langleyensis Veitch 399.
— macrantha Hk. et A. 398.
— montevidensis DC. 399.
— organensis Gard. 399.
— Philippiana Mast. 399.
— — × rubra 399.
— pterocladon Hook. 398.
— punctata DC. 398.
— Rahmeri Phil. 398.
— rubra Pers. 398.
— — albiflora Ifk. et A. 398.
— — macrantha Reiche 398.
— stenophylla Phil. 399.
— virgata Pers. 399.
— — Philippiana Engl. 399.
Eubasis dichotoma Salisb. II. 455.
Eubotrys racemosa Nutt. II. 528.
Euebylia alpigena Dul. II. 707.
— coerulea Dul. II. 695.
— nigra Dul. II. 715.
— verticillata Dul. II. 745.
— villosa Dul. II. 722.
Eucommia Oliv. 424.
— ulmoides Oliv. 424.
Eucryphia Cav. II. 328.
— cordifolia Cav. II. 328.
— glutinosa Focke II. 329.
— pinnatifolia Gay II. 329.
Engenia Ugni Hk. et A. II. 1040
Eunomia cordata DC. II. 928.
— — Pin. II. 928.
— Moricandiana Boiss. II. 928
Euonymus (Evonymus) Auct. II 170.
Eupatorium rosmarinifolium Labill. II. 761.
— vernicosum Greenm. II. 754.
Euptelea S. et Z. 270.
— polyandra S. et Z. 270
Eurotia Adans. 263.
— ceratoides Mey. 263.
— lanata Koch 264.
— — Miq. 264.
Eurya Thbg. II. 329.
— japonica Thbg. II. 329.
— microphylla Hort. II. 173
— ochnacea Ssys. II. 1035.
— Sieboldii Ht. II. 329.
Eurybia erubescens DC. II. 757.
Euscaphis S. et Z. II. 187.
— japonica Dipp. II. 187.
— staphyleoides S. et Z. II. 187.
Evodia ramiflora A. Gray II. 122.
Evonymus L. II. 170, **1023**
— alata Rgl. II. 172.
— — pubescens Max. II. 1023.
— — subtriflora Fr. et Sav. II. 172.
— americana L. II. 180.
— — angustifolia Wood II. 180.
— — biflora Gard. II. 180.
Evonymus americana obovata T. et Gr. II. 180.
— angustifolia Pursh II. 180.
— atropurpurea Jacqu. II. 178, 1025.
— — var. Torr. et Gr. II. 178.
— biflora Raf. II. 180.
— bulgarica Velen. II. 182.
— Bungeana Maxim. II. 177, **1024**
— — semipersistens C. S. II. 1024.
— Carrièrei Vauv. II. 173.
— Dielsiana Loes. II. 175.
— europaea L. II. 182.
— — angustifolia Schults II. 182.
— — atropurpurea Rehd. II. 182.
— — fruct. atropurp. Ht. II. 182.
— — intermedia Gaud. II. 182.
— — involuta Herb. II. 182.
— — leucocarpa DC. II. 182.
— — macrophylla Schleich. II. 182.
— — ovata Dipp. II. 182.
— — suberoso-alata Herb. II. 182.
— — tenuifolia L. II. 182.
— — variegata Dipp. II. 182.
— — velutina C. A. Mey. II. 182
— Forbesi Hance II. 177.
— Giraldii Loes. II. 175.
— gracilis Sieb. II. 173.
— grandiflora Wall. II. 175.
— Hamiltoniana Ht. II. 1024
— — Wall. II 181, **1025**.
— — semipersistens Rehd. II. 177.
— hians Koch. II. 177, **1024**
— hupehensis Loes. II. 172.
— ilicifolia Franch. II. 172.
— japonica Thbg. II. 173.
— — albo-marginata Rebd. II 173.
— — argenteo-variegata Rgl. II. 173.
— — aurea Rehd. II. 173.
— — aureo-maculata Ht. II. 173.
— — aureo-variegata Rgl. II. 173.
— — Carrièrei Nich.-Mott. II. 173.
— — columnaris Carr. II. 173.
— — flavescens Hort. II. 173
— — gracilis Dipp. II. 173.
— — — Rgl. II. 173.
— — macrophylla Sieb. II. 173.
— — — aureo-maculata Ht. II. 173.
— — medio-picta Rehd. II. 173.
— — microphylla Sieb. II. 173.
— — pallens Carr. II. 173.
— — pyramidalis Hort. II. 173
— — radicans Miqu. II. 173.
— — reticulata Reg. II. 173.
— — robusta Hort. II. 173.
— — viridi-variegata Rehd. II. 173.
— Koopmanni Lauche II. 170.
— latifolia Mill. II. 176.
— — planipes Koch. II. 176.
— linearifolia Franch. II. 170.
— Loeseneri Mak. II. 1023
— Maacki Rupr. II. 177, **1024.**
— macroptera Rupr. II. 176.
— micranthus Bge. II. 177.
— multiflora Opiz II. 182.
— nana M. B. II. 170.
— — Koopmanni Beissn. II 170

Evonymus nipponica Maxim. II. 180.
— ohovata Nutt II. 180.
— — variegata Rehd. II. 180.
— occidentalis Nutt. II. 178, 1025.
— oxyphylla Miqu. II. 180.
— Parishi Trel. II. 179.
— patens Rehd. II. 174.
— pauciflora Maxim. II. 170.
— — chinensis C. S. II. 171.
— pendula Hort. II. 180.
— phellomana Loes. II. 172.
— planipes Koeh. II. 176.
— Przewalskii Maxim. II. 172.
— pulchella Hort. II. 173.
— radicans Miqu. II. 173.
— — argenteo-marginatus Rehd. II.173.
— — Carrièrei Nich. II. 173.
— — reticulata Rehd. II. 173.
— — roseo-marginata Rehd. II. 173.
— — vegeta Rehd. II. 173.
— — viridis Rgl. II. 173.
— — — gracilis C. S. II. 173.
— — — reticulata C. S. II. 173.
— — — roseo-marginata C. S. II. 173.
— rosmarinifolia Hort. II. 170.
— sachalinensis Maxim. II. 175.
— sanguinea Loes. II. 177.
— schensiana Maxim. II. 175.
— Semenowii Rgl. et Herd. II. 1025.
— semiexserta Koeh. II. 1024.
— Sieboldiana Bl. II. 17, **1023.**
— — Ht. II. 1024.
— striata Loes. II. 172.
— — Mak. II. 1023.
— — alata Mak. II. 1023.
— — pubescens Mak. II. 1023.
— — rotundata Mak. II. 1023.
— — subtriflora C. S. II. 172.
— subtrillora Bl. II. 172.
— Thunbergiana Bl. II. 172.
— ussuriensis Maxim. II. 177.
— velutina Fisch. et Mey. II. 182.
— verrucosa Scop. II. 171.
— — chinensis Maxim. II. 171.
— — pauciflora Rgl. II. 171.
— verrucosoides Loes. II. 171.
— Vidalii Fr. et Sav. II. 178, 1024.
— vulgaris Mill. II. 182.
— — angustifolia Rouy II. 182.
— — genuina Rouy II. 182.
— — — leucocarpa Rouy II. 182.
— — — atrorubens C. S. II. 182.
— — intermedia Rouy II. 182.
— — leucocarpa C. S. II. 182
— — macrophylla Rouy II. 182.
— — multiflora Rouy II. 182.
— yedoënsis Koeh. II. 178, 1024.
— — calocarpa Koeh. II. 1024.
— yunnanensis Franch. II. 170.
Exochorda Ldl. 493, II. **962.**
— Alberti Rgl. 493.
— — × grandiflora 493.
— Giraldii Hesse II. 962.
— grandiflora Ldl. 494.
— — Alberti Asch. et Gr. 492.
— — prostrata Schwer. II. 962.
Exochorda Korolkowii Lav. II. 962.
— macrantha Lem. 493.
— serratifolia S. Moore. 494.

Fabiana Ruiz et Pav. II. 607.
— imbricata R. et P. II. 607.
Fadyenia Endl. II. 459.
— Hookeri Endl. II. 460.
Fagara L. II. 120.
— ailanthoides Engl. II. 121.
— dimorphophylla Engl. II. 120.
— dissita Engl. II. 120.
— horrida Thbg. II. 12.
— micrantha Engl. II. 121.
— schinifolia Engl. II. 121.
Fagus L. 151, II. **897.**
— americana Sw. 154, II. **898.**
— — latifolia Muenchh. 154.
— antarctica uliginosa DC. II. 897.
— asiatica Wkl. II. 897.
— atropunicea Sudw. II. 898.
— Castanea L. 157.
— — Thbg. 159.
— Engleriana Seem. 151, II. 897.
— ferruginea Ait. 154.
— — Mchx. II. 898.
— — caroliniana Loud. II. 898.
— — latifolia Loud. II. 898.
— glutinosa Poepp. et Endl. II. 329.
— grandilolia Ehrh. II. 898.
— — caroliniana F. et R. II. 898.
— — — mollis F. et R. II. 898.
— — typica Rehd. II. 898.
— — — puhescens F. et R. II. 898.
— Hohenackeriana Pal. II. 897.
— japonica Max. 155.
— longipetiolata Seem. 151.
— orientalis Lipsky 152, II. 897.
— pumila L. 159.
— rotundifolia Raf. II. 898.
— Sieboldi Endl. 152.
— sinensis Oliv. 151, II. **897.**
— sylvatica L. 153, II. **898.**
— — asiatica DC. 152, 153, II. **897.**
— — asplenifolia Lodd. 153.
— — atropunicea Marsh. 154.
— — cochleata Dipp. 154.
— — comptoniaefolia Kirchn. 153.
— — cristata Lodd. 154.
— — cuprea Lodd. 154.
— — fol. argenteo-marmoratis Ht. 154.
— — fol. aureo-variegatis Kirchn. 154.
— — fol. striatis Dipp. 154.
— — heterophylla Lodd. 154.
— — latifolia Kirchn. 154.
— — longipes Oliv. II. 897.
— — macrophylla DC. 152. II. 898.
— — pendula Lodd. 154.
— — — tortuosa C. S. 154.
— — purpurea Ait. 154.
— — pyramidalis Kirchn. 154.
— — quercoides Pers. 154.
— — Rohani Maš. II. 898.
— — tortuosa Dipp. 154.
— — typica C. S. 153.
— — — asplenifolia C. S. 153.

Digitized by Google

Fagus sylvatica typica aurea C. S. 154.
— — — aureo-variegata C. S. 154.
— — — cochleata C. S. 154.
— — — cristata C. S. 154.
— — — Hartigii C. S. 154.
— — — heterophylla C. S. 153.
— — — latifolia C. S. 154.
— — — marmorata C. S. 154.
— — — purpurea C. S. 154.
— — — quercifolia C. S. 154.
— — — Rohani C. S. II. 898.
— — — undulata C. S. 154.
— — — Zlatia C. S. 154.
— — undulata Sim.-L. 154.
— — Zlatia Späth 154.
— sylvestris Mchx. 154.
— uliginosa Phil. II. 897.
Fallugia Endl. 526.
— mexicana Walp. 526.
— paradoxa Endl. 526.
Fatsia horrida Benth. et Hook. II. 431.
Fendlera Englm. et Gr. 376.
— rupicola E. et Gr. 376.
— utahensis Greene 376.
Fendlerella Heller 376.
— utahensis Heller 376.
Ficus L. 243.
— Carica L. 243.
— hirta Vahl 244.
— pumila L. 245.
— — rupestris Hausskn. 244.
— stipulata Thbg. 245.
Firmiana platanifolia Schott. et Endl. II. 392.
Flemingia 114.
Fluggea japonica Miqu. II. 135.
— microcarpa Bl. II. 1020.
— obovata Pax II. 1020.
— suffruticosa Baill. II. 135.
Fontanesia Lahill. II. 809.
— angustifolia Dipp. II. 810.
— californica Ht. II. 809.
— chinensis Hance II. 809.
— Fortunei Carr. II. 809.
— phillyreoides Lab. II. 809.
— — angustifolia Rehd. II. 810.
— — Fortunei Schelle II. 809.
— — longifolia Dipp. II. 810.
— — sinensis Desb. II. 809.
Forestiera Poir. II. 792.
— acuminata Poir. II. 792.
— — parvifolia Gray II. 792.
— ligustrina Poir. II. 792.
— neomexicana Gray II. 792.
Forsellesia Greene II. 186.
Forsythia Vahl II. 768.
— densiflora Koeh. II. 771.
— europaea Deg. et Bald. II. 769.
— Giraldiana Ling. II. 770.
— intermedia Zab. II. 771.
— — densiflora Koeh. II. 771.
— — divaricata Koeh. II. 771.
— — vitellina Koeh. II. 770.
— spectabilis Koeh. II. 770.
— suspensa Vahl II. 771.
— — decipiens Koeh. II. 771.
Forsythia suspensa decipiens pallida Koeh. II. 771.
— — Fortunei Rehd. II. 771.
— — — aureo-variegata Koeh. II. 771.
— — — × viridissima II. 770.
— — latifolia Rehd. II. 1062.
— — pubescens Rehd. II. 1062.
— — Sieboldi Zab. II. 771.
— — — × viridissima II. 770.
— — × viridissima II. 770.
— viridissima Ldl. II. 770.
— vitellina Koeh. II. 770.
Fortunaea Ldl. 75.
— chinensis Ldl. 76.
Fothergilla Murr. 430, II. 954.
— alnifolia L. 430, 807.
— — major Sims II. 954.
— carolina Britt. 430.
— Gardeni Murr. 430, II. 954.
— — Sarg. II. 954.
— involucrata Falc. 429.
— major Lodd. 431, II. 954.
— monticola Ashe 431, II. 954.
— parvifolia Kearn. 431.
Franguia Mill. II. 264.
— Alnus Mill. II. 265.
— californica Gray II. 267.
— — tomentella Gray II. 267.
— caroliniana Gray II. 269.
— crenata Miqu. II. 269.
— Purshiana Coop. II. 266.
— rupestris Schur II. 268.
— vulgaris Rehb. II. 265.
— Wulfenii Rehb. II. 268.
Frankenia L. II. 339.
— hirsuta L. II. 340.
— — cinerascens C. S. II. 340.
— — hispida Boiss. II. 340.
— — intermedia Boiss. II. 340.
— — laevis Boiss. II. 340.
— hispida DC. II. 340.
— intermedia DC. II. 340.
— laevis L. II. 340.
— — cinerascens Mor. II. 340.
Franklinia Altamaha Marsh. II. 330.
Fraxinus L. II. 810.
— acuminata Lam. II. 824.
— alba Marsh. II. 824.
— albicans Buckl. II. 824.
— americana L. II. 824.
— — acuminata Wesm. II. 824.
— — albo-marginata Rehd. II. 824.
— — glauca Ht. II. 824.
— — juglandifolia Rehd. II. 824.
— — longifolia Ht. II. 824.
— — macrophylla Ht. II. 824.
— — microcarpa Gray II. 824.
— — × pennsylvanica II. 824.
— — profunda Bush II. 827.
— — texensis Gray II. 824
— angustifolia Vahl II. 833.
— — australis C. Schn. II. 833.
— — typica C. Schn. II. 833.
— anomala Torr. II. 822.
— argentea Lois. II. 814.
— atrovirens Pers. II. 830.

Fraxinus aurea Willd. II. 830.
— australis Gay II. 833.
— Baroniana Diels II. 820.
— Biltmoreana Beadle II. 824.
— Boscii Ilt. II. 824.
— bracteata Hemsl. II. 818.
— Bungeana Auct. II. 813.
— — DC. II. 813.
— — cerifera Dipp. II. 813.
— — microphylla Ht. II. 813.
— — obovata Auct. II. 813
— — parvifolia Wenz. II. 813.
— canadensis Gaertn. II. 824.
— caroliniana Mill. II. 822.
— catawbiensis Ashe II. 824.
— chinensis Roxh. II. 820.
— — rhynchophylla Hemsl. II. 820.
— ciliata Dipp. II. 820.
— cilicica Ling. II. 815.
— concolor Mühl. II. 826.
— coriariaefolia Scheele II. 831.
— cuspidata Torr. II. 820.
— Darlingtonii Britt. II. 826.
— densiflora Ling. II. 816.
— dimorpha Coss. et Dur. II. 822.
— — dumosa Carr. II. 822.
— dipetala Hook. et Arn. II. 820.
— Dippeliana Ling. II. 813.
— Elonza Dipp. II. 834.
— epiptera Mchx. II. 824.
— excelsior L. II. 829.
— — acuminata Schur II. 829.
— — argentea Loud. II. 830.
— — asplenifolia Kirchn. II. 830.
— — atrovirens Dipp. II. 830.
— — aurea Pers. II. 830.
— — — pendula Loud. II. 830.
— — australis Gren. et Godr. II. 833.
— — concavifolia Ht. II. 830.
— — erosa Willd. II. 830.
— — coriariaefolia Boiss. II. 831.
— — crispa Willd. II. 830.
— — cucullata Ht. II. 830.
— — diversifolia Ait. II. 830.
— — — laciniata C. Schn. II. 830.
— — — pendula C. S. II. 830.
— — elegantissima Ht. II. 830.
— — globosa Ht. II. 830.
— — horizontalis Desf. II. 830.
— — humilis Ht. II. 830.
— — jaspidea Desf. II. 830.
— — Kincairniae Loud. II. 830.
— — laciniata Ht. II. 830.
— — leucocarpa Beissn. II. 830.
— — lutea Loud. II. 830.
— — monophylla Dipp. II. 830.
— — — O. Ktze. II. 830.
— — nana Loud. II. 830
— — obtusata Schur II. 829.
— — pendula Ait. II. 830.
— — polemoniifolia Ht. II. 830.
— — pumila Ht. II. 830.
— — scolopendrifolia Ht. II. 830.
— — simplicifolia Pers. II. 830.
— — — laciniata Kirchn. II. 830.
— — spectabilis Dipp. II. 830.

Fraxinus excelsior verrucosa Desf. II. 830.
— exoniensis Ht. II. 830.
— expansa Ht. II. 826.
— florihunda Ht. II. 814.
— — Wall. II. 817.
— floridana Sarg. II. 822.
— florifera Scop. II. 814.
— glahra Ht. II. 827.
— Griffithii Clarke II. 818.
— heterophylla Vahl II. 820.
— holotricha Koeh. II. 831.
— hybrida Ling. II. 822.
— integrifolia Ht. II. 830.
— juglandifolia Ht. II. 836.
— — Lam. II. 824.
— — epiptera Wesm. II. 824.
— — normalis Wesm. II. 824.
— Karducha Kotschy II. 835.
— Koehneana Ling. II. 820.
— Kotschyi C. Schn. II. 816.
— lanceolata Borkh. II. 826.
— lentiscifolia Desf. II. 834
— linearis Ht. II. 830.
— longicuspis Sieb. et Zucc. II. 816.
— — sambucina Ling. II. 816.
— — Sieholdiana Ling. II. 816.
— — typica C. Schn. II. 816.
— macropetala Eastw. II. 820.
— mandshurica Rupr. II. 827.
— Mariesii Hook. F. II. 818.
— Michauxii Britt. II. 826.
— micrantha Ling. II. 820.
— microphylla Ht. II. 835.
— monophylla Desf. II. 830.
— nana Pers. II. 830.
— nigra Marsh. II. 828.
— — mandshurica Ling. II. 828.
— — samhucifolia Ling. II. 828.
— Nova Anglia Mill. II. 824.
— Novae Angliae Ht. II. 824.
— numidica Dipp. II. 833.
— obliqua Tausch II. 832.
— obovata Bl. II. 813.
— oregona Nutt. II. 827.
— — pulverulenta Ht. II. 827.
— Ornus L. II. 813.
— — angustifolia Ten. II. 813.
— — argentea Gren. et Godr. II. 814.
— — juglandifolia Ten. II. 813.
— — latifolia Ait. II. 813.
— — rotundifolia Ht. II. 813.
— — — Ten. II. 813.
— — sanguinea Hausm. II. 814.
— ovata Bosc II. 816.
— oxycarpa Auct. II. 833.
— — Willd. II. 833.
— — parvifolia Boiss. II. 835.
— — rostrata C. Schn. II. 833.
— — typica C. Schn. II. 833.
— oxyphylla Auct. II. 833.
— — M. Bieh. II. 833.
— — oligophylla Boiss. II. 832.
— — subintegra Boiss. II. 834.
— paniculata Mill. II. 814.
— pannosa Ht. II. 826.
— parvifolia Lam. II. 834.

Fraxinus parvifolia Ling. II. 813.
— — Willd. II. 833.
— — minor Dipp. II. 835.
— — monophylla Dipp. II. 835.
— pauciflora Nutt. II 822.
— Paxiana Ling. II. 818.
— pennsylvanica Marsh. II. 825.
— — aucubaefolia Rehd. II. 826.
— — lanceolata Sarg. II. 826.
— — profunda Ling. II. 827.
— — pubescens Ling. II. 826.
— — viridis C. Schn. II. 826.
— persica Boiss. II. 834.
— petiolulata Boiss. II. 835.
— pistaciaefolia Torr. II. 827.
— platycarpa Mchx. II. 823.
— — floridana Wenz. II. 822.
— platypoda Oliv. II. 822.
— polemoniifolia Poir. II. 830.
— potamophila Herder II. 835.
— profunda Bush II. 827.
— pubescens Lam. II. 826.
— — Boscii Hit. II. 824, 826.
— — longifolia Hit. II. 826.
— pubinervis Bl. II. 816.
— — hamato-serrata Bl. II. 816.
— quadrangularis Hit. II. 829.
— quadrangulata Mchx. II. 828.
— raibocarpa Rgl. II. 812.
— Regelii Dipp. II. 835.
— retusa Champ. II. 818.
— — Henryana Oliv. II 818.
— — integra Ling. II. 818.
— rhynchophylla Hance II. 820.
— rostrata Guss. II. 833.
— rotundifolia Lam. II. 813.
— — Mill. II. 834.
— — Will. et Roth. fl. 813.
— — lentiscifolia C. Schn. II. 834.
— sambucifolia Lam. II. 828.
— serratifolia Hit. II. 819.
— Sieboldiana Blume II. 816.
— — Dipp. II. 819.
— — Shirasawa II 828.
— — sambucina Bl. II. 816.
— simplicifolia Willd. II. 830.
— sogdiana Bge. II. 835.
— — Dipp. II. 832.
— Spaethiana Ling. II. 819.
— syriaca Boiss. II. 832.
— — oligophylla Ling. II. 832.
— — persica Ling. II. 834.
— Szaboana Ling. II. 820.
— tamariscifolia Ht. II. 833, 834.
— — Vahl II. 834.
— tetragona Du Mont de Cours. II. 829.
— texensis Sarg. II. 824.
— Theophrasti Hit. II. 813.
— tomentosa Mchx. II. 826.
— Toumeyi Britt. II 827.
— trialata Buckl. II. 823.
— triptera Nutt. fl. 823.
— Veltheimi Hit. II. 830.
— velutina Ling. II. 820.
— — Torr. II. 827.
— viridis Mchx. II. 826.
Fraxinus Willdenowiana Koeh. II. 833.
— xanthoxyloides Wall. II. 821.
— — dimorpha Ling. II. 822.
— — dumosa Ling. II. 822.
Fremontia Torr. II. 392.
— californica Torr. II. 392.
— vermicularis Torr. 266.
Fremontodendron californicum Cov. II. 392.
Fuchsia L. II. 418.
— coccinea Ait II. 419.
— — Ht. II. 419.
— — gracilis Ldf. II. 420.
— cordifolia Benth. II. 419.
— decussata Grah. II. 420.
— discolor Ldl. II. 419.
— fulgens DC. II. 419.
— globosa Ldl. II. 419.
— gracilis Ht. II 420.
— — Ldl. II. 420.
— macrostemma R. et P. II. 419.
— — globosa Wats. II 419.
— — gracilis Nich. et Mott. II. 420.
— — recurvata Hook II. 419.
— magellanica Lam. II. 419.
— — discolor Bail. II. 420.
— — globosa Bail. II. 419
— — gracilis Bail. II. 420.
— microphylla Kunth II. 419
— Riccartoniana Hit. fl. 419.
— splendens Zucc. II. 419.
— Thompsonii Voss II. 420.
Fumana Spach II. 355.
— arabica Spach II. 356.
— glutinosa Boiss. fl. 356.
— nudifolia Janch. II. 1038.
— procumbens Gren. et Godr. II. 355.
— thymifolia Verl. II. 356, **1018**

Gale Adans. 72.
— Gale C. S. 72, 803.
— — tomentosa C. S. 72.
— Hartwegi Chev. 72.
— palustris Chev. 72, **803**.
Garrya Dougl. II. 459.
— elliptica Dougl. 459.
— — Palmeri Wang. II 459.
— Fadyeni Hook. II. 460.
— flavescens Wats. II. 461.
— — Palmeri Br et Wats. II. 459.
— Fremonti Torr. II. 461.
— rigida Eastw II. 461.
— Veatchi Kellogg II. 460.
Gaultheria (Gaulthiera) L. II. 536.
— adenothrix Maxim. II. 537.
— humifusa C. Schn. II. 536.
— Myrsinites Hook. II. 536.
— Nummulariae DC. II. 538.
— nummularioides D. Don II. 538.
— ovatifolia A. Gray II. 536.
— procumbens L. II. 536.
— pyrolaefolia Hook. II. 538.
— pyroloides Hook. II. 537.
— repens Bl. II. 538.
— Shallon Pursh II. 536.
— trichophylla Royle II 538.

Gautiera procumbens Torr. II. 537.
Gaylussacia H., B. et K. II. 546.
— haccata K. Koch II. 548.
— brachycera Gray II. 546.
— dumosa Torr. et Gr. II. 547.
— — hirtella Gray II. 547.
— frondosa Torr. et Gr. II. 547.
— hirtella Klotzsch II. 547.
— resinosa Torr. et Gr. II. 548.
— ursina Torr. et Gr. II. 548.
Geblera suffruticosa Fisch. et Mey. II. 135.
Gelsemium Juss. II. 843.
— nitidum Mchx. II. 843.
— sempervirens Ait. II. 843.
Genista L. II. 25.
— aetnensis DC. II. 27.
— alba Lam. II. 43.
— Andreana Puiss. II. 42, 1009.
— anglica L. II. 30.
— — subinermis Legr. II 30.
— anxantica Ten. II. 33.
— arcuata Koch II. 29.
— Ardoini Rouy II. 45.
— argentea Noul. II. 24.
— aristata Presl II. 29.
— aspalathoides Poir. II. 28.
— — confertior Moris II. 28.
— austriaca Scheele II. 55.
— Boissieri Spach II. 28.
— canariensis L. II. 41.
— candicans L. II. 42.
— capitata Scheele II. 54.
— carinalis Grisb. II. 32.
— cinerea DC. II. 32, 1009.
— dalmatica Bartl. II. 29.
— decumbens W. II. 48.
— Delarbrei Lec. et Lam. II. 34.
— depressa M. B. II. 32, 34.
— — moesica Vel. II. 32.
— diffusa W. II. 47.
— elata Wend. II. 33.
— elatior Koch II. 33.
— — hirsuta Alb. II. 35.
— elongata Scheele II. 52.
— ephedroides DC. II. 28.
— eriocarpa Kze. II. 1009.
— ferox Poir. II. 28.
— florida L. II. 32.
— Friwaldskyi Boiss. II. 32.
— genuensis Pers. II. 32.
— germanica L. II. 30.
— — inermis Koch II. 30.
— — subinermis Rouy II. 30.
— glabrescens Briq. II. 45.
— grandiflora Spach II. 43.
— herbacea Lam. II. 36.
— heteroacantha Schl. et V. II. 30.
— hispanica L. II. 30.
— — hirsuta Willk. II. 30.
— — occidentalis Rouy II. 30.
— — villosa Wllk. II. 30.
— holopetala Rchb. II. 27.
— horrida DC. II. 28.
— humifusa Vill. II. 31.
— — Wulf. II. 47.
— humilis Ten. II. 33.
Genista hungarica Kern. II. 33.
— insubrica Brüg. II. 33.
— Jacquiniana Scheele II. 51.
— januensis Viv. II. 32.
— Jauberti Spach II. 27.
— Jordani Shuttlew. II. 35.
— juncea Scop. II. 23.
— Kitaibeli Janka II. 48.
— lasiocarpa Spach II. 35.
— — Perreymondi Spach II. 35.
— linifolia L. II. 41.
— Loheli DC. II. 28.
— longipes Rouy II. 48.
— maderensis Lowe II. 41.
— mantica Poll. II 34.
— Mayeri Janka II. 35.
— Micheli Spach II. 30.
— mingrelica Alb. II. 34.
— minor Lam. II. 30.
— monosperma Lam. II. 26.
— multiflora Spach II. 43.
— nervata Kit. II. 33.
— nigricans Scheele II. 46.
— — sericea Briq. II. 46.
— Notarisii Rouy II. 52.
— numidica Spach II. 28.
— nyssana Petr. II. 28.
— odorata Mnch. II. 23.
— ovata W. et K. II. 35.
— — humilior Bert. II. 34.
— — lasiocarpa Gr. et God. II. 35.
— — — Balbisi C. S. II. 35.
— — — Perreymondi C. S. II. 35.
— — Mayeri C. S. II. 35.
— — typica C. S. II. 35.
— patula M. B. II. 34.
— pedunculata L'Hér. II. 48.
— — diffusa Fiori II. 47.
— — glabrata Gér. II. 47.
— Perreymondi Lois. II. 35.
— pilosa L. II. 35.
— — Jordani Fiori II. 35.
— — microphylla Rouy II. 35.
— — subalpina Rouy II. 35.
— polygalaefolia DC. II. 32.
— polytricha Scheele II. 53.
— procumbens W. et K. II. 48.
— pubescens Lg. II. 33.
— pulchella Vis. II. 31.
— purgans L. II. 44.
— purpurea Scheele II. 50.
— radiata Scop. II. 27.
— — holopetala Dipp. II. 27.
— — nana Spach II. 27.
— ramentacea Briq. II. 36.
— repens Lam. II. 35.
— Richteri Rouy II. 42.
— sagittalis L. II. 35.
— — angustifolia Rouy II. 36.
— — latifolia Rouy II. 36.
— — minor DC. II. 36.
— Saugeana Rouy II. 45.
— scariosa Viv. II. 32.
— scoparia Lam. II. 42.
— Scopoli Rouy II. 52.
— sericea Wulf. II. 31.

Genista sibirica L. II. 34.
— silvestris Scop. II. 29.
— — arcuata Rehb. II. 29.
— — aristata Fiori et P. II. 29.
— — dalmatica Rehb. II. 29.
— — genuina Rehb. II. 29.
— — innocua C. S. II. 29.
— — Micheli C. S. II. 30.
— spathulata Spach II 32.
— sphaerocarpa Lam. II. 27.
— stenopetala Webb II. 41.
— supina Scheele II. 54.
— Tabernaemontani Scheele II. 46.
— tenuifolia Lois. II. 33.
— tetragona Bess. II. 32.
— — rhodopea Vel. II. 32.
— tinctoria L. II. 33.
— — alpestris Bertol. II. 33.
— — — plena C. S. II. 33.
— — anxantica Fiori II. 33.
— — Balbisi Rouy II. 35.
— — elatior F. Sch. II. 33.
— — — Rouy II. 33.
— — elongata Rouy II. 33.
— — hirsuta DC. II. 33.
— — humilior C. S. II. 34.
— — — mantica C. S. II. 34.
— — humilis Fiori II. 33.
— — insubrica Brüg. II. 33.
— — lanceolata Koch II. 33.
— — lasiogyna Greml. II. 33.
— — latifolia Auct. II. 33.
— — — DC. II. 34.
— — littoralis Corb. II. 33.
— — mantica Fiori II. 34.
— — — Wobll. II. 34.
— — Marii Favr. II. 33.
— — Mayeri Beck II. 35.
— — ovata F. Sch. II. 35.
— — Perreymondi Rouy II. 35.
— — platyphylla Gér. II. 33.
— — plena Rehd. II. 33.
— — pratensis Poll. II. 33.
— — — Rouy II. 33.
— — pubescens Lg. II. 33.
— — stenophylla Boiss. II. 33.
— — tenuifolia Fiori II. 33.
— — virgata Koch. II. 33.
— — vulgaris Spach II. 33.
— — — lanceolata C. S. II. 33.
— — — platyphylla C. S. II. 33.
— triangularis Kit. II. 32.
— triflora Rouy II. 45.
— triquetra W. et K. II. 32.
— umbellata Poir. II. 31.
— Villarsi Clem. II. 31.
— Villarsiana Jord. II. 31.
— virgata W. II. 33.
— Weldeniana Scheele II. 36.
Genistella Mnch. II. 35.
— racemosa Mnch. II. 36.
Gerardia Iruticosa Pursh II. 615.
Geum chamaedrifolium Crtz. 526.
Gilia Ruiz et Pav. II. 587.
— californica Benth. II. 587.
— pungens Benth. II. 587.
Gilibertia japonica Harms II. 420.
Gleditsia (Gleditschia) L. II. 8.
— aquatica Marsh. II. 13.
— australis Hemsl. II. 10.
— brachycarpos Pursh II. 12.
— Bujoti Neum. II. 12.
— caroliniensis Lam. II. 13.
— caspica Desf. II. 12.
— Delavayi Franch. II. 11.
— ferox Desf. II. 10.
— — inermis C. S. II. 11.
— — nana Rehd. II. 11.
— Fontanesi Spach II. 10.
— heterophylla Bge. II. 13.
— horrida Mak. II. 11.
— — W. II. 10.
— — caspica C. S. II. 12.
— inermis L. II. 12.
— — Mill. II. 13.
— — elegantissima Bret. II. 1008.
— — × triacanthos II. 13.
— japonica Miq. II. 12.
— — inermis Mayr II. 12.
— — purpurea Rehd. II. 12.
— laevis Ht. II. 12.
— macracantha Desf. II. 10.
— — Hemsl. II. 10.
— monosperma Walt. II. 13.
— officinalis Hemsl. II. 9.
— sinensis Ht. II. 10.
— — Lam. II. 9.
— — Maxim. II. 10.
— — inermis Loud. II. 11.
— — nana Loud. II. 11.
— — purpurea Loud. II. 12.
— texana Sarg. II. 12.
— triacanthos L. II. 12.
— — brachycarpos Mchx. II. 12.
— — inermis Pursh II. 12.
— — Bujoti Rehd. II. 12.
— — laevis Koch II. 12.
— xylocarpa Hance II. 10.
Globularia L. II. 627.
— bellidifolia Ten. II. 628.
— cordifolia L. II. 627.
— — bellidifolia Brand II. 628.
Glochidion Forst. II. 1019.
— obovatum S. et Z. II. 1019.
Glossopetalon A. Gray II. 186.
— meionandrum Koch. II. 187.
— nevadense Gray II. 186.
— spinescens Gray II. 186.
Glycine Irutescens L. II. 76.
— sinensis Sims II. 79.
Gnaphalium angustifolium Lam. II. 761.
— italicum Roth II. 761
— microphyllum Willd. II. 761.
— Stoechas L. II. 761.
Goldfussia Dalhousiana Nees II. 1055.
Gordonia Ellis II. 329.
— Altamaha Sarg. II. 329.
— lasianthus Ellis II. 330.
— pubescens L'Hér. II. 330.
Goughia neilgherrensis Wight II. 135.
Grayia Hook. et Arn. 262.
— Brandegii Gray 263.

Grayia polygaloides Hk. et Arn. 262.
— spinosa Moç. 262.
Grewia L. II. 366.
— oppositifolia Buch.-Ham. II. 366.
— parvifolia Bge. II. 366.
Grisellnia littoralis Raoul II. 434.
Grossularia vulgaris Spach II. 000.
Gullandina dioeca L. II. 14.
Gutierrezia Lag. II. 755.
— Euthamiae Torr. et Gr. II. 755.
— Sarothrae Britt. et Rusb. II. 755.
Gymnocladus Lam. II. 13.
— canadensis Lam. II. 14.
— chinensis Bail. II. 14.
— dioeca Koch II. 14.
— — fol. varieg. Ht. II. 14.
— — varicgata Zbl. II. 14.

Hahnia Medic. 684.
— arbutifolia nigra Med. 700.
— — rubra Med. 699.
— Aria Med. 688.
— — Habellifolia Dipp. 689.
— — graeca Dipp. 690.
— — majestica Dipp. 688.
— chamaemespilus Med. 698.
— Hosti Dipp. 694.
— Mougeoti C. S. 694.
— succica Dipp. 692, 694.
— torminalis Med. 696.
Halesia Ellis II. 582.
— carolina L. II. 583.
— — dialypetala C. Schn. II. 583.
— — glabrescens Perk. II. 583.
— — laevigata Perk. II. 583.
— — Mechani Perk. II. 583.
— — mollis Perk. II. 583.
— diptera Ellis II. 583.
— hispida Mast. II. 584.
— Mechani Mechan II. 583.
— parviflora Mchx. II. 583.
— reticulata Buckl. II. 583.
— stenocarpa Koch II. 583.
— tetraptera Ellis II. 583.
— — dialypetala Rchd. II. 583.
— — glabrescens Lange II. 583.
— — laevigata Schelle II. 583.
— — Mcehani Sarg. II. 583.
— — mollis Lange II. 583.
— — parviflora Schelle II. 583.
Halimium Willk. II. 349.
— canadense Gross. II. 350.
Halimodendron Fisch. II. 93.
— argenteum Fisch. II. 94.
— — fl. purpureo Ht. II. 93.
— — purpureum Zab. II. 93.
— Halodendron Voss II. 93.
— — purpureum C. S. II. 93.
Halocnemum fruticosum Dietr. 266.
Haloxylon Bge. II. 907.
— Ammodendron Bg. II. 907.
— persicum Bge. II. 908.
Hamamelis L. 433.
— arborea Mast. 434.
— chinensis R. Br. 433.
— japonica S. et Z. 434.
Hamamelis macrophylla Pursh 434.
— mollis Oliv. 434.
— persica DC. 429.
— vernalis Sarg. II. 000.
— virginiana L. 433.
— — carolina L. 430.
Hamiltonia oleifera Mühlbg. 247.
— suaveolens Don II. 1055.
Haplopappus Auct. (Aplopappus) II. 755.
Hedera L. II. 421.
— algierensis Ht. II. 422.
— arborea Ht. II. 422.
— — dentata Ht. II. 423.
— canariensis Willd. II. 422.
— — × Helix II. 422, 1040.
— chrysocarpa Walsh II. 422.
— colchica Koch II. 422.
— — dentata Hibb. II. 422.
— — purpurea Hibb. II. 423.
— — rhombifolia Boiss. II. 422.
— communis S. F. Gray II. 422.
— dentata Ht. II. 422.
— Helix L. II. 422.
— — arborescens Lodd. II. 422.
— — canadensis DC. II. 422.
— — chrysocarpa DC. II. 423.
— — — Ten. II. 422.
— — colchica Koch II. 423.
— — crenata Ht. II. 422.
— — digitata Lodd. II. 422.
— — donerailensis Ht. II. 422.
— — elegantissima Ht. II. 422.
— — gracilis Ht. II. 422.
— — hibernica Kirchn. II. 422.
— — Hodgensi D. Moore II. 422.
— — leucocarpa Seem. II. 422.
— — Lowei Ht. II. 422.
— — marginata Ht. II. 422.
— — melanocarpa Seem. II. 422.
— — sagittifolia Ht. II. 422.
— — tricolor Ht. II. 422.
— — variegata Ht. II. 422.
— — vitifolia Ht. II. 422.
— — vulgaris DC. II. 422.
— — — arborescens C. S. II. 422.
— — — digitata C. S. II. 422.
— hibernica scotica Ht. II. 422.
— japonica Jungh. II. 420.
— macrophylla Ht. II. 423.
— maderensis Ht. II. 422.
— poetarum Bertol. II. 422.
— quinquelolia L. II. 317.
— Roegneriana Ht. II. 423.
— scotica Ht. II. 422.
— taurica Ht. II. 423.
Hedysarum L. II. 107.
— arbuscula Maxim. II. 108.
— fruticosum Pall. II. 107.
— multijugum Maxim. II. 107.
— — apiculatum Sprag. II. 1017.
— paniculatum L. II. 1017.
— scoparium Fisch. et Mey. II. 108.
— sericeum Thbg. II. 114.
— tiliaefolium Don II. 110.
Helianthemum Adans. II. 349.
— alpestre DC. II. 355.

Helianthemum apenninum Mill. II. 351, 1038.
— — polifolium Gross. II. 351.
— — angustifolium C. S. II. 351.
— — oblongifolium C. S. II. 351.
— — roseum Gross. II. 351.
— — velutinum Gross. II. 351.
— arabicum L. II. 356.
— canadense Mchx. II. 350.
— canum Baumg. II. 353.
— Chamaecistus Mill. II. 351, 352.
— — cupreum Gross. II. 352.
— — foetidum Gross. II. 352.
— — grandiflorum Fiek II. 352.
— — hirsutum Gross. II. 351.
— — macranthum Gross. II. 352.
— — roseum Gross. II. 352.
— — serpyllifolium Gross. II. 351, 1038.
— — tomentosum Aschers. II. 352.
— foetidum Pers. II. 352.
— Fumana Mill. II. 355.
— glutinosum Benth. II. 356.
— grandiflorum Lam. et DC. II. 352.
— hirsutum Mér. II. 351.
— hyssopifolium cupreum Sweet II. 352.
— italicum Pers. II. 353.
— Kotschyanum Boiss. II. 352.
— lavendulifolium Mill. II. 350.
— macranthon Sweet II. 352.
— — multiplex Sweet II. 352.
— marifolium Mill. II. 353.
— nummularium Dun. II 351.
— — cupreum C. S. II. 352.
— — — cupreoplena C. S. II. 352.
— — foetidum C. S. II. 352.
— — glabrum C. S. II. 351.
— — grandiflorum C. S. II. 352.
— — macranthum C. S. II. 352.
— — — alboplena C. S. II. 352.
— — obscurum C. S. II. 351.
— — roseum C. S. II. 352.
— — — roseoplena C. S. II. 352.
— — Scopolii C. S. II. 352.
— — tomentosum C. S. II. 352.
— — — multiplex C. S. II. 352.
— oelandicum W. II. 353.
— — canescens Hartm. II. 353.
— — praecox Fries II. 353.
— ponicillatum Thib. II. 354.
— polifolium Pers. II. 351.
— — angustifolium Koch II. 351.
— — oblongifolium Koch II. 351.
— procumbens Dun. II. 355.
— pulverulentum Lam. et DC. II. 351.
— — genuinum Willk. II. 351.
— — roseum Willk. II. 351.
— — velutinum Willk. II. 351.
— — virescens Willk. II. 351.
— rodanthum Dun. II. 351.
— roseum Lam. et DC. II. 351.
— — multiplex Sweet II. 352.
— rupifragum Kern. II. 355.
— serpyllifolium multiplex Sweet II. 352.
— thymifolium Pers. II. 356.
— tomentosum Dun. II. 352.
— variabile Spach II. 352.
Helianthemum velutinum Jord. II. 351.
— vineale Spreng. II. 353.
— vulgare Gaertn. II. 352.
— — glabrum Koch II 351.
— — grandiflorum Koch II. 352.
— — — discolor Scopolii Wllk. II. 352.
— — hirsutum Koch II. 351.
— — multiplex Sweet II. 352.
— — obscurum Wahlb. II. 351.
— — roseum Willk. II. 352.
— — Scopolii Rouy et Foue. II. 352.
— — tomentosum Koch II. 352.
Helichrysum Gaertn. II. 760.
— angustifolium DC. II. 760.
— diosmifolium Sweet II. 762.
— italicum Guss. II. 761.
— microphyllum Camb. II. 761.
— rosmarinifolium DC. II. 761.
— Stoechas DC. II. 761.
— — Sihth. et Sm. II. 761.
Helwingia Willd. II. 434.
— chinensis Batal. II. 436.
— — genuina Wang. II. 436.
— — longipedicellata Wang. II. 436.
— himalaica Hk. F. et Thoms. II. 435
— japonica Dietr. II. 434, 1041.
— rusciflora Willd. II. 434.
Hemiptelea Planch. 224.
— Davidii Planch. 224, II. 905.
Heptapleurum Gaertn. II. 420.
— impressum Clarke II. 420
Hesperaloë Englm. II. 859.
— parviflora Coult. II. 859.
— yuccaelolia Englm. II. 859.
Hesperomeles Ldl. 762.
— glabrata Roem. 763.
Hesperoyucca Bak. II. 859.
— Whipplei Bak. II. 859.
Heteromeles Roem. 708.
— arbutifolia Roem. 708.
Hibiscus L. II. 390.
— Hamabo S. et Z. II. 391.
— syriacus L. II. 390.
Hicoria Raf. 76, 803
— alba Britt. 82.
— — × laciniosa 78.
— — × ovata 78.
— — × Pecan 78.
— aquatica Britt. 78.
— borealis Ashe 79, 803.
— carolinae-septentrionalis Ashe 80, 803.
— glabra Britt. 79.
— — hirsuta Ashe 80.
— — microcarpa Trel. 79.
— — odorata Sarg. 79.
— — typica C. S. 79.
— — villosa Sarg. 80.
— laciniosa Sarg. 83.
— — × Pecan 78.
— microcarpa Britt. 79.
— minima Britt. 78.
— — × Pecan 78.
— myristicaeformis Britt. 78.
— pallida Ashe 80.
— Pecan Britt. 76.

Hicoria sulcata Britt. 83.
— texana Le Conte 77.
— villosa Ashe 80, 803, II. 872.
Hippocastanum Gaertn. II. 246
— vulgare Gaertn. II. 247.
Hippophaë L. II. 407.
— angustifolia Lodd. II. 408.
— argentea Pursh II. 406.
— canadensis L. II. 407.
— conferta Wall. II. 408.
— fasciculata Wall. II. 408.
— rhamnoides L. II. 407.
— — angustifolia Loud. II. 408, **1038**.
— — salicifolia Serv. II. 408.
— — thibetana Serv. II. 408.
— salicifolia Don II 408.
— sibirica Lodd. II. 408.
— — taurica Schelle II. 408.
— tibetana Schlecht. II. 408.
Hollboellia Wall. 295.
— chinensis Diels II. 912.
— latifolia Wall. 295.
Holodiscus Max. 495.
— argenteus Max. 495.
— ariaefolius Greene 499.
— australis Hell. 497.
— discolor Asch. et Gr. 499.
— — ariaefolius A. et G. 499.
— — dumosus Dipp. 497.
— — eudiscolor A. et G. 499.
— dumosus Hell. 497, II. 962.
— fissus C. S. 495.
— glabrescens Hell. 497.
— microphyllus Rydbg. 497, II. 962.
— saxicola Hell. 497.
Hololachne songarica Ehrenb. II. 340.
Holostemma sinense Hemsl. II. 855.
Homoiceltis Bl. 226.
— aspera Bl. 227.
Hopea tinctoria L. II. 577.
Horsfieldia horrida Seem. II. 430.
Hortensia aspera Ham. 389.
— opuloides Lam. 392.
Hovenia Thbg. II. 290.
— acerba Ldl. II. 291.
— dulcis Thbg. II. 291.
Hudsonia L. II. 356.
— ericoides L. II. 356.
— montana Nutt. II. 356.
— tomentosa Nutt. II. 356.
Hulthemia Dum. 536.
— herberifolia Dum. 537.
Hydrangea L. 384, II. **937**.
— acuminata S. et Z. 391.
— altissima Wall. 393.
— anomala Don 393, II. 943.
— arborea discolor Ser. 386.
— arborescens L. 387, II. **943**.
— — alba grandiflora Hill II. 943.
— — cordata T. et Gr. 387, II. 943.
— — — grandiflora Rehd II. 943.
— — oblonga T. et Gr. 387, II. 943.
— — — sterilis Rehd. II. 943.
— — × radiata 386.
— — sterilis Torr. et Gr. II. 943.
— — typica C. S. 387, II. 943.
Hydrangea arborescens vulgaris C. S. 387.
— — — T. et Gr. 387.
— Arbostiana Lév. II. 940.
— aspera Don 319, II. 940.
— — Hemsl. [et Diels] II. 942.
— — Ht. 390.
— — Zbl. II. 938.
— — angustifolia Hemsl. II. 942.
— — longipes Diels II. 942.
— — macrophylla Hemsl. II. 942.
— — scabra Rehd. II. 941.
— — sinica Diels II. 942.
— — strigosior Diels II. 940.
— — velutina Rehd. II. 941.
— Azisai Sieb. 392.
— Belzonii S. et Z. 392.
— bracteata S. et Z. 393.
— Bretschneideri Dipp. 390, II. 938.
— — glabrescens Rehd. II. 938.
— — lancifolia Rehd. II. 938.
— — setchuenensis Rehd. II. 938.
— Buergeri S. et Z. 392.
— canescens Koch 386.
— chinensis Max. 388, II. 937.
— cinerea Small 386.
— — sterilis Rehd. II. 943.
— cordata Pursh 587.
— cordifolia S. et Z. 393.
— cuspidata Miq. 392.
— Davidii Fr. II. 937.
— eradiata C. S. 386.
— fulvescens Rehd. II. 941.
— Giraldii Diels 390.
— glabra Hay. II. 943.
— glabripes Rehd. II. 941.
— Hemsleyana Diels 393, II. 942.
— heteromalla Don 389.
— hirta S. et Z. 387.
— Hortensia Ht. 392.
— — Sieb. 392.
— — Hortensia Max. II. 938.
— — japonica Max. 392.
— — Otaksa Max. II. 938.
— hortensis Sm. 391.
— — acuminata Gr. 391.
— — angustata Fr. et Sav. 392.
— — Azisai Gr. 392.
— — Hortensia Rehd. II. 938.
— — Otaksa Gr. 392.
— — pubescens Fr. et Sav. 392.
— hypoglauca Rehd. II. 938.
— integerrima Engl. 393.
— integra Hay. II. 942.
— integrifolia Hay. II. 942.
— involucrata Sieb. 388.
— japonica Sieb. 392.
— — coerulescens Rgl. 392.
— — Hortensia Rgl. II. 938.
— — macrosepala Rgl. 392.
— — Otaksa Rgl. II. 938.
— — stellata Max. 392.
— Kamienskii Lév. II. 940.
— Kawakami Hay. II. 940.
— Khasiana Hk. et Th. 390.
— Lobii Max. 392.
— longifolia Hay. II. 940.

Hydrangea longipes Fr. [et Hemsl.] 389, II. 942.
— — lanceolata Hemsl. II. 942.
— Mandarinorum Diels 386, II. 940.
— mandschurica Koch. 392.
— Maximowiczii Lév. II. 940.
— Moellendorffii Hance 387, II. 937.
— nivea Mchx. 385.
— — glabrata Tausch 386.
— oblongifolia Bl. 389.
— opuloides Koch 391, II. 938.
— — acuminata Dipp. 391.
— — — Buergeri C. S. 392.
— — — typica C. S. 392.
— — angustata C. S. 392.
— — Azisai C. S. 392.
— — chinensis Dipp. 392.
— — cyanoclada Dipp. 392.
— — japonica C. S. 392.
— — — Belzonii C. S. 392.
— — — typica C. S. 392.
— — Hortensia Dipp. II. 938.
— — macrosepala Dipp. 392.
— — Otaksa C. S. 392, II. 938.
— — — Dipp. 392.
— — — Hortensia C. S. 392.
— — — typica C. S. 392.
— — pubescens C. S. 392.
— — stellata Dipp. 392.
— — — fimbriata Dipp. 392.
— — — rosacea C. S. 392.
— — — rubraplena Dipp. 392.
— — — typica C. S. 392.
— Otaksa S. et Z. 392.
— paniculata Sieb. 390, II. 938.
— — grandiflora Sieb. 391.
— — hortensis Max. 391.
— — minor Max. 391.
— — praecox Rehd. II. 938
— — typica C. S. 391.
— pekinensis Ht. 390.
— petiolaris S. et Z. 393, II. 943.
— — cordifolia Fr. et Sav. 393.
— — ovalifolia Fr. et Sav. 393.
— Pottingeri Prain 319.
— pubescens Decne. 390.
— — Ht. 390.
— — Koch. II. 938.
— pubinervis Rehd. II. 938.
— quercifolia Bartr. 384.
— radiata Walt. 385.
— — eradiata Tausch 386.
— — reticulata Tausch 386.
— Rehderiana C. S. II. 940.
— reticulata C. S. 386.
— robusta Hk. et Th. 389, II. 942.
— rosalba van Htte. 392.
— Rosthornii Diels 389, II. 942.
— Sargentiana Rehd. II. 940.
— scandens DC. 387.
— — Max. 393.
— — Poepp. 393.
— — petiolaris Max. 393.
— — Reinii C. S. 388.
— — typica C. S. 388.
— serrata DC. 392.
Hydrangea serrata Koch. 392, II. 938.
— stellata S. et Z. 392.
— strigosa Rehd. II. 942.
— — angustifolia Rehd. II. 942.
— — macrophylla Rehd. II. 942.
— — sinica Rehd. II. 942.
— Thunbergii Sieb. 392.
— tiliaefolia Lév. II. 943.
— umbellata Rehd. II. 937.
— vestita Wall. 389.
— — fimbriata Wall. 389.
— — pubescens Max. II. 938.
— — — Sarg. 390.
— villosa Rehd. II. 940.
— — strigosior Rehd. II. 940.
— virens Sieb. 387.
— vulgaris Mchx. 387.
— — Pursh 387.
— xanthoneura Diels II. 938.
— — glabrescens Rehd. II. 938.
— — Wilsonii Rehd. II. 938.
— yunnanensis Rehd. II. 937.
Hymenanthera R. Br. II. 356.
— crassifolia Hook. II. 357.
Hymenanthes japonicum Bl. II. 490
Hypericum L. II. 332, 1037.
— Androsaemum L. II. 337.
— — × elatum II. 337.
— — × grandifolium II. 337.
— Arnoldianum Rehd. II. 1037.
— Ascyron L. II. 334.
— aureum Bartr. II. 333.
— Buckleyi M. A. Curt. II. 333.
— calycinum L. II. 334.
— — × patulum II. 334.
— cernuum Roxb. II. 335.
— chinense L. II. 337.
— — minutum Kell. II. 337.
— cistifolium Lam. II. 333.
— Coris L. II. 332.
— Dawsonianum Rehd. II. 1037
— densiflorum Pursh II 334.
— — × Kalmianum II. 1038.
— elatum Ait. II. 337.
— empetrifolium W. II. 332.
— floribundum Ait. II. 339.
— galioides Lam. II. 333.
— — × lobocarpum II. 1037.
— Gebleri C. A. Mey. II. 334.
— Giraldii Kell. II. 337.
— grandifolium Choisy II. 337.
— hircinum L. II. 337.
— Hookerianum Wight et Arn. II 335.
— inodorum Willd. II. 338.
— Kalmianum L. II. 334.
— lasianthus L. II. 330.
— lobocarpum Gatt. II. 334
— — × prolificum II. 1037.
— lysimachioides Wall. II. 335.
— Moserianum André II. 334.
— multiflorum Ht. II. 337.
— nothum Rehd. II. 1038.
— oblongifolium Hook. II. 335.
— — Wall. II. 336.
— olympicum L. II. 339.
— patulum Thbg. II. 336.

Hypericum patulum oblongifolium Koeh. II. 336.
— — uralum Koeh. II. 336.
— prolificum L. II. 333.
— Richeri Vill. II. 339.
— salicifolium S. et Z. II. 337.
— sphaerocarpum Michx. II. 333.
— uralum Hamilt. II. 336.

Hyssopus L. II. 604.
— angustifolius M. B. II. 605.
— aristatus Godr. II. 604.
— canescens Nym. II. 605.
— cinerascens J. et F. II. 605.
— decumbens J. et F. II. 605.
— montanus J. et F. II. 605.
— officinalis L. II. 604.
— — albus Kains II. 604.
— — angustifolius Bentb. II. 605.
— — aristatus Briqu. II. 604.
— — canescens Briqu. II. 605.
— — decussatus Pers. II. 605.
— — latifolius Benth. II. 605.
— — montanus Briqu. II. 605.
— — — montanus Briqu. II. 605.
— — — wolgensis Briqu. II. 605.
— — officinalis Briqu. II. 604.
— — — angustifolius Briqu. II. 605.
— — — decumbens Briqu. II. 605.
— — — decussatus Briqu. II 605.
— — — vulgaris Briqu. II. 604.
— — — — albus C. Schn. II. 604.
— — — — roseus C. Schn. II. 605.
— — roseus Schelle II. 605.
— — vulgaris Benth. II. 604.
— orientalis Adam II. 605.

Iberis L. 356.
— commutata Sch. et Kot. 356.
— Garrexiana All. 356
— gibraltarica L 356.
— saxatilis L. 356.
— semperflorens L. 357.
— sempervirens L. 356.
— — rosea Boiss. 356.
— Tenoreana DC. 357.
Icacorea Aubl. II. 571.
Idesia Maxim. II. 360, 1038.
— polycarpa Maxim. II. 360.
— — latifolia Diels II. 360.
— — typica Diels II. 360.
— — vestita Diels II. 360, 1038.
Ilex L. II. 157.
— aestivalis Lam. II. 168.
— ambigua Chapm. II. 168.
— Amelanchier Curt. II. 168.
— Aquifolium L. II 163.
— — balearica Loes. II. 164.
— — calamistrata Goepp. II. 163.
— — carnosa Goepp. II. 163.
— — ciliata Loud. II. 163.
— — — nigricans Loes. II. 163.
— — — platyphylla Loes. II. 163.
— — — serrata Loes. II. 164.
— — — Thunbergiana Loes. II. 164.
— — crassifolia Ait. II. 163.

Ilex Aquifolium echinatum DC. II. 163.
— — ferox Ait. II. 163.
— — heterophylla Ait. II. 164.
— — integrifolia Nolte II. 164.
— — latispina Goepp. II. 163.
— — laurifolia Loud. II. 164.
— — montrosa Goepp. II. 163.
— — nigricans Goepp. II. 163.
— — ovata Dipp. II. 164.
— — platyphylla Goepp. II. 163.
— — serrata Desf. II. 164.
— — Thunbergiana Goepp. II. 164.
— argutidens Miqu. II. 166.
— bronxensis Britt. II. 167.
— caroliniana Loes. II. 165.
— — Trel. II. 168.
— Cassine L. II. 160.
— — angustifolia Ait. II. 160.
— — myrtifolia Sarg. II. 160.
— — latifolia Ait. II. 160.
— — parvifolia C. S. II. 160.
— corallina Franch. II. 165.
— coriacea Chapm. II. 160.
— cornuta Ldl. et Paxt. II. 164.
— crenata Thbg. II. 161.
— — aureovariegata Ht. II. 1023.
— — luteovariegata Rehd. II. 1023.
— — microphylla Rehd. II. 1023.
— — nummularia Yat. II. 1023.
— Dahoon Walt. II. 160.
— — parvifolia Koch II. 160.
— decidua Walt. II. 168.
— Delavayi Franch. II. 165.
— dipyrena Wall. II. 164.
— dubia Britt. II. 169.
— — macropoda Loes. II. 169.
— — mollis Loes. II. 169.
— — monticola Loes. II. 169.
— echinata Mill. II. 163.
— Fargesi Franch. II. 162.
— Fortunei Hort. II. 161.
— furcata Hort. II. 164.
— geniculata Maxim. II. 166.
— glabra Gray II. 160.
— Henryi Loes. II. 168.
— integra Thbg. II. 164.
— intermedia Loes. II. 164.
— japonica C. S. II. 1023.
— laevigata A. Gr. II. 166.
— — Herveyi Rob. II. 1023.
— latifolia Thbg. II. 164.
— laurifolia Kern. II. 164.
— ligustrina Jacqu. II. 166.
— longipes Chapm. II. 168.
— lucida T. et Gr. II. 160.
— macrocarpa Oliv. II. 168.
— macropoda Miqu. II. 169.
— microcarpa Ldl. et Paxt. II. 159.
— mollis Gray II. 169.
— monticola Gray II. 169.
— — mollis Britt. II. 169.
— myrtifolia Walt. II. 160.
— opaca Ait. II. 160.
— — xanthocarpa Rehd. II. 1023.
— Othera Sprgl. II. 1023.
— ovata Goepp. II. 164.

Ilex pedunculosa Miqu. II. 160.
— Perado Ait. II. 162.
— Pernyi Franch. II. 164.
— prinoides Ait. II. 168.
— quercifolia Koeb [et Dipp.] II. 160.
— rotunda Thbg. II. 159.
— rugosa Schmidt II. 165.
— serrata Tbbg. II. 166.
— — urgutidens Rehd. II. 166.
— — Sieboldi Rehd. II. 166.
— Sieboldi Miqu. II. 166.
— Sugeroki Maxim. II. 162.
— verticillata Gray II. 167.
— — chrysocarpa Rob. II. 167.
— — cyclophylla Rob. II. 167.
— — tenuifolia Wats. II. 167.
— vomitoria Ait. II. 165.
— yunnanensis Franch. II. 162.
Illicioides Dnm.-Cours. II. 169.
Illicium L. 328.
— anisatum L. 328, II. 925.
— floridanum Ell. 328.
— religiosum S. et Z. 328.
Indigofera L. II. 65.
— decora Hort. II. 66.
— — Ldl. II. 65.
— Delavayi Franchet II. 67.
— dosua Ldl. II. 67.
— Gerardiana Wall. II. 67.
— hebepetala Bnth. II. 1010.
— Kirilowi Maxim. II. 66.
— macrostachya Bge. II. 66.
— — Vent. II. 67.
— pendula Franch. II. 66.
— pulchella Roxbg. II. 67.
— quadrangularis Grah. II. 67.
— reticulata Koch. II. 66.
— venulosa Champion II. 66.
Ioxylon Ral. 239.
— pomiferum Ral. 239.
Isika alpigena Borkh. II. 707.
— coerulea Borkh. II. 695.
— lucida Moench II. 707.
Itea L. 395.
— chinensis Hk. et A. 396.
— ilicifolia Oliv. 395.
— japonica Oliv. 397.
— javanica Bl. 396.
— khasiana C. S. 396.
— macrophylla Wall. 396.
— nutans Royle 396.
— Oldhamii C. S. 396.
— parviflora Hemsl. 396.
— riparia Coll. et Hemsl. 396.
— umbellata Roxb. 396.
— virginica L. 396.
Iva L. II. 762.
— frutescens L. II. 762.
— oraria Bartl. II. 762.
Ivesia santalinoides Gr. 522.

Jamesia Ral. 807.
— T. et Gr. 375, 807.
— americana T. et Gr. 375, 807.
— — rosea Purp. 375.
Jasminoides flaccidum Moench II. 611.
Jasminoides rhombifolium Dipp. II. 611.
Jasminum L. II. 837.
— affine Carr. II. 837.
— — Royle II. 837.
— Beesianum Bees II. 837.
— collinum Salisb. II. 839.
— dichotomum Don II. 837.
— floridum Bge. II. 839.
— fruticans L. II. 839.
— Giraldii Diels II. 839.
— glandulosum Wall. II. 837.
— Hamiltoni Don II. 837.
— heteropbyllum Mnch. II. 839.
— — Roxb. II. 840.
— humile Ht. II. 839.
— — L. II. 840.
— nepalense Spr. II. 837.
— nudiflorum Ldl. II. 837.
— — aureum C. S. II. 837.
— — grandiflorum Ht. II. 837.
— officinale L. II. 837.
— — affine Dipp. II. 837.
— — — Nicb. II 837.
— primulinum Hemsl. II. 838.
— pubigerum Don II. 839.
— Reevesi Ht. II. 839.
— revolutum Sims II. 839.
— Sieboldianum Bl. II. 837.
— subulatum Ldl. II. 839.
— syriacum B. et G. II. 839.
— triumphans Ht. II. 839.
— viminale Salisb. II. 837.
— vulgatius Lam. II 837.
— Wallichianum Ht. II. 839.
— — Ldl. II. 839.
Juglans L. 84, II. 872.
— alata C. S. 88.
— alba L. 82.
— — Mchx. 81.
— — minima Marsh. 78.
— — odorata Marsh. 80.
— Allardiana Dode II. 875.
— amara Mchx. 78.
— aquatica Mchx. 78.
— Avellana Dode II. 876.
— californica Wats. 88, II. 879.
— cathartica Mchx. 91.
— cathayensis Dode II. 877.
— cinerea L. 90, II. 879.
— — × nigra 91.
— — × regia 88.
— coarctata Dode II. 875.
— collapsa Dode II. 879.
— cordiformis Max. 91, II. 876.
— — Shir. II. 876.
— — Wangh. 78.
— — × Sieboldiana II. 876.
— costata Dode II. 879.
— Draconis Dode II. 878.
— Duclouxiana Dode II. 872.
— fallax Dode II. 873.
— fraxinifolia Lam. 94.
— glabra Mill. 80.
— — odorata Trel. 80.
— illinoënsis Wangh. 77.
— intermedia Dipp. 86.

Juglans intermedia alata Carr. 88.
— — pirilormis Carr. 86.
— — typica C. S. 86.
— — Vilmoreana Carr. 87.
— kamaonia Dode II. 873.
— laciniosa Mchx. 83.
— Lavallei Dode II. 875.
— malosma Dode II. 879.
— mandschurica Ht. II. 875.
— — Max. 91, II. **877**.
— mexicana Wats. 88.
— minima Borkh. 78.
— mollis Englm. 89.
— myristicaeformis Mchx. 78.
— nigra L. 89, II. **879**
— — oblonga Marsh. II. 879.
— — × regia 86.
— oblonga Mill. 91.
— olivaeformis Mchx. 77.
— Orientis Dode II. 873.
— ovalis Wangh. 81.
— ovata Britt. 80.
— — Mill. 81.
— ovoidea Dode II. 879.
— Pecan Marsh. 77.
— Pittenrsii Morr. II. 879.
— porcina Mchx. 80.
— pterocarpa Mchx. 94.
— pyriformis Liebm. 86.
— regia L. 85, II. 872.
— — beloudschistana DC. II. 873.
— — corcyrensis Spr. II. 880.
— — fertilis Kirchn. 85.
— — Irutescens Ht. 85.
— — Iruticosa Dipp. 85.
— — heterophylla K. Koch 85.
— — kamaonia DC. II. 873.
— — laciniata Loud. 85.
— — monophylla DC. 85.
— — pendula Kirchn. 86.
— — praeparturiens Ht. 85.
— — racemosa Duh. 86.
— — sinensis DC. II. 875.
— rugosa Dode II. 879.
— rupestris Engelm. 88, II. 879.
— — major Torr. II. 88, 879.
— — typica C. S. 88.
— Sieboldiana Ht. II. 875.
— — Lav. II. 876.
— — Max. 91, II. **875**.
— sigillata Dode II. 875.
— sinensis Dode II. 875.
— stenocarpa Maxim. 91, II. **877**.
— subcordiformis Dode II. 877.
— subrupestris Dode II. 879.
— sulcata Pursh 83.
— tomentosa Lam. 82.
— Torreyi Dode II. 879.

Kadsura Juss. 341, II. 928.
— chinensis Turcz. 341.
— japonica Dum. 341.
Kalmia L. II. 515.
— angustifolia L. II 516
— — hirsuta Voss II. 516.
— — nana Voss II. 516.
Kalmia angustifolia ovata Pursh II. 516.
— — pumila Nich. et Mott. II. 516.
— — rosea Rehd. II. 516.
— — rubra Ht. II. 516.
— carolina Small II. 515.
— ciliata Bartr. II. 517.
— cuneata Michx. II. 517.
— glauca Ait. II. 517.
— — microphylla Hook. II. 517.
— — rosmarinifolia Pursh II. 517.
— hirsuta Walt. II. 517.
— latifolia L. II. 516, 1046.
— — alba Monill. II. 516.
— — fuscata Rehd. II. 516.
— — monstrosa Mouill. II. 516.
— — minor Mouill. II. 516.
— — myrtifolia Jäg. II. 516.
— — nana Mouill. II. 516.
— — obtusata Rehd. II. 516.
— — Pavarti André II. 516.
— — polypetala Nich. II. 516.
— — rubra Sweet II. 516.
— lucida Ilt. II. 516.
— myrtifolia André II. 516.
— nitida Ilt. II. 516.
— polifolia Wangh. II. 517.
— — microphylla Rehd. II. 517.
— — rosmarinifolia Rehd. II. 517.
Kalmiella hirsuta Small II. 517.
Kalopanax divaricatum Miqu. II. 428
— ricinifolium Miqu. II. 429.
— sciadophylloides Harms II. 429.
— spec. Zab. II. 429.
Kantemon ciliosum Ral. II. 736.
Kelseya Rydb. 485, II. 961.
— uniflora Rydb. 485, II. 961
Kerria DC. (Keria) 501.
— japonica DC. 501.
— — arg.-marg. Ht. 502.
— — fl. pleno Ilt. 502.
— — plena C. S. 502.
— — variegata Zbl. 502.
— — vittato-ramosa Zbl. 502.
— tetrapetala Sieb. 501, II. 962.
Kochia Roth 264.
— prostrata Schrad. 264.
Koelreuteria Laxman II. 255.
— bipinnata Franch. II. 256.
— japonica Auct. II. 255.
— minor Hemsl. II. 256.
— paniculata Laxm. II. 255.
Kolkwitzia Graebn. II. 752, 1061.
— amabilis Graeb. II. 752.
— — calycina Pamp. II. 1061
— — tomentosa Pamp II. 1061.
Koniga spinosa Spach II. 929.
Krameria Loefl. II. 133.
— canescens Gray II. 133.
Kraunhia Ral. II. 75, **1010**.
— floribunda Thnb. II. 1010.
— — brachybotrys Mak. II. 1010.
— — sinensis Mak. II. 1010.
— — typica Mak. II. 1010.
— sinensis Mak. II. 1010.
— — floribunda Mak. II. 1010.
Kunzia Sprgl. 528.

Kunzia glandulosa Greene 529.
— tridentata Sprgl. 528.

Laburnocytisus C. S. II. 40.
— Adami C. S. II. 40.
Laburnum Med. II. 37.
— Adami Kirchn. II. 40.
— alpinum Grisb. II. 39.
— — × anagyroides II. 39.
— — conlertum Kirchn. II. 39.
— — macrostachys Koeb. II. 39.
— — microstachys Koch. II. 39.
— — pendulum Koch II. 39.
— — pilosum Koch. II. 39.
— — typicum C. S. II. 39.
— — — macrostachys C. S. II. 39.
— — — microstachys C. S. II. 39.
— — — pendulum C. S. II. 39.
— Alschingeri Koch II. 38.
— anagyroides Med. II. 37.
— — Alschingeri C. S. II. 38.
— — — sessilifolium C. S. II. 38.
— — Carlieri C. S. II. 38.
— — typicum C. S. II. 37.
— — — bullatum C. S. II. 37.
— — — chrysophyllum C. S. II. 37.
— — — quercifolium C. S. II. 37.
— caramanicum Benth. et H. II. 40.
— ramentaceum Koch II. 36.
— vulgare Grisb. II. 39.
— — Alschingeri Rchb. II. 38.
— — — sessilifolium Koch. II. 38.
— — aureum Rehd. II. 37.
— — bullatum Koch II. 37.
— — Carlieri Kirchn. II. 38.
— — chrysophyllum Späth II. 37.
— — lol. involutis Kirchn. II. 37.
— — intermedium Kirchn. II. 39.
— — Jacquinianum Koch. II. 37.
— — Linneanum Koch. II. 37.
— — Parksii Kirchn. II. 39.
— — quercifolium Kirchn. II. 37.
— — sessilifolium Kirchn. II. 38.
— — Watereri Kirchn. II. 39.
— Watereri Dipp. II. 39.
Lagerstroemia L. II. 1039
— chinensis Lam. II. 1039.
— indica L. II. 1039.
— — angustifolia Koch. II. 1039.
— — latifolia Koch. II. 1039.
Lapageria R. et. P. II. 866
— alba VH. II. 867.
— rosea R. et P. II. 866.
— — albiflora Hk. II. 867.
— — × Philesia buxifolia II. 867
Larrea Orteg. II. 116.
— divaricata Cav. II. 116.
— mexicana Mor. II. 116.
Laurocerasus Roem. 645, II. 992.
— acuminata Roem. 649.
— brasiliensis Roem. 648.
— Brittoniana C. S. 648.
— Buergeriana C. S. 646.
— caroliniana Roem. 650.
— guanaiensis C. S. 650.
— ilicifolia Roem. 648.
Laurocerasus integrifolia C. S. 648.
— javanica C. S. 647.
— lusitanica Roem. 646.
— — marginata C. S. 646.
— — variegata C. S. 646.
— macrophylla C. S. 647.
— — oxycarpa C. S. 647.
— martabanica C. S. 648.
— Maacki C. S. 645.
— occidentalis Roem. 648.
— officinalis Roem. 646.
— — schipkaensis C. S. 646.
— — — Mischeana C. S. 646.
— — — Zabeliana C. S. 646.
— phaeosticta C. S. 649.
— reflexa Roem. 650.
— salicifolia Roem. 645.
— samydoides Roem. 650.
— serbica Panc. 647.
— sphaerocarpa Roem. 650.
— spinulosa C. S. 649.
— undulata Roem. 646.
Laurus L. 352.
— aestivalis L. 351.
— Benzoin L. 351.
— barbonia L. 349.
— caroliniensis Mchx. 349.
— geniculata Walt. 351.
— lucida Thbg. II. 1047.
— nobilis L. 352.
— Sassafras L. 350.
— umbellata Thbg. 706.
— variifolia Salisb. 350.
Lavandula L. II. 600.
— angustifolia Moench II. 601.
— latifolia Vill. II. 601.
— officinalis Chaix II. 601.
— Spica L. II. 600.
— — angustifolia Briqu. II. 601.
— — delphinensis Briqu. II. 601.
— — latifolia L. II. 601.
— vera DC. II. 601.
— vulgaris Lam. II. 601.
Lavatera L. II. 390.
— arborea L. II. 390.
Ledum L. II. 468.
— buxifolium Berg II. 513.
— californicum Kell. II. 470.
— canadense Lodd. II. 470.
— decumbens Lodd. II. 468.
— dilatatum Rupr. II. 469.
— glandulosum Nutt. II. 470.
— groenlandicum Oed. II. 469.
— — × palustre II. 469.
— hirsutum Zab. II. 469.
— latifolium Jacq. [et Ait.] II. 470.
— palustre L. II. 468.
— — decumbens Ait. II. 468.
— — dilatatum Wahlb. II. 469.
— — erectum Ait. II. 468.
— — hirsutum Ht. II. 469.
— — latifolium Mchx. II. 470.
— thymifolium Lam. II. 513.
Leiophyllum Hedw. II. 512.
— buxifolium Elliott II. 512.
— — Hugeri C. Schn. II. 512.

Leiophyllum buxifolium prostratum Gray II. 512.
— — typicum C. Schn. II. 512.
— prostratum Loud. II. 513.
— serpyllifolium DC. II. 513.
Leitneria Chapm. II. 871.
— floridana Chapm. II. 871.
Lembotropis Griseb. II. 46.
— nigricans Griseb. II. 46.
— sessilifolius Koch II. 46.
Lepargyrea Raf. II. 405.
— argentea Greene II. 406.
— canadensis Greene II. 407.
Lepidanthus phyllanthoides Nutt. II. 1019.
Lepidospartum A. Gr. II. 765.
— squamatum Gray II. 765.
Leptodactylon californicum Hook. et Arn. II. 587.
Leptodermis Wall. II. 1055.
— lanceolata Wall. II. 1055.
— oblonga Bge. II. 1055.
Leptopus cordifolius Decsne. II. 1019.
Lespedeza Mchx. II. 110.
— argyrea S. et Z. II. 114.
— bicolor Hook. II. 113.
— — Turcz. II. 112.
— — albiflora Max. II. 113.
— — Sieboldi Max. II. 113.
— Buergeri Miqu. II. 113.
— cyrtobotrya Miqu. II. 113.
— Delavayi Franch. II. 111.
— diversifolia Hemsl. II. 111.
— formosa Koch. II. 113.
— gracilipes Franch. II. 112.
— hirtella Franch. II. 111.
— juncea Pers. II. 114.
— lanceolata Dunn II. 111.
— macrocarpa Bge. II. 111.
— Maximowiczi C. S. II. 113.
— racemosa Dipp. II. 113.
— sericea Miqu. II. 114.
— Sieboldi Miqu. II. 113.
— — albiflora C. S. II. 113.
— velutina Dunn II. 111.
— viatorum Champ. II. 113.
— yunnanense Franch. II. 111.
Leucothoë acuminata Don II. 530.
— axillaris Don II. 530.
— Catesbaei Gray II. 530.
— chlorantha Gray II. 532.
— coriacea DC. II. 532.
— Davisiae Torr. II. 530.
— elongata Small II. 528.
— floribunda Don II. 528.
— Grayana Maxim. II. 532.
— Lobbii Ht. II. 530.
— platyphylla Small II. 530.
— populifolia Dipp. II. 530.
— racemosa Gray II. 528.
— — L. II. 528.
— recurva Gray II. 529.
— rhomboidalis Don II. 533.
— spicata Don II. 528.
— spinulosa Don II. 530.
— Tschonoskii Max. II. 532.
Leycesteria Wall. II. 752.
— formosa Wall. II. 752.
— — rosea Ht. II. 752.
— — variegata Ilt. II. 752.
Ligustidium japonicum Spach II. 795.
Ligustrina Rupr. II. 783.
— amurensis Rupr. II. 1064.
— — japonica Maxim. II. 783.
— — mandschurica Maxim. II. 784.
— — pekinensis Maxim. II. 785.
— Fauriei Lévl. II. 785.
— japonica II. 783.
— pekinensis Rupr. II. 785.
Ligustrum L. II. 794.
— acuminatum Koch. II. 807.
— — macrocarpum C. Schn. II. 807.
— acutissimum Koch. II. 806.
— amurense Carr. II. 805.
— brachystachyum Decne. II. 801.
— — Dipp. II. 803.
— californicum Ht. II. 808.
— ciliatum Rehd. II. 807.
— — Sieb. II. 807.
— compactum Hook. et Th. II. 797.
— coriaceum Carr. II. 795.
— Delavayanum Har. II. 799.
— excelsum aureum Ht. II. 797.
— Fortunei Ht. II. 802.
— Henryi Hemsl. II. 808.
— Ibota Auct. et Ht. II. 805.
— — Sieb. II. 806.
— — S. et Z. II. 807.
— — ciliatum Dipp. II. 807.
— — obovatum Ht. II. 808.
— — Regelianum Rehd. II. 806.
— insulare Decne. II. 804.
— insulense Ht. II. 804.
— italicum Mill. II. 803.
— japonicum Auct. et Ilt. II. 808.
— — Thb. II. 795.
— — Alivoni Andr. II. 797.
— — aureo-marginatum Ht. II. 797.
— — coriaceum Mak. II. 795.
— — excelsum Ilt. II. 797.
— — × lucidum II. 795.
— — macrophyllum Ilt II. 797.
— — ovalifolium Ilt. II. 808.
— — tricolor Ht. II. 797.
— Kellerianum Vis. II. 795.
— Kellermanni Ilt. II. 795.
— laurifolium Roxbg. II. 841.
— lucidum Ait. II. 796.
— — Alivoni Rehd. II. 797.
— — coriaceum DC. II. 795.
— — tricolor Rehd. II. 797.
— macrocarpum Koch. II. 807.
— magnoliaefolium Ilt. II. 797.
— Massalongianum Vis. II. 808.
— medium Franch. et Sav. II. 807.
— — Ilt. II. 807.
— Myrsinites DC. II. 800.
— nepalense Wall. II. 799.
— obtusifolium Auct. et Ht. II. 805.
— — S. et Z. II. 806.
— — dubium Koch. II. 805.
— — Regelianum Rehd. II. 806.

Ligustrum ovalifolium Hassk. II. 807.
— — aureo-marginatum Rehd. II. 808.
— — elegantissimum Ht. II. 807.
— — robustum variegatum Ht. II. 807.
— — tricolor Rehd. II. 808.
— — variegatum Rehd. II. 807.
— Prattii Koeh. II. 808.
— Quihoui Carr. II. 801.
— Regelianum Koeh. II. 806.
— reticulatum Auct. et Ht. II. 808.
— sempervirens Pieri II. 803.
— Sieboldi Ht. II. 795.
— sinense Lour. II. 801.
— — latifolium robustum Ht. II. 797.
— — Stauntoni Rehd. II. 801.
— — villosum Rehd. II. 801.
— spicatum Ht. II. 797.
— Stauntoni DC. II. 801.
— strongylophyllum Hemsl. II. 799.
— syringaeflorum Ht. II. 795, 807.
— Taqueti Lévl. II. 1064.
— Tschonoskii DC. II. 807.
— villosum May II. 801.
— vulgare L. II. 802, **1065**.
— — albo-variegatum C. S. II. 803.
— — atrovirens Späth II. 803.
— — aureo-variegatum C. S. II. 803.
— — aureum Dipp. II. 803.
— — auriflorum Hoefk. II.
— — brachystachyum Hoefk. II.
— — chlorocarpum Loud. II. 803.
— — densiflorum C. S. II. 803.
— — fol. albo-variegatis Kirchn. II. 803.
— — fol. aureo-variegatis Kirchn. II. 803.
— — foliosum Ht. II. 803.
— — glaucum Hoef. II. 1065.
— — — albo-marginatum Rehd. II. 803.
— — insulense Hoefk. II.
— — italicum Kirchn. II. 803.
— — leucocarpum Loud. II. 803.
— — pendulum Dipp. II. 803.
— — pyramidale Dipp. II. 803.
— — sompervirens Loud. II. 803.
— — variegatum Hoefk. II.
— — xanthocarpum Loud. II. 803.
— — — densiflora Koeh. 1803.
— Walkeri DC. II. 799.
— yunnanense Henry II. 800.
Lilac perpensa Lam. II. 771.
— varina Dum.-Cours. II. 774.
— vulgaris Lam. II. 774.
Limonia Laureola DC. II. 127.
— trifoliata Hort. II. 129.
Lindera Benzoin L. 351.
— glauca Bl. 352.
— hypoglauca Max. 352.
— hypoleuca Ht. 352.
— melissaefolia Bl. 351.
— membranacea Max. 351.
— obtusiloba Bl. 352, II. 928.
— praecox Bl. 352.
— sericea Bl. 352.
— — glabrata Bl. 352.
— umbellata Thbg. 351
Lindleya Kunth 492, II. 962.
— mespilioides Kunth 492.
Lindleyella Rydb. II. 962.
— mespiloides Rydb. II. 962.
— Schiedeana Rydb. II. 962.
Linnaea L. II. 680.
— adenotricha Graeb. II. 1060.
— angustifolia Graeb. II. 1060.
— Aschersoniana Graeb. II. 1059.
— biflora Koeh. II. 678.
— borealis L. II. 680.
— Buchwaldii Graeb. II. 1058.
— coriacea Fritsch II. 1059.
— corymbosa Graeb. II. 1060.
— Dielsii Graeb. II. 1060.
— Engleriana Graeb. II. 1059.
— floribunda Br. et V. II. 1059.
— gymnocarpa Graeb. II. 1058.
— Kochneana Graeb. II. 1059.
— macrotera Graeb. et B. II. 1059.
— onkocarpa Graeb. II. 1060.
— parvifolia Graeb. II. 1059.
— Perringiana Graeb. II. 1060.
— Schumannii Graeb. II. 1059.
— Spaethiana Graeb. II. 1060.
— tereticalyx Graeb. II. 1059.
— umbellata Graeb. et B. II. 1060.
— uniflora A. Br. et Vatke II. 678.
— Zanderi Graeb. II. 1060.
Linosyris squamata Gray II. 765.
Linum L. II. 1018.
— arboreum L. II. 1018.
Lippia L. II. 590.
— chamaedryfolia Steud. II. 591.
— citriodora Kunth II. 591.
— juncea Schauer II. 590.
— ligustrifolia G. Thuret II. 590.
— ligustrina Dipp. II. 590.
— Wrightii Gray II. 591.
Liquidambar L. 426.
— acerifolia Max. 427.
— formosana Hance 427.
— imberbe Ait. 427.
— Maximowiczii Miq. 427.
— orientalis Mill. 427, II. 954.
— peregrina L. 74.
— Rosthornii Diels 427.
— styraciflua L. 427.
— — macrophylla Oerst. 427.
— — mexicana Oerst. 427.
Liriodendron L. 339, II. 928.
— chinense Sarg. 340.
— tulipifera L. 339.
— — aureo-marginatum Rehd. II. 928.
— — chinense Hemsl. 340.
— — fastigiatum Ht. II. 928.
— — integrifolium Kirch. II. 928.
— — pyramidale Lav. II. 928.
Lithodora fruticosa Griseb. II. 588
Lithospermum L. II. 588.
— fruticosum L. II. 588.
— graminifolium Viv. II. 590.
— hispidulum S. et S. II. 588.
— petraeum DC. II. 590.
— prostratum Lois. II.
— rosmarinifolium Boiss II. 589.
— — Ten. II. 589.
— suffruticosum A. Kern. II. 590.

Lithospermum Zahnii Heldr. II. 588.
Litsea Lam. 350, 807.
— geniculata Mez 351, 807.
— glauca Sieb. 351, 807.
— japonica Mirb. 351, 807.
Lobadium Raf. II. 148.
Loiseleuria Desv. II. 513.
— procumbens Desv. II. 513.
Lonicera L. II. 681.
— acuminata Wall. II. 728.
— — japonica Miqu. II. 733.
— adenocarpa Guss. II. 741.
— adenophora Franch. II. 710.
— aemulans Rehd. II. 691.
— affinis Hook. et Arn. II. 730.
— — Ht. II. 743.
— — Jacqu. II. 702.
— — hypoglauca Rehd. II. 730.
— — pubescens Maxim. II. 730.
— Alberti Reg. II. 686.
— albiflora Torr. et Gr. II. 739.
— — dumosa Rehd. II. 739.
— alpigena Hook. et Thoms. II. 710.
— — L. II. 707.
— — Formanekiana Dörfl. II. 710.
— — glandulifera Freyn II. 707.
— — × Ledebourii II. 706.
— — leiopbylla Zab. II. 721.
— — macrophylla Arcang. II. 707.
— — nana Nich. II. 707.
— — phaeantba Rehd. II. 707.
— — semiconnata Zab. II. 707.
— — Webbiana Nich. II. 710.
— alseuosmoides Graebn. II. 727.
— altaica Pall. II. 694.
— altissima Jenn. II. 706.
— Altmanni Reg. et Schmalh. II. 699.
— — hirtipes Rehd. II. 700.
— — pilosiuscula Rehd. II. 700.
— — sarawsbanica Rehd. II. 700.
— — tenuiflora Zab. II. 700.
— americana K. Koch II. 742.
— — atrosanguinea Rehd. II. 742.
— — erosa Rehd. II. 742.
— — rubella Rehd. II. 742.
— — × sempervirens II. 734.
— Amherstii Dipp. II. 703, 710.
— amoena Zab. II. 717.
— — alba Zab. II. 717.
— — Arnoldiana Rehd. II. 717.
— — rosea Zab. II. 717.
— angustata Wend. II. 716.
— angustifolia Raf. II. 734.
— — Wall. II. 684.
— — Wend. II. 716.
— anisocalyx Rehd. II. 701.
— arborea Batt. II. 714.
— — Boiss. II. 726.
— — kabylica Batt. II. 714
— — persica Rehd. II. 726.
— arizonica Rehd. II. 735.
— asperifolia Hook. F. et Thoms. II. 702.
— atrosanguinea Carr. II. 742.
— Aucheri Jaub. et Spach II. 698.
— — Lav. II. 697.
— aurea Auch.-El. II. 698.
Lonicera aureo-reticulata J. Moore II. 733.
— barbinervis Kom. II. 715.
— bella Zab. II. 717.
— — albida Zab. II. 717.
— — candida Zab. II. 717.
— — incarnata Zab. II. 717.
— — rosea Zab. II. 717.
— — × Ruprechtiana II. 717.
— bicolor Klotzsch II. 698.
— biflora Desf. II. 730.
— Bordwelliana Ht. II. 705.
— Bournei Hemsl. II. 733.
— Braceana Hemsl. II. 733.
— brachypoda De Cand. II. 733.
— — aureo-reticulata Jac. Mac. II. 733.
— — fol. aureo-reticulatis Lem. II. 733.
— — reticulata Witte II. 733.
— bracteata Royl. II. 701.
— bracteolaris Boiss. et Buhse II. 700.
— Brandtii Franch. et Sav. II. 711.
— Breweri Gray II. 711.
— Brownii Carr. II. 734.
— Buergeriana Blume II. 730.
— Bungeana Ledeb. II. 692.
— calcarata Hemsl. II. 726.
— californica Torr. et Gr. II. 737.
— canadensis Lam. II. 694.
— — Marsh. II. 692.
— — alba Ht. II. 716.
— canescens Schousboe II. 730.
— caprifolioides Koch II. 698.
— Caprifolium Host II. 742.
— — L. II. 741.
— — alba Ait. II. 741.
— — arborea Clem. II. 744.
— — atrosanguinea Lav. II. 742.
— — erosa De Cand. II. 742.
— — × etrusca Rehd. II. 742.
— — — variegata Ht. II. 742.
— — flavescens West. II. 741.
— — × implexa Rebd. II. 741.
— — italica Schm. II. 742.
— — major Carr. II. 742.
— — pallida Lav. II. 741.
— — parvifolia Zab. II. 741.
— — pauciflora Carr. II. 741.
— — × Periclymenum II. 741.
— — praecox De Cand. II. 741.
— — rubella De Cand. II. 742.
— — ruberrima West. II. 742.
— — rubra Tausch II. 741.
— — — West. II. 742.
— — sempervirens West. II. 742.
— — Stabiana Car. II. 742.
— — typica Rehd. II. 741.
— — variegata Lav. II. 742.
— — verna Lav. II. 741.
— Carioti Gand. II. 742.
— carpatica Kit. II. 715.
— caucasica Pall. II. 713.
— cerasina Maxim. II. 695.
— chaetocarpa Rehd. II. 702.
— Niagnarilli Ht. II. 698.
— Chamissoi Bunge II. 713.
— chinensis Wats. II. 732.

Lonicera chlamydocarpa Koch II. 697.
— chrysantha Graehn. II. 698.
— — Miqu. II. 719.
— — Turcz. II. 698.
— — angustifolia Korsh. II. 722.
— — latifolia Korsh. II. 722.
— — longipes Maxim. II. 723.
— — Regeliana Zab. II. 722.
— — subtomentosa Maxim. II. 719.
— — turkestanica Ht. II. 722.
— — villosa Rehd. II. 722.
— — × Xylosteum II. 722.
— ciliaris Ht. II. 697.
— ciliata Ht. II. 717.
— — J. G. Dietr. II. 736.
— — Mühlenb. II. 692.
— ciliosa Hook. et Arn. II. 736.
— — Poir. II. 736.
— — depressa Zab. II. 736.
— — — glabrescens Zab. II. 734.
— — occidentalis Nich. II. 736.
— — plantierensis Dipp. II. 734.
— — voluhilis Zab. II. 736.
— — Youngi Dipp. II. 734.
— coccinea Pers. II. 734.
— cochinchinensis G. Don II. 733.
— coerulea L. II. 693.
— — altaica Sweet II. 694.
— — — emphyllocalyx Rehd. II. 694.
— — angustifolia Reg. II. 693.
— — dependens Reg. II. 693.
— — — gracillora Dipp. II. 693.
— — — viridilolia Dipp. II. 693.
— — edulis Reg. II. 694.
— — glahrescens Rupr. II. 693.
— — — longihracteata Rehd. II. 693.
— — — praecox Lav. II. 693.
— — — salicilolia Dipp. II. 693.
— — — sphaerocarpa Reg. II. 693.
— — — snhglobosa Reg. II. 693.
— — glabriuscula Reg. II. 693.
— — birsuta Reg. II. 694.
— — kamtschatica Ht. II. 694.
— — reticulata Zab. II. 694.
— — sphaerocarpa Dipp. II. 693.
— — subvillosa Zab. II. 694.
— — tangutica Maxim. II. 694.
— — venulosa Rehd. II. 694.
— — villosa Maxim. II. 694.
— — — Torr. et Gr. II. 694.
— coerulescens Dipp. II. 717.
— confusa De Cand. II. 729.
— — Miqu. II. 733.
— conjugialis Kellogg II. 711.
— connata Meerh. II. 739.
— crassifolia Bat. II. 726.
— cyanocarpa Franch. II. 702.
— cyrenaica Viv. II. 744.
— dasystyla Rehd. II. 730.
— davurica Pall. II. 663.
— decipiens Hook. et Thoms. II. 714.
— deflexicalyx Bat. II. 724.
— Delavayi Franch. II. 729.
— depressa Royl. II. 684.
— — Myrtillus Nich. II. 684.
— Diervilla L. II. 747.

Lonicera dimorpha Tausch II. 744.
— dioica L. II. 738.
— — × flava II. 739.
— — × hirsuta II. 737.
— — × prolilera II. 739.
— discolor Lindl. II. 714.
— diversifolia Carr. II. 733.
— — Dipp. II. 725.
— — Wall. II. 725.
— — Royleana DC. II. 725.
— Douglasi DC. II. 737.
— — Koch II. 737.
— — Koch. II. 738.
— dumetorum Moench II. 721.
— dumosa Gray II. 739.
— ehractulata Rydh. II. 692.
— edulis Turcz. II. 694.
— Elisae Franch. II. 704.
— emphyllocalyx Max. II. 694.
— epsomiensis Koch II. 739.
— etrusca Lej. II. 745.
— — Loud. II. 742.
— — Santi II. 743.
— — Browni Reg. II. 734.
— — gigantea Zab. II. 744.
— — hirsuta Post II. 743.
— — × implexa Rehd. II. 741.
— — puhescens Dipp. II. 743.
— — rotundilolia Car. II. 742.
— — superha Nich. II. 743.
— Fargesi Franch. II. 710.
— Ferdinandi Franch. II. 696.
— — Beissneriana Zab. II. 696.
— — Francheti Zah. II. 696.
— — leycesterioides Zab. II. 696.
— — typica Rehd. II. 696.
— — vesicaria Zab. II. 697.
— ferruginea Rehd. II. 729.
— Finlaysoniana Wall. II. 730.
— flammea Salisb. II. 734.
— flava Borie II. 739.
— — Ilt. II. 734, 737. 739.
— — Sims II. 739.
— — Tal. II. 737.
— — × hirsuta II. 737.
— — nova Ilt. II. 734.
— — × prolilera II. 739.
— — × Sullivanti II. 739.
— flavescens Dipp. II. 704.
— — Small II. 740.
— flavida Cock. II. 740.
— flavipes Rehd. II. 690.
— flexuosa Ker II. 732.
— — Thunh. II. 733.
— — aureo-reticulata Dipp. II. 733.
— — Halliana Dipp. II. 731.
— floribunda Bois. et Buhs. II. 718.
— — Zab. II. 718.
— — glahrescens Zab. II. 718.
— — — alha Zab. II. 718.
— — — pallida Zab. II 718.
— — — rosea Zab. II. 718.
— — Korolkowi Zah. II. 718.
— — typica Zab. II. 719.
— — — alhescens Zab. II. 718.
— — — grandiflora Zah. II. 718.

Lonicera floribunda typica rosea Zab. II. 718.
— — Zabelii Koeh. II. 718.
— Formanckiana Hal. II. 710.
— — adenophora Hal. II. 710.
— Fortunei Ilt. II. 698.
— fragrans Ht. II. 698.
— fragrantissima Lindl. et Paxt. II. 698.
— Fraseri Ht. II. 734.
— — Poir. II. 740.
— fuchsioides Hemsl. II. 727.
— — Koeb II. 734.
— germanica Dietr. II. 745.
— — West. II. 745.
— Gbiesbreghthiana Ht. II. 719.
— gibbiflora Rupr. II. 722.
— gibbosa Mich. II. 739.
— — Willd. II. 693.
— gigantea Zab. II. 743.
— — superba Ht. II. 744.
— Giraldii Rehd. II. 729.
— glabrata Wall. II. 727.
— glauca Hill. II. 739.
— — Ilt. II. 739.
— Hook. et Thoms. II. 701.
— — Meerb. II. 741.
— glaucescens Rydb. II. 738.
— — Zab. II. 737.
— Glehnii Fr. Schm. II. 707.
— glutinosa Vis. II. 708.
— Goldii Spreng. II. 737.
— Govaniana Wall. II. 713.
— gracilipes Miqu. II. 692.
— — albiflora Maxim. II. 693.
— — glabra Miqu. II. 693.
— — glandulosa Maxim. II. 693.
— Graebneri Rehd. II. 713.
— grata Ait. II. 742.
— Griffithii Hook. et Thoms. II. 745.
— gynochlamydea Hemsl. II. 695.
— Halliana Ht. II. 731.
— Harmsii Graeb. II. 742.
— Heckrotti Rehd. II. 734.
— hellenica Orph. II. 709.
— helvetica Brügg. II. 716.
— — micra Zab. II. 716.
— Hemsleyana Rehd. II. 711.
— Henryi Hemsl. II. 727.
— heteroloba Bat. II. 710.
— hetorophylla Dec. II. 710.
— — Formanekiana Rehd. II. 710.
— — Karelini Rehd. II. 710.
— — oxyphylla Rehd. II. 710.
— — typica Rehd. II. 710.
— hetrusca Host II. 744
— Hildebrandiana Coll. et Hemsl. II. 733.
— hirsuta Eaton II. 737.
— — Ht. II. 737.
— — glaucescens Rydh. II. 738.
— — involucrata Lav. II. 737.
— — × prolifera II. 737.
— — × sempervirens II. 734.
— — × Sullivantii II. 737.
— hirtiflora Champ. II. 729.
— hirtipes Bunge II. 700.
— hispanica Boiss. et Reut. II. 745.

Lonicera hispida Pall. II. 700.
— — alpina Rgl. II. 701.
— — chaetocarpa Bat. II. 702.
— — hirsutior Reg. II. 701.
— — hirta Reg. et Winkl. II. 701.
— — setosa Hook. et Thoms. II. 701.
— — typica Reg. II. 701.
— hispidula Dougl. II. 736.
— — californica Jeps. II. 736.
— — Douglasi Gray II. 737.
— — interrupta Gray II. 737.
— — subspicata Gray II. 737.
— — vacillans Gray II. 737.
— humilis Kar. et Kir. II. 700.
— hypoglauca Miqu. II. 730.
— hypoleuca Dec. II. 697.
— iberica Marsb. II. 697.
— — erecta Dippel II. 697.
— — microphylla Dipp. II. 697.
— implexa Ait. II. 741.
— — Ht. II. 720.
— incana Dec. II. 726.
— inconspicua Bat. II. 690.
— inlundibulum Franch. II. 704.
— intermedia Kellogg II. 705.
— interrupta Benth. II. 737.
— — subspicata Jeps. II. 737.
— involucrata Banks II. 704.
— — Zab. II. 737.
— — flavescens Rehd. II. 704.
— — humilis Koeh. II. 704.
— — Ledebourii Ht. II. 705.
— — serotina Koeb. II. 704.
— italica Tausch II. 742.
— — atrosanguinea Rehd. II. 742.
— — quercifolia Tausch II. 742.
— — rubella Tausch II. 742.
— japonica Andrews II. 730.
— — Dipp. II. 732.
— — Ht. II 693.
— — Thunb. II. 731.
— — Wall. II. 729.
— — chinensis Bak. II. 732.
— — flexuosa Nich. II. 733.
— — — aureo-reticulata Nich. II. 733.
— — Halliana Nich. II. 731.
— javanica DC. II. 730.
— kabylica Rehd. II. 714.
— Kachkarovii Rehd. II. 714.
— kamtschatica Ilt. II. 713.
— Karelini Bunge II. 710.
— — Ilt. II. 693.
— Kesselringii Reg. II. 713.
— Kirilowii Ilt. II. 693.
— Kochneana Rehd. II. 722.
— — chrysanthoides Rehd. II. 723.
— — intecta Rehd. II. 723.
— — longipes Rehd. II. 723.
— — pallescens Rehd. II. 723.
— Korolkovii Stapl II. 717.
— — floribunda Nich. II. 718.
— — × tatarica II. 717.
— — typica Rehd. II. 718.
— — — albescens Rehd. II. 718.
— — — grandiflora Rehd. II. 718.
— — — rosea Rehd. II. 718.

Lonicera Korolkovii Zabelii Rehd. II. 718.
— kurdistana Schlechtend. II. 726.
— lanceolata Wall. II. 714.
— latifolia Guss. II. 741.
— Ledebourii Eschsch. II. 705.
— leiantha Kurz II. 733.
— leiopbylla Kern. II. 721.
— leptantha Rehd. II. 712.
— Leschenaulti Wall. II. 730.
— leycesterioides Gräbn. II. 696.
— ligustrina Wall. II. 695.
— — pileata Franch. II. 695.
— — yunnanensis Franch. II. 695.
— linderifolia Maxim. II. 692.
— litangensis Bat. II. 690.
— longa Rehd. II. 690.
— longiflora Carr. II. 732.
— — De Cand. II. 733.
— Loureiri De Cand. II. 729.
— — Hook. et Thoms. II. 729.
— Lnscbani Stapf II. 726.
— Maackii Maxim. II. 724.
— — podocarpa Franch. II. 724.
— macrantha Spreng. II. 729.
— macrogyne Klotzsch et Garcke II. 701.
— macrophylla Hook. II. 739.
— — rubra Carr. II. 739.
— Magnevilleae Ht. II. 698, 734.
— majoricensis Gand. II. 704.
— mamilaris Rebd. II. 698.
— Maximowiczii Reg. II. 711.
— — atropurpurea Dipp. II. 712.
— — sachalinensis Fr. Schm. II. 712.
— media Murr. II. 739.
— mexicana Rebd. II. 693.
— micrantha Reg. II. 717.
— — Zab. II. 715, 717.
— micranthoides Zab. II. 715.
— — × Morrowi II. 716.
— — permixta Zab. II. 716.
— — pseudomisera Zab. II. 716.
— — × Ruprecbtiana II. 716.
— — × Xylosteum II. 716.
— microphylla Hook. II. 737.
— — Ht. II. 697.
— — Willd. II. 691.
— — Bungeana Trautv. II. 692.
— — gracilior Ledeb. II. 692.
— — robustior Ledeb. II. 692.
— — Sieversiana Trautv. II. 692.
— minuta Bat. II. 685.
— misera Zab. II. 716.
— mitis Rehd. II. 702.
— Mociniana de Cand. II. 705.
— modesta Rehd. II. 714.
— mollis Vuk. II. 743.
— — Wall. II. 730.
— mongolica Pall. II. 663.
— montigena Rehd. II. 701.
— Morrowii Graebn. II. 698.
— — Gray II. 719.
— — Ht. II. 717.
— — rosea Dipp. II. 717.
— — × Ruprechtiana II. 719.
— — × tatarica II. 717.
Lonicera mucronata Rebd. II. 698.
— muendeniensis Rehd. II. 717.
— multiflora Champ. II. 730.
— mupinensis Rehd. II. 710.
— muscaviensis Rehd. II. 719.
— myrtilloides Purp. II. 684.
— Myrtillus Hook. et Thoms. II. 684.
— — depressa Rehd. II. 684.
— nepalensis Kirchn. II. 717.
— nervosa Maxim. II. 714.
— Niaguarilli Ht. II. 698.
— nigra Cbam. et Schlechtend. II. 713.
— — L. II. 715.
— — Thunb. II. 733.
— — berolinensis Rebd. II. 715.
— — campaniflora Loud. II. 704.
— — grandibracteata Zab. II. 715.
— — latifolia Zab. II. 715.
— — pnberula Zab. II. 715.
— — pyrenaica Dipp. II. 715.
— — × tatarica II. 715.
— — trichota Beck II. 715.
— — typica Rebd. II. 715.
— — — grandibracteata Rehd. II. 715.
— — — latifolia Rehd. II. 715.
— — — pyrenaica Rebd. II. 715.
— — — trichota Rehd. II. 715.
— — — virescens Rehd. II. 715.
— — virescens J. Gér. II. 715.
— — × Xylosteum II. 716.
— notha Zab. II. 717.
— — alba Zab. II. 717.
— — carneo-rosea Gab. II. 717.
— — gilva Zab. II. 717.
— — grandiflora Zab. II. 717.
— — ochroleuca Zab. II. 717.
— nubigena Rehd. II. 702.
— nummularia Fiscb. et Mey. II. 726.
— nnmmulariifolia Jaub. et Sp. II. 726.
— — cordata Post II. 726.
— — var. β Koebn. II. 715.
— oblongifolia Hook. II. 706.
— — altissima Rehd. II. 706.
— — calyculata Zab. II. 706.
— obovata Royl. II. 687.
— obscura Hemsl. II. 733.
— occidentalis Hook. II. 736.
— — K. Koeb II. 734.
— — plantierensis Lav. II. 734.
— — volubilis Zab. II. 736.
— — Yonngii Koch II. 734.
— ochroleuca St. Lag. II. 722.
— odora Salisb. II. 745.
— odoratissima Ht. II. 698.
— Olgae Reg. et Schmalh. II. 700.
— orientalis Hook. et Thoms. II. 713.
— — Lam. II. 713.
— — M. Bieb. II. 713.
— — caucasica Zab. II. 713.
— — discolor Clarke II. 714.
— — Govaniana Rehd. II. 713.
— — Kachkarovii Bat. II. 714.
— — kansuensis Bat. II. 713.
— — Leroyana Zab. II. 716.
— — longifolia Dipp. II. 713.
— — sctchnenensis Franch. II. 707.

Lonicera orientalis typica Rehd. II. 713.
— ovalis Bat. II. 724.
— ovata Hamilt. II. 728.
— oxypbylla Edgew. II. 710.
— Pallasii Ledeb. II. 694.
— pallida Host II. 741.
— pallidiflora Gand. II. 745.
— parviflora Lam. II. 739.
— — Douglasi Gray II. 738.
— — Sullivantii Wood II. 739.
— — var. β Hook. II. 738.
— parvifolia Edg. II. 688.
— — Hayne II. 717.
— — Hook. et Thoms. II. 684.
— — Myrtillus Clarke II. 684.
— pekinensis Rehd. II. 704.
— perfoliata Edw. II. 741.
— periclymena St.-Lag. II. 745.
— Periclymenum L. II. 745.
— — Lour. II. 730.
— — Raf. II. 744.
— — alba West. II. 745.
— — aurea Lind. et A. II. 745.
— — belgica Ait. II. 745.
— — fruticosa Zab. II. 745.
— — glauco-hirta Kunze II. 745.
— — hirsuta Rouy II. 745.
— — minor Lge. II. 745.
— — quercifolia Ait. II. 745.
— — — variegata Ht. II. 745.
— — quercina West. II. 745.
— — — variegata West. II. 745.
— — serotina Ait. II. 745.
— — sinuata Lois.-Desl. II. 745.
— — typica Rehd. II. 745.
— — — aurea Rebd. II. 745.
— — — belgica Rehd. II. 745.
— — — fruticosa Rehd. II. 745.
— — — hirsuta Rebd. II. 745.
— — — minor Rehd. II. 745.
— — — quercina Rehd. II. 745.
— — — serotina Rehd. II. 745.
— — vulgaris Ait. II. 745.
— persica Jaub. et Spach II. 726.
— perulata Rehd. II. 710.
— philippinensis Merr. II. 728.
— Philomelae Carr. II. 693.
— phyllocarpa Maxim. II. 698, 704.
— phyllomachea Ht. II. 713.
— pileata Oliv. II. 695.
— — linearis Rehd. II. 695.
— — yunnanensis Rehd. II. 695.
— pilosa Ht. II. 737.
— — Kellog. II. 737.
— — Maxim. II. 703.
— — Willd. II. 736.
— plantierensis Andr. II. 734.
— — fuchsioides Zab. II. 734.
— — punicea Zab. II. 734.
— — Youngii Zab. II. 734.
— praecox Ht. II. 693.
— — Rebd. II. 704.
— praeflorens Bat. II. 704
— prolifera Rehd. [et Bootb] II. 739.
— propinqua Zab. II. 706.
— prostrata Rehd. II. 724.
Lonicera proterantha Rehd. II. 700.
— pseudochrysantha A. Braun II. 722.
— pseudoproterantba Pamp. II. 698.
— pubescens Stok. II. 722
— — Sweet II. 737.
— punicea Ht. II. 734.
— — Sims II. 716.
— purpurascens Walp. II. 686.
— pyrenaica Kit. II. 721.
— — L. II. 704.
— — Willd. II. 717.
— quinquelocularis Hardw. II. 724
— — translucens Zab. II. 725.
— — × Xylosteum II. 722.
— ramosissima Franch. et Sav. II. 686
— Regeliana Dipp. II. 722.
— — Kircbn. II. 722.
— Rehderi Merill II. 729.
— repens Ht. II. 733.
— reticulata Champ. II. 730
— — Maxim. II. 694.
— — Standisb II. 733.
— retusa Franch. II. 714.
— rhododendroides Graebn. II. 727.
— rotundifolia Med. II. 742.
— Royleana Ht. II. 722.
— — Wall. II. 725.
— rubra Gilib. II. 721.
— rupicola Hook. et Thoms. II. 685.
— — syringantba Zab. II. 685.
— — thibetica Ht. II. 684.
— Ruprechtiana Dipp. II. 717.
— — Reg. II. 719.
— — carnea Dipp. II. 717.
— — rosea Dipp. II. 717.
— — salicifolia Dieck II. 716.
— — striata Dipp. II. 717.
— — × tatarica II. 717.
— — xanthocarpa Zab. II. 719.
— saccata Rehd. II. 690.
— — Wilsoni Rehd. II. 691.
— salicifolia Zab. II. 716.
— saxatilis Mazz. II. 744.
— savranica Ht. II. 713.
— scabrida Franch. II. 702.
— Schmitziana Dipp. II. 713.
— — Rözl II. 736.
— Schneideriana Rehd. II. 690.
— segreziensis Lav. II. 722.
— Semenovii Rgl. II. 701.
— semperflorens Goldr. II. 745.
— sempervirens L. II. 734.
— — Sarg. II. 734.
— — Brownii Andr. II. 734.
— — coccinea superba Dipp. II. 734.
— — flava Reg. II. 734.
— — fuchsioides Lav. II. 734.
— — major Ait. II. 734.
— — minor Ait. II. 734.
— — oblonga Lois.-Desl. II. 734.
— — ovata Lois.-Desl. II. 734.
— — punicea Dipp. II. 734.
— — speciosa Carr. II. 734.
— — Sullivantii Mouill. II. 739.
— — sulphurea Jacqu. II. 734
— — superba Reg. II. 734.

Lonicera sempervirens typica Rehd. II. 734.
— — virginiana Cast. II. 734.
— — xanthina Zab. II. 734.
— sericea Royl. II. 687.
— serotina Gand. II. 745.
— serpyllifolia Rehd. II. 690.
— setchuenensis Rehd. II. 707.
— setilera Franch. II. 702.
— shensiensis Rehd. II. 688.
— Sieversiana Bunge II. 692.
— similis Hemsl. II. 729.
— — Delavayi Rehd. II. 729.
— sinensis Dipp. II. 698.
— Smithiana Jak. Mak. II. 736.
— Solonis Spreng. II. 694, 707.
— sororia Pip. II. 711.
— speciosa Wend. II. 734.
— spinosa Jacqu. II. 686.
— — Alberti Rehd. II. 686.
— splendida Boiss. II. 742.
— Stahiana Gussone II. 742.
— Standishii Carr. II. 698.
— — lancifolia Rehd. II. 698.
— stenosiphon Franch. II. 690.
— stephanocarpa Franch. II. 702.
— strophiophora Franch. II. 703.
— suavis Salisb. II. 741.
— subaequalis Rehd. II. 736.
— subdentata Rehd. II. 702.
— subspicata Hook. et Arn. II. 737.
— Sullivantii A. Gray II. 739.
— sumatrana Miqu. II. 728.
— Symphoricarpos L. II. 669.
— syringantha Maxim. II. 685.
— — Wolfii Rehd. II. 685.
— szechuanica Bat. II. 690.
— tangutica Maxim. II. 690.
— — glabra Bat. II. 690.
— tatarica L. II. 716.
— — alba Lois.-Desl. II. 716.
— — — grandiflora Ht. II. 716.
— — alhiflora De Cand. II. 716.
— — alho-rosea Späth II. 716.
— — angustifolia Rehd. II. 716.
— — angustata Rehd. II. 716.
— — bicolor Carr. II. 716.
— — brevipedunculata Rgl. II. 716.
— — elegans Carr. II. 716.
— — Fenzlii Dipp. II. 716.
— — gracilis Carr. II. 717.
— — grandibracteata Woll II. 716.
— — grandiflora Jacqu. et Her. II. 716.
— — — rubra Pep. II. 716.
— — latifolia Loud. II. 716.
— — „Louis Leroy" Ht. II. 716.
— — major Jäg. II. 716.
— — micrantha Reg. II. 717.
— — — Trautv. II. 717.
— — nana Alph. II. 717.
— — odorata Dipp. II. 716.
— — parvifolia Jaeg. II. 717.
— — puberula Reg. et Winkl. II. 717.
— — pulcherrima Reg. II. 716.
— — punicea Ldl. II. 716.
— — purpurea Endl. II. 716.
Lonicera tatarica pyrenaica Reg. II. 717.
— — rosea Rgl. II. 716.
— — roseo-alba Rgl. II. 716.
— — rubra Sw. II. 716.
— — ruhriflora de Cand. II. 716.
— — ruhrissima Carr. II. 716.
— — sibirica Pers. II. 716.
— — speciosa Carr. II. 716.
— — splendens Reg. II. 716.
— — typica Rehd. II. 716.
— — — alba Rehd. II. 716.
— — — angustifolia Rehd II. 716.
— — — bicolor Rehd. II. 716.
— — — brevipedunculata Rehd. II. 716.
— — — elegans Rehd. II. 716.
— — — Fenzlii Rehd. II. 716.
— — — grandibracteata Rehd. II. 716.
— — — grandiflora Rehd. II. 716.
— — — latilolia Rehd. II. 716.
— — — Leroyana Rehd. II. 716.
— — — odorata Rehd. II. 716.
— — — punicea Rehd. II. 716.
— — — rosea Rehd. II. 716.
— — — roseo-alha Rehd. II. 716.
— — — sihirica Rehd. II. 716.
— — virginalis Jäg. II. 716.
— — × Xylosteum II. 717.
— Tatarinovii Maxim. II. 712.
— tatsienensis Franch. II. 710.
— Tellairii Hook. et Arn. II. 730.
— tenuiflora Reg. et Winkl. II. 700.
— thibetica Bur. et Franch. II. 684.
— tomentella Hook. et Thoms. II. 686.
— tragophylla Hemsl. II. 742.
— translucens Carr. II. 725.
— trichogyne Rehd. II. 690.
— tricbopoda Franch. II. 689.
— — shensiensis Rehd. II. 688.
— trichosantha Bur. et Franch. II. 724.
— Tschonoskii Maxim. II. 711.
— tubuliflora Rehd. II. 685.
— turcomanica Fisch. et Mey. II. 726.
— — subvillosa Reg. II. 726.
— turkestanica Franch. II. 726.
— uniflora Blume II. 693.
— utahensis Wats. II. 692.
— vaccinioides Rehd. II. 701.
— valentina Willk. II. 741.
— vegeta Rehd. II. 710.
— velutina de Cand. II. 694.
— venulosa Maxim. II. 694.
— vesicaria Kom. II. 697.
— Vidalii Franch. et Sav. II. 711.
— villosa de Cand. II. 707.
— — Ht. II. 722.
— — Mühlenb. II. 694.
— virginiana Marsh. II. 734.
— volgarensis Ht. II. 698.
— vulgaris Roehl. II. 722.
— Webbiana Dipp. II. 707.
— — Wall. II. 709.
— xylosteoides Tausch II. 717.
— Xylosteum L. II. 720.
— — Miqu. II. 719.
— — Sibth. II. 726.
— — brachypoda Schlech. II. 725.

Lonicera Xylosteum brevipedunculata Rgl. II. 720.
— — chrysantha Reg. II. 722.
— — compacta Zab. II. 721.
— — cotinifolia C. A. M. II. 721.
— — crococarpa Murr. II. 721.
— — elliptica Beck II. 720.
— — glaberrima Kir. II. 721.
— — glabrescens Zab. II. 720.
— — leiophylla Rehd. II. 721.
— — longipedunculata Zab. II. 720.
— — lutea Lois.-Desl. II. 721.
— — macrocalyx Reg. II. 726.
— — mollis Rgl. II. 720.
— — rubra Lois.-Desl. II. 720.
— — stenophylla Zab. II. 720.
— — subcordata Zab. II. 720.
— — syringifolia Beck II. 720.
— — thuringiaca Zab. II. 720.
— — typica Reg. II. 720.
— — — brevipedunculata Rehd. II. 720.
— — — compacta Rehd. II. 721.
— — — cotinifolia Rehd. II. 721.
— — — elliptica Rehd. II. 720.
— — — glabrescens Rehd. II. 720.
— — — longipedunculata Rehd. II. 720.
— — — lutea Rehd. II. 721.
— — — mollis Rehd. II. 720.
— — — thuringiaca Zab. II. 720.
— — villosa Zab. II. 720.
— — vulgaris Reg. II. 720.
— — xanthocarpa de Cand. II. 721.
— yunnanensis Franch. II. 739.
— Zabelii Rehd. II. 718.
Loranthus L. 248.
— europaeus Jacq. 248.
Loropetalum Oliv. 433, 807.
— chinense Oliv. 433.
— subcordatum Oliv. 433.
Luetkea Bong. 485.
— Hendersoni Greene 485.
— pectinata Kze. 485, II. 961.
— sibbaldioides Bong. 485.
— uniflora Ktze. II. 961.
Lupinus L. II. 23.
— arboreus Sims II. 23.
— rivularis Dougl. II. 23.
Luzuriaga R. et P. II. 867.
— radicans R. et P. II. 867.
Lycium L. II. 608.
— afrum L. II. 608.
— arabicum Schweinf. II. 608.
— barbarum Anct. II. 611.
— — L. II. 611.
— carolinianum Walt. II. 611.
— chilense Bert. II. 612.
— chinense Mill. II. 611.
— — ovatum C. Schn. II. 611.
— — typicum C. Schn. II. 611.
— europaeum L. II. 608.
— foetidum L. II. 631.
— Grevilleanum Gill. II. 612.
— halimifolium Mill. II. 611.
— — lanceolatum C. Schn. II. 611.
— — subglobosum C. Schn. II. 611.
— japonicum Thbg. II. 631.
Lycium lanceolatum Poir. II. 611.
— mediterraneum Dun. II. 608.
— megistocarpum lanceolatum Dun. II. 611.
— — ovatum Dun. II. 611.
— ovatum Poir. II. 611.
— pallidum Miers II. 608.
— rhombifolium Dipp. II. 611.
— rutbenicum Murr. II. 609.
— — minus Pall. II. 610.
— salicifolium Mill. II. 608.
— subglobosum Dunal II. 611.
— turbinatum Poir. II. 611.
— turcomanicum Fisch. et Mey. II. 610.
— — Turcz. II. 610.
— vulgare Dun. II. 611.
Lyonia arborea Don II. 535.
— calyculata Rehb. II. 534.
— ferruginea Nutt. II. 532.
— ligustrina DC. II. 534.
— — foliosiflora Fern. II. 533.
— lucida Koch II. 532.
— Mariana Don II. 1047.
— marginata Don II. 532.
— ovalifolia Drude II. 532.
— paniculata Nutt. II. 534.
— popnlifolia Koch II. 530.
— pulverulenta Koch II. 527.
— racemosa Don II. 528.
— rigida Nutt. II. 532.

Maackia Rupr. et Max. II. 15.
— amurensis R. et M. II. 15.
— — Buergeri C. S. II. 16.
— — typica C. S. II. 16.
Macludrania hybrida André II. 905.
Maclura Nutt. 239, 806.
— aurantiaca Nutt. 239.
— — inermis Andr. II. 905.
— pomifera C. S. 806.
— — inermis C. S. II. 905.
— tricuspidata Carr. 243.
Macrocarpium Nak. II. 451.
— mas Nak. II. 451.
— officinale Nak. II. 451.
— sessile Nak. II. 453.
Macrothyrsus Spach II. 253.
— discolor Spach II. 253.
Magnolia L. 328, II. 928.
— acuminata L. 338.
— — cordata Sarg. 339.
— alexandrina Ht. 331.
— auriculata Lam. 333.
— Campbelli Hook. 332.
— compressa Max. 328.
— conspicua Salisb. 331.
— — purpurascens Max. 330.
— cordata Mchx. 338.
— cyathiformis Ht. 331.
— Delavayi Franch. 333.
— denudata Lam. 330.
— — liliflora C. S. 330.
— — × precia 330.
— — purpurea C. S. 330.
— — typica C. S. 330.
— — — gracilis C. S. 330.

Magnolia discolor Vent. 330.
— foetida Sarg. 334.
— fragrans Salish. 336.
— Fraseri Walt. 333.
— glauca L. 335.
— — major Sims 334.
— — Thompsoniana Lond. II. 928.
— — × tripetala 334.
— — var. β Thbg. 330.
— gracilis Salish. 330.
— grandiflora L. 334, 806, II. 928.
— grandis Ht. 331.
— Halleana Pars. 331.
— hybrida Soulangiana Dipp. 330.
— hypoleuca S. et Z. 332.
— Kobus DC. 329.
— — borealis Sarg. II. 928.
— Kobushi Mayr II. 928.
— Leunei Topf 331.
— liliflora Lam. 330.
— macrophylla Mchx. 336.
— major C. S. 334, II. 928.
— Norbertiana Ht. 331.
— obovata Thbg. 330.
— — × Yulan 330.
— parviflora S. et Z. 331.
— precia Corr. 331.
— purpurea Curt. 330.
— pyramidata Pursh 333.
— reflorescens Ht. 331.
— salicifolia Max. 329, II. 928.
— Soulangiana Soul.-Bod. 330.
— — Niemetzi Schwer. II. 928.
— stellata Max. 331.
— Thompsoniana Sarg. 334, II. 928.
— tripetala L. 333.
— — × virginiana 806.
— umbellata Ht. 333.
— umbrella Lam. 333.
— Watsoni Hook. 332, II. 928.
— Yulan Desf. 331.
— — Soulangiana Ldl. 330.
— virginiana L. 335, 806.
— — acuminata L. 338.
— — foetida L. 334.
— — glauca L. 336.
— — tripetala L. 333.
Mahoberberis C. S. 806. II. **924.**
— Neuherti C. S. 806.
— — ilicifolia C. S. II. 924.
— — typica C. S. II. 924.
Mahonia Nutt. 316, II. **925.**
— Audrieuxii Fed. 321.
— angustifolia Fed. 320.
— Aquifolium Nutt. 318.
— — albovariegata Schwer. II. 925.
— — amabilis Schwer. II. 925.
— — aucubifolia Schwer. II. 925.
— — aureovariegata Schwer. II. 925.
— — × Berberis vulgaris 316, II. **924.**
— — erecta Zbl. 318.
— — × Fortunei 318.
— — gracilis Ht. 318.
— — juglandifolia Jouin II. 925.
— — lutescens Schwer. II. 925.
— — Murrayana Zbl. 318.
Mahonia Aquifolium × nervosa 318.
— — × pinnata 318.
— — × repens 317.
— Bealei Carr. 323.
— chochoco Fed. 321.
— dictyota Fed. 320.
— Ehrenbergii Fed. 322.
— euryhracteata Fed. 322.
— eutriphylla Fed. 320.
— lascicularis DC. 320.
— — Ht. 318.
— Fortunei Fed. 323.
— Fremontii Fed. 321.
— glumacea DC. 322.
— gracilis Fed. 320.
— haematocarpa Fed. 321.
— Hartwegii Fed. 322.
— heterophylla C. S. 318.
— ilicina Schldl. 322.
— incerta Fed. 320.
— japonica DC. 323, II. 925.
— — Bealei Fed. 323.
— — gracillima Fed. 323.
— — trifurca Fed. 323.
— — typica Fed. 323.
— lanceolata Fed. 320.
— latifolia Ht. 317.
— — inermis Ht. 317.
— Murrayana Ht. 318.
— nana Fed. 317.
— nepalensis DC. 323, II. 925.
— — integerrima Fed. 323.
— — Leschenaultiana Hook. 323.
— — macrophylla Fed. 323.
— — pycnophylla Fed. 323.
— nervosa Nutt. 322.
— Nevinii Fed. 321.
— pallida Fed. 322.
— paniculata Oerst. 322.
— Paxii Fed. 322.
— pinnata Ht. 318.
— — Fedde 320.
— — horteusis Fed. 320.
— — Wagneri Jouin II. 925.
— polyodonta Fed. 322.
— pumila Fed. 318.
— repens Ht. 318.
— — Dou 317.
— — macrocarpa Jouin II. 925.
— — rotundifolia Dipp. 317.
— — — Hervevi Ht. 317.
— Schiedeana Fed. 320.
— subintegrifolia Fed. 320.
— subtriplinervis Fed. 322.
— Swaseyi Fed. 321.
— tenuifolia Loud. 322.
— trifolia Ch. et Schl. 320.
— trifoliolata Fed. 320.
— trifurca Loud. 323.
— Zimapana Fed. 322.
Malranla Neck. II. 545.
— alpina Desv. II. 545.
Malachodendron pentagynum Small II. 330.
Malapoenna Adans. 350, 807.
— geniculata Coult. 351.

Malapoenna japonica Ktze. 350.
— Sieboldii Ktze. 351.
Mallotus Lour. II. 134.
— japonicus Müll. Arg. II. 134.
Malus Mill. 714, II. **999**.
— acerba Mér. 715.
— adstringens Zbl. 717.
— angustifolia Mchx. 725.
— — fl. pl. Ht. II. 1001.
— astracania Dum.-Cours. 717.
— atrosanguinea Ht. 720.
— baccata Borkh. 720.
— — Lois. 717.
— — cerasifera Tak. II. 1000.
— — × Halliana II. 1000.
— — himalaica C. S. 721.
— — mandschurica C. S. 721.
— — × prunifolia 717.
— — × pumila 717, 1000.
— — sibirica C. S. 720.
— — × spectabilis 719.
— — × Toringo 721.
— — Toringo Tak. II. 1000.
— (— × pumila) × spectabilis 717.
— — × Ringo 717.
— cerasifera Spach 717.
— communis Lam. 715.
— — sylvestris Beck 715.
— — typica Beck 716.
— coronaria Mill. 724.
— — fl. pl. Ht. II. 1001.
— — ioensis C. S. 724.
— — × pumila 719.
— — × spectabilis 719.
— — typica C. S. 724.
— crataegifolia Koeb. 724.
— dasyphylla Borkb. 715.
— — Ht. 715.
— — pendula Zbl. 716.
— — × Toringo 718.
— dioeca Lois. 716.
— domestica Borkh. 715.
— florentina C. S. 724.
— floribunda Sieb. 721.
— — Parkmanni Tak. II. 1001.
— — × prunifolia 721.
— Fontanesiana Spach 717.
— formosana Kaw. et Koidz. II. 999.
— fusca C. S. 723.
— — diversifolia C. S. 724.
— — × Halliana 720.
— — levipes C. S. 724.
— Halliana Koeh. 719.
— — × spectabilis 719.
— Hartwigii Koeh. II. 1000.
— heterophylla Spach 719.
— hybrida Desf. 717.
— — Lois. 717.
— ioensis Britt. 724.
— — × pumila domestica 718.
— japonica Andr. 730.
— Koido Wens. 717.
— kansuensis C. S. II, 1001.
— microcarpa Ht. 717.
— micromalus Mak. II. 1000.
— mitis × Ringo 717.
Malus Niedzwetzkyana Dieck 716.
— odorata Ht. 717.
— paradisica Med. 715.
— Pashia sikkimensis Wenz. 719.
— Pratti C. S. 719.
— praecox Borkb. 715.
— prunifolia Borkb. 717.
— — × Toringo 717.
— pumila Mill. 715.
— — domestica C. S. 715.
— — — apetala C. S. 716.
— — — aucubaelolia C. S. 716.
— — — pendula C. S. 716.
— — — translucens C. S. 716.
— — mitis C. S. II. 1000.
— — Niedzwetzkyana C. S. 715.
— — paradisiaca C. S. 715.
— — praecox C. S. 715.
— — × spectabilis 716.
— — × sylvestris 715.
— — × Toringo 718.
— Ringo Sieb. 716, II. 1000.
— — fastigiata bilera Dieck 717.
— Riversi Ht. 757.
— rivularis Roem. 723.
— — diversifolia Koeh. 724.
— — integrifolia Zbl. 724.
— — levipes Koeh. 724.
— Sargenti Rehd. 722.
— Scheideckeri Zbl. 721.
— sempervirens Desl. 725.
— sibirica Borkh. 717.
— sikkimensis Koeb. 719.
— sinensis Dum.-Cours. 719.
— — Ht. 721.
— Soulardi Britt. 718.
— spectabilis Borkh. 719.
— sylvestris Mill. 715.
— — bortulana C. S. 715.
— — × Sorbus torminalis 724.
— — typica C. S. 715.
— Toringo Sieb. 723.
— transitoria C. S. 726.
— trilobata C. S. II. 1001.
— — oxyloba C. S. II. 1001.
— Tschonoskyi C. S. II. 1001.
— Zumi Rehd. 721.
— yunnanensis C. S. II. 1001.
Margyricarpus R. et P. 535.
— alatus Gill. 535.
— Carazi Ball 535.
— cristatus Britt. 535.
— imberbis Presl 535.
— microphyllus Niedl. 535.
— setosus R. et P. 535.
Marlea platanilolia S. et Zucc. II. 433.
Marsdenia Br. II. 853.
— erecta Br. II. 853.
Mastacanthus sinensis Endl. II. 596.
Maytenus chilensis DC. II. 169.
Medicago L. II. 62, **1010.**
— arborea L. II. 62.
— cretacea M. B. II. 1010.
Meibomia Adans. II. 108.
— paniculata Ktze. II. 1017.
— — Chapmani Britt. II. 1017.

Meiemianthera Raf. II. 45.
Meisteria S. et Z. II. 523.
— cernua S. et Z. 523.
Melia L. II. 132.
— Azedarach L. II. 132.
— — umbraculiformis Bail. II. 132.
— azadirachta L. II. 133.
— floribunda Carr. II. 132.
— japonica Hassk. II. 133.
Mellosma cnneifolia Fr. II. 1029.
— myriantha S. et Z. II. 254.
— Veitchiorum Hemsl. II. 1030.
Menodora H. et B. II. 835.
— scabra Gr. II. 835.
— spinescens Gr. II. 835.
Menispermum L. 325.
— canadense L. 325.
— carolinum L. 327.
— dauricum DC. 326.
— diversifolium Prantl 326.
— Lyoni Pursh II. 926.
— orbiculatum Thbg. 327.
— trilobum Thbg. 327.
— virginicum L. 327.
Menziesia Smith II. 510.
— Bruckenthalii Banmg. II. 567.
— Bryantha Swtz. II. 517.
— ciliicalyx Maxim. II. 512.
— — multiflora Mak. II. 512.
— coerulea Swtz. II. 519.
— ferruginea Smith II. 511
— — globularis Sims II. 511.
— glabella Gray II. 511.
— glanduliflora Hook. II. 519.
— globularis Auct. et Ht. II. 511.
— — Salisb. II. 511.
— multiflora Maxim. II. 512.
— pentandra Maxim. II. 510.
— pilosa Juss. II. 511.
— polifolia Juss. II. 1046.
— pnrpurea Maxim. II. 512.
— Smithii Mich. II. 511.
— urceolaris Salisb. II. 511.
Mespilus L. [Med.] 764.
— abortiva DC. 764.
— acerifolia Burgsd. 790.
— acuminata Lodd. 747.
— aestivalis Walt. 794.
— Amelanchier L. 732.
— apiifolia Marsh. 790, II. 1007.
— apyrena Del. 764.
— arborescens Ell. 798.
— — Koch 798.
— arbntifolia L. 699.
— — erythrocarpa Mchx. II. 997.
— — melanocarpa Mchx. II. 997.
— Aronia W. 789.
— Azarolus W. 789.
— Calpodendron Ehrh. 776.
— chamaemespilus L. 698.
— canadensis L. 735.
— — cordata Mchx. 734.
— — oligocarpa Mchx. 737.
— — rotundifolia Mchx. 737.
— Celsiana Dum.-Cours. 778.
— coccinea W. et K. 749.
Mespilus corallina Desf. 790.
— cordata Mill. 790, II. 1007.
— Cotoneaster L. 748, 752.
— — depressa Fries 747.
— — nigra Ehrh. 752.
— — rubra Ehrh. 748.
— crenulata Don 761.
— crusgalli Marsh. 796.
— cuneata Koch 794.
— eriocarpa DC. 749.
— flabellata Bosc 800, II. 1008.
— flexispina Mnch. 793.
— Fontanesiana Spach 796.
— germanica L. 764.
— — abortiva Kirchn. 764.
— — apyrena Koch 765.
— — argenteo-variegata Zbl. 764.
— — aureo-variegata Zbl. 764.
— — gigantea Kirchn. 764.
— — macrocarpa Ht. 764.
— glabra Colla II. 997.
— glandnlosa Ehrh. 799.
— grandiflora Sm. 766.
— heterophylla Poir. 779.
— insegnae Tin. 783.
— laciniata Guss. 788.
— laevigata Lam. 780.
— Lalandi Ht. 762.
— latifolia Lam. 776.
— leucophloeos Koch 776.
— lobata Poir. 766.
— maroccana Poir. 788.
— Maura Poir. 788.
— melanocarpa Bess. 777.
— monogyna W. 782.
— nigra W. 778.
— Oliveriana Poir. 777.
— orientalis Mill. 749.
— — Poir. 788.
— oxyacantha All. 781.
— — intermixta Wenz. 781.
— parvifolia W. 793.
— panciflora Lam. 762.
— pectinata Dum.-Cours. 779.
— pentagyna Sprg. 777.
— Phaenopyrum L. 790.
— pinnatifida Koch 770.
— polyacantha Guss. 781.
— pruinosa Wendl. 799.
— prunifolia Lam. 796.
— — Marsh. 796.
— pubescens Kunth 794, II. 1007.
— — Presl 788.
— punctata Lois. 795.
— purpurea Poir. 771.
— pygmaea Baumg. 749.
— Pyracantha L. 762.
— pyrifolia W. 776.
— racemiflora Desf. 754.
— rivularis Wenz. 775.
— rotundifolia Dur. 799.
— sanguinea Spach 771.
— — chlorocarpa Koch 771.
— — Douglasi Wenz. 775.
— Smithii DC. 766.
— sorbifolia Poir. 677.

Mespilus spatbulata Poir. 791.
— stipulosa Kuntb 794, II. 1007.
— succulenta Sw. 776.
— tanacetifolia Lam. 787.
— tiliaefolia Kocb 798.
— tomentosa Ait. 749.
— triloba Poir. 781.
— viridis Sw. 798.
— vulgaris Rcbb. 765.
— xanthocarpa L. 793.
Metaplexis Br. II. 853.
— chinensis Decne. II. 854.
— Hemsleyana Oliv. II. 855.
— japonica Mak. II. 853.
— rostellata Turcz. II. 855.
— Stauntoni Ht. II. 854.
— — R. et Sch. II. 854.
Michelia compressa Sarg. 328.
Microglossa DC. II. 757.
— albescens Clarke II. 757.
Micromeles Dcne. 700, II. 997.
— alnifolia Koeh. 703.
— — tiliaefolia C. S. 703.
— — typica C. S. 703.
— caloneura Stapf II. 997.
— castaneifolia Decne. 700.
— cuspidata C. S. 700.
— Decaisneana C. S. 701, II. 997.
— — Keissleri C. S. II. 997.
— ferrnginea Koeh. 700.
— Folgneri C. S. 704.
— granulosa C. S. 700.
— Griffithi Decne. 701.
— Hemsleyi C. S. 704.
— japonica Koeb. 703.
— Keissleri C. S. 701, II. 997.
— kbasiana Decne. 700.
— Koehnei C. S. II. 997.
— rhamnoides Decne. 701.
— Schwerini C. S. 702.
— Thomsoni C. S. 701.
— tiliaefolia Koeh. 703.
— verrucosa Decne. 700.
Micromeria cristata Griseb. II. 604.
— graeca Benth. II. 604.
— montana Rcbb. II. 603.
— pygmaea Rchb. II. 604.
— rupestris Benth. II. 603.
— variegata Rchb. II. 604.
Microrhamnus Gray II. 263.
— franguloides Maxim. II. 263.
Mikania pubescens Muhl. II. 754.
— scandens Willd. If. 754.
— — pubescens Torr. et Gr. II. 754.
Milietia Wigbt et Arn. II. 75.
— japonica Gray II. 75.
Mimosa japonica Tbbg. II. 1008.
Mimulus L. II. 619.
— aurantiacus Curt. II. 620.
— glutinosus Wendl. II. 619.
— — puniceus Gray II. 620.
— puniceus Steud. II. 620.
Mitchella repens L. II. 629.
Moghania 114.
Mohrodendron Britt. II. 582.
Moltkia Lehm. II. 589.
Moltkia graminifolia Benth. et Hk. II. 590.
— petraea Rchb. II. 590.
— suffrnticosa Brand II. 589.
Molucella fruticosa L. II. 602.
Monardella odoratissima Benth. II. 597.
Morongia angustata Britt. II. 3.
Morus L. 235.
— alba L. 236.
— — colombassa Ser. 237.
— — constantinopolitana Loud. 238.
— — — Fegyvernekiana C. S. 238.
— — fastigiata Schd. 238.
— — fibrosa Ser. 238.
— — italica Loud. 238.
— — macrophylla Lodd. 238.
— — multicaulis Loud. 238.
— — nervosa Lodd. 238.
— — pendula C. S. 238.
— — pyramidalis Ser. 238.
— — rosea Ser. 237.
— — tatarica Loud. 238.
— — venosa Del. 238.
— — vulgaris Bur. 237.
— — — colombassa C. S. 238.
— — — macrophylla C. S. 238.
— — — pendula Dipp. 238.
— — — rosea C. S. 237.
— — — tatarica Dipp. 238.
— byzantina Sieb. 238.
— canadensis Lam. 236.
— chinensis Lodd. 238.
— constantinopolitana Lam. 238.
— cucullata Bonaf. 238.
— — Ht. 241.
— Fegyvernekiana Ht. 238.
— italica Lam. 238.
— Kaempferi Ser. 242.
— latifolia Lam. 238.
— macrophylla Moretti 238.
— Morettiana Jacq. 238.
— — Ht. 235.
— multicaulis Perr. 238.
— navicnlaris Lodd. 241.
— nervosa Ht. 238.
— nigra L. 235.
— papyrifera L. 241.
— rubra L. 236.
— — incisa Bur. 236.
— — japonica Mak. II. 905.
— — tomentosa Bur. 236.
— tiliaefolia Mak. II. 905.
— tomentosa Raf. 236.
— urticaefolia Ilt. 238.
Mühlenbeckia Meissn. 259.
— axillaris Meissn. II. 906.
— complexa Meissn. 259.
— sagittifolia Meissn. 259.
Muscadinia rotundifolia Small II. 301
Myginda myrtifolia Nutt. II. 185.
Myriandra prolifica Spach II. 1037.
Myrica L. 70.
— asplenifolia L. 74.
— californica Ch. et Scbl. 70.
— caroliniensis Mill. 71.
— cerifera L. 71.

Myrica Gale L. 72.
— — tomentosa DC. 172.
— Hartwegi Wats. 72.
— palustris Lam. 72.
— pensylvanica Lois. 71.
Myricaria Desv. II. 344.
— dahurica Ehrenb. II. 345.
— germanica Desv. II. 344.
— squamosa Desv. II. 345.
Myrsine africana L. II. 572.
Myrtillus niger Gilib. II. 557.
Myrtus Ugni Mol. II. 1040.
Myxopyrum smilacifolium Bl. II. 841.

Nagelia Ldl. 742, II. **1001**.
— denticulata Ldl. II. 1001.
— — nervosa C. S. II. 1001.
— — psilantha C. S. II. 1001
— Pringlei C. S. II. 1001.
Nandina Tbbg. 323.
— domestica Tbbg. 324.
Negundo Ludw. II. 220.
— aceroides Moench II. 221.
— — violaceum Kirchn. II. 221.
— californicum Torr. et Gr. II. 222.
— cissifolium S. et Z. II. 210.
— fraxinifolium Nutt. II. 221.
— griseum Pax II. 211.
— mexicanum DC. II. 222.
— nikoense Miq. II. 211.
— violaceum Hort. II. 221.
Neillia Don 446.
— affinis Hemsl 446.
— — capitata Greene 443.
— gracilis Franch. 446.
— longiracemosa Hemsl. 446.
— malvacea Greene 444.
— monogyna alternans Jones 446, 807.
— opulifolia Benth. et H. 442.
— rubiflora Don 446.
— sinensis Oliv. 446.
— Tanakae Fr. et S. 449.
— thibetica Bur. et Fr. 447.
— thyrsiflora Hook. 446.
— Torreyi Wats. 445.
— velutina B. et Fr. 447.
— virgata Wall. 446.
Nemopanthus Raf. II. 169.
— canadensis DC. II. 169.
— fascicularis Raf. II. 169.
— mucronata Trel. II. 169.
Neodeutzia mexicana Small II. 937.
— ovalis Small 807, II. 937.
Nepa Webb II. 57.
— Webbiana Webb II. 57.
Nepeta incana Thbg. II. 596.
Nephrolea Thunbergii Miers 328.
Nerium L. II. 851.
— divaricatum Tbbg. II. 851.
— lauriforme Lam. II. 851.
— Oleander L. II. 851.
Nevlusia A. Gr. 502.
— alabamensis A. Gr. 502.
Nintoa Sweet II. 726.
— canescens Webb II. 730.
— confusa Sw. II. 730.
Nintoa japonica Sw. II. 733.
— longiflora Sweet II. 733.
Nitraria Schoberi L. II. 116.
Nitrophila S. Wats. 260.
— occidentalis Wats. 260.
Nothofagus Bl. 151, II. **896**.
— antarctica Oerst. 151, II. 896.
— — uliginosa Reiche II. 896.
— Dombeyi Oerst. 151.
Notospartium Carmichaeliae Hook. II. 79.
Nuttallia T. et Gr. 650.
— cerasiformis T. et. Gr. 651.
Nyssa L. II. 456.
— angulisans Mchx. II. 458.
— angulosa Poir. II. 458.
— aquatica Auct. II. 457.
— — L. II. 457.
— biflora Walt. II. 457.
— canadensis Poir. II. 457.
— capitata Walt. II. 458.
— caroliniana Poir. II. 457.
— denticulata Ait. II. 458.
— grandidentata Mchx. II. 458.
— integrifolia Ait. II. 457.
— montana Gaertn. II. 458.
— multiflora Wangh. II. 457.
— Ogeche Marsh. II. 458.
— palustris Salisb. II. 458.
— sinensis Oliv. II. 456.
— sylvatica Marsb. II. 456.
— — biflora Sarg. II. 457
— tomentosa Mchx. II. 458.
— — Poir. II. 458.
— uniflora Wangh. II. 457.
— villosa Mchx. II. 457.

Oblone confertifolium Torr. 262.
— portulacoides Moq. 261.
Olea L. II. 793, 1065.
— americana L. II. 789.
— aquifolia S. et Z. II. 790.
— — ilicifolia Dipp. II. 789.
— — myrtifolia Dipp. II. 790.
— — rotundifolia Dipp. II. 790.
— europaea L. II. 793.
— — buxifolia Ait. II. 794.
— — communis Ait. II. 794.
— — latifolia Ait. II. 794.
— — longifolia Ait. II. 794.
— — obliqua Ait. II. 794.
— — Oleaster DC. II. 794.
— — sativa DC. II. 794.
— — silvestris Rouy II. 794.
— fragrans Thbg. II. 789.
— gallica Mill. II. 794.
— ilicifolia Hassk. II. 789.
— lancifolia Mnch. II. 794.
— myrtifolia Ht. II. 790.
— officinarum Crantz II. 794.
— Oleaster Hoffm. et L. II. 794.
— rotundifolia Ht. II. 790.
— sativa Hoffm. et Link II. 794.
— silvestris Mill. II. 794.
Olearia Moench II. 756.
— erubescens Dipp. II. 757.
— Haastii Hk. F. II. 757.

Olearia xanthophylla Col. II. 760.
Ononis L. II. 61.
— aragonensis Asso II. 61.
— arvensis L. II. 61.
— fruticosa L. II. 61.
— — microphylla DC. II. 61.
— Natrix L. II. 61.
— repens L. II. 61.
— rotundifolia L. II. 62.
— spinosa L. II. 61.
Onosmodium Mchx. 528.
Oplopanax horridum Miqu. II. 430.
Opulaster Med. 442.
— amurensis Ktze. 444.
— capitatus Ktze. 443.
— intermedius Rydb. 444, 807.
— malvaceus Ktze. 444.
— monogyna Ktze. 445.
— opulifolius Ktze. 442.
— — debricbyanus C. S. 442.
— — inebrians C. S. 442.
— — nanus C. S. 442.
— — tomentellus C. S. 442.
— — typicus C. S. 442.
— — — luteus C. S. 442.
— pauciflorus Hell. 444, 807.
— Ramaleyi Nels. 444.
Opulus Moench II. 640.
— glandulosus Moench II. 641.
Oreophila myrtifolia Nutt. II. 185.
Oreodaphne californica Nees 349.
Orias Dode II. 1040.
— excelsa Dode II. 1040.
Origanum vulgare L. II. 597.
Orixa Thb. II. 121.
— japonica Thbg. II. 121.
Ornus Pers. II. 811.
— europaea Pers. II. 814.
— — argentea Rouy II. 814.
— — canescens Rouy II. 814.
— — rotundifolia Rouy II. 814.
— floribunda Dietr. II. 817.
— rotundifolia Pers. II. 814.
Orphanidesia Boiss. II. 535.
— gaultherioides Boiss. et Bal. II. 535.
Osiris japonica Thbg. II. 434.
Osmanthus Lour. II. 788.
— americana Benth. et Hook. II. 788.
— Aquifolium Ht. II. 791.
— — Sieb. II. 789.
— — argenteus Bail. II. 790.
— — aureus Bail. II. 790.
— — ilicifolius Bail. II. 789.
— — myrtifolius Bail. II. 790.
— — atropurpureus C. S. II. 790.
— — japonicus Mak. II. 791.
— Delavayi Franch. II. 791.
— Fortunei Carr. II. 791.
— fragrans Lour. II. 789.
— — aurantiacus Mak. II. 789.
— — — latifolius Mak. II. 789.
— ilicifolius Ht. II. 791.
— japonicus Sieb. II. 791.
Osmaronia Greene 650, 808.
— cerasiformis Greene 650.
Osmothamnus fragrans DC. II. 481.
Osmothamnus pallidus DC. II 481.
Osteomeles Ldl. 762.
— anthyllidifolia Ldl. 762.
— glabrata Kunth 763.
— Pyracantha Decne. 763.
— Schwerinae C. S. 763, II. 1005.
Ostrya Scop. 142, 804.
— Baileyi Rose II. 895.
— carpinifolia Scop. 142.
— italica Scop. 143.
— japonica Sarg. 143.
— Knowltoni Cov. II. 895.
— mandschurica Bud. 143.
— Ostrya Karst. 142.
— — italica C. S. 143.
— — japonica C. S. 143.
— — virginiana C. S. 143.
— virginiana K. Koch 143.
— — carpinifolia C. S. 804.
— — typica C. S. 804.
— virginica W. 143, 804.
— vulgaris W. 143.
Ostryopsis Decne. 143.
— Davidiana Decne. 143.
Osyris L. 247.
— alba L. 247.
Othera japonica Lodin II. 1023.
— — Thbg. II. 1023.
— Orixa Poir. II. 122.
Oxyacantha vulgaris xanthocarpa Roem. 780.
Oxycoccus Adans. II. 560.
— erectus Pursh II. 561.
— erythrocarpus Pers. II. 561.
— macrocarpus Pursh II. 561.
— microcarpum Turcz. II. 561.
— palustris Pers. II. 561.
— — pusillus DC. II. 561.
— quadripetala Gilib. II. 561.
— vulgaris Pursh II. 561.
Oxydendrum DC. II. 534.
— arboreum DC. II. 534.
Oxylobus arbutifolius A. Gray II. 754.
Ozothamnus R. Br II. 761.
— diosmaefolius DC. II. 762.
— rosmarinifolius DC. II. 761.
— Vauvilliersi Homb. et Jacqu. II. 760.

Pachyrrhizus Thunbergianus S. et Z. II. 115.
Pachysandra Mchx. II. 137.
— coriacea Hk. II. 1020.
— procumbens Mchx. II. 137.
— terminalis S. et Z. II. 137.
— — variegata Mann. II. 137.
Pachystima (Pachystigma) Raf. II. 185.
— Canbyi A. Gr. II. 186.
— Myrsinites Raf. II. 185.
Padus Borkh. 637, II. 991.
— acrophylla C. S. 640, II. 994.
— alabamensis Small 643.
— australis Beadle 645.
— brachypoda C. S. 638.
— — pubigera C. S. 638, II. 994.
— Capollin C. S. 644.
— caroliniana Mill. 650.

Padus cornuta Carr. 638.
— — glabra Fritsch 639.
— — typica C. S. 639.
— Cuthberti Small 645.
— demissa Roem. 642.
— eglandulosa Mnch. 646.
— eximia Small 644.
— Grayana C. S. 640.
— Laucheana C. S. 640.
— Laurocerasus Mill. 647.
— lusitanica Mill. 646.
— Mahaleb Borkh. 617.
— napaulensis C. S. 639.
— — distincta C. S. 639.
— — sericea C. S. 639.
— — typica C. S. 639.
— oblonga Mnch. 643.
— racemosa C. S. 639.
— — borealis C. S. 640.
— — petraea C. S. 640.
— — pubescens C. S. 640.
— — typica C. S. 640.
— — — aucubaefolia C. S. 640.
— — — aurea C. S. 640.
— — — bracteosa C. S. 640.
— — — commutata C. S. 640.
— — — leucocarpa C. S. 640.
— — — pendula C. S. 640.
— — — plena C. S. 640.
— — × virginiana 640.
— rubra Mill. 643.
— salicifolia C. S. 645, II. 991.
— serotina Ag. 643.
— — asplenifolia C. S. 643.
— — cartilaginea C. S. 643.
— — neomontana Small 643.
— — pendula C. S. 643.
— — pyramidalis C. S. 643.
— Ssiori C. S. 641.
— velutina C. S. 638.
— virginiana Roem. 642.
— — demissa C. S. 642.
— — Duerincki C. S. 642.
— — lencocarpa C. S. 642.
— — monstrosifolia C. S. 643.
— — typica C. S. 642.
— vulgaris Borkh. 640.
— Wilsoni C. S. 637, II. 992.
Paeonia L. 271.
— arborea Donn 271.
— — papaveracea C. S. 271.
— Delavayi Franch. 272.
— Intea Delav. 273.
— Moutan Ait. 272.
— officinalis Thbg. 272.
— papaveracea Andrew 272.
Pallurus Mill. II. 260, **1030**.
— aculeatus Lam. II. 260.
— Aubletia Schultz II. 1030.
— australis Gaertn. II. 260.
— — orientalis Franch. II. 260.
— orientalis Hemsl. II. 260, 1030.
— ramosissimus Poir. II. 1030.
— Spina-Christi Mill. II. 260.
Panax aculeatus Ait. II. 427.
— divaricatus S. et Z. II. 428.
Panax horridus Sm. II. 430.
— ricinifolius S. et Z. II. 429.
— sessiliflorus Rupr. et Max. II. 429.
— spinosum L. F. II. 427.
Pancovia Franch. II. 254
— Delavayi Franch. II. 254.
Papyrius Lam. 240, 806.
— japonica Poir. 241.
Parapyrola trichocarpa Miqu. II. 535.
Parechites Thunbergii Gr. II. 851.
Parrotia C. A. M. 428.
— Jacquemontiana Dene. 429.
— persica C. A. M. 428.
— siderodendron C. A. M. 429.
Parrotiopsis C. S. 429.
— involucrata C. S. 429.
Partbenocissus Planch. II. 313, 1032, **1033**.
— dumetorum laciniata Rehd. II. 315.
— — macrophylla Rehd. II. 315.
— Engelmanni Graeb. II. 317.
— Graebneri Graeb. II. 317.
— Henryana Diels et G. II. 1033.
— — glaucescens D. et S. II. 1033.
— Henryi Graeb. II. 318.
— heptaphylla Small II. 316.
— himalayana Planch. II. 314.
— — rubrifolia Gagnep. II. 1033.
— hirsuta Graeb. II. 315.
— — Small II. 317.
— laciniata Small II. 316.
— quinquefolia Graeb. II. 316.
— — Planch. II. 317.
— — heptaphylla Graeb. II. 315.
— — — Planch. II. 316.
— — hirsuta Planch. II. 317.
— — laciniata Planch. II. 315.
— — latifolia Graeb. II. 315.
— — — Rehd. II. 317.
— — minor Rehd. II. 317.
— — murorum Rehd. II. 317.
— — Saint-Pauli Rehd. II. 317.
— — serrata Graeb. II. 315.
— radicantissima Graeb. II. 317.
— — minor Graeb. II. 317.
— Saint-Pauli Graeb. II. 317.
— sinensis Diels et Gilg II. 315, 1033
— Spaethii Graeb. II. 316.
— texana Rehd. II. 316.
— Thomsonii Pl. II. 1033.
— tricuspidata Planch. II. 315.
— — aurata Schwer. II. 1033.
— — robusta Ht. II. 315.
— Veitchi Graeb. II. 315.
— vitacea Hitchc. II. 316.
— — dubia Rehd. II. 315.
— — laciniata Rehd. II. 315.
— — macrophylla Rehd. II. 315.
Parvatia chinensis Fr. II. 912.
Pasania Oerst. 160.
— cuspidata Oerst. 160.
— densiflora Oerst. 161.
— glabra Oestr. 160.
Paulinia japonica Thbg. II. 320.
Paulownia Sieb. et Zucc. II. 618, **1049**.
— Duclouxii Dode II. 1049.
— Fargesi Franch. II. 618, 1049.

Digitized by Google

Paulownia imperialis S. et Z. II. 618.
— — lanata Dode II. 618.
— — pallida Dode II. 618.
— tomentosa K. Koch II. 618.
— — lanata C. Schn. II. 618.
— — pallida C. Schn. II. 618.
Pavia Mill. II. 250, 1029.
— alba Poir. II. 253.
— carnea Spach II. 247.
— flava Moench II. 252.
— glabra Spach II. 251.
— humilis G. Don II. 252.
— hybrida DC. II. 252.
— indica Wall. [et Colebr.] II. 249.
— lutea Poir. II. 252.
— macrostachys Loisel. II. 253.
— ohioensis Mchx. II. 251.
— pallida Spach II. 251.
— rubra Poir. II. 252.
— — humilis Loud. II. 252.
— versicolor Spach II. 252.
— Watsoniana Spach II. 247.
Pentstemon Soland. II. 614.
— breviflorus Ldl. II. 615.
— Bridgesi Gray II. 617.
— corymbosus Bth. II. 616.
— crassifolius Ldl. II. 615.
— Davidsoni Greene II. 616.
— deustus Dougl. II. 615.
— Douglasii Hook. II. 615.
— fruticosus Greene II. 615.
— — crassifolius Krautt. II. 615.
— — Douglasii C. Schn. II. 615.
— heterophyllus Ldl. II. 617.
— Lemmoni Gray II. 615.
— Lewisii Benth. II. 615.
— linarioides Gray II. 616.
— Menziesii Hook. II. 616.
— — Davidsoni Pip. II. 616.
— — Douglasii Gray II. 615.
— — Newberryi A. Gr. II. 616.
— — Robinsoni Mast. II. 616.
— — Scouleri A. Gray II. 615.
— Newberryi A. Gray II. 616
— — rupicola Pip. II. 616.
— rostriflorus Kell. II. 617.
— rupicola Howell II. 616.
— Scouleri Dougl. II. 615.
Peraphyllum Nutt. 713.
— ramosissimum Nutt. 713.
Pergularia japonica Thbg. II. 854.
Periclyma Raf. II. 734.
Periclymenum Med. II. 734.
— — Mill. II. 733.
— americanum Mill. II. 742.
— germanicum Mill. II. 745.
— italicum Mill. II. 741.
— perfoliatum S. J. Gr. II. 741.
— sempervirens Mill. II. 734.
— — angustifolium Spach II. 734.
— — latifolium Spach II. 734.
— vulgare Mill. II. 745.
— — quercifolium S. J. Gr. 745.
Periploca L. II. 853.
— angustifolia Ht. II. 853.
Periploca angustifolia Lab. II. 853.
— graeca L. II. 853.
— — angustifolia Jaeg. II. 853.
— laevigata Ait. II. 853.
— sepium Bge. II. 853.
Pernettya Gaudich. II. 539.
— angustifolia Ldl. II. 540.
— — × mucronata II. 540.
— hybrida Zab. II. 540.
— mucronata Gaud. II. 540.
— phillyreaefolia DC. II. 540, 1047
— rupicola Phil. II. 540.
— — × mucronata II. 540.
— rupicoloides C. Schn. II. 540.
Perowskia Karel. II. 603.
— atriplicifolia Benth. II. 603.
Persea Gaertn. 349.
— borbonia Sprgl. 349.
— carolinensis Nees 349.
Persica Davidiana Carr. 595.
— — alba Carr. II. 973.
— laevis DC. 594.
— nucipersica Borkh. 594.
— vulgaris Mill. 595.
— — camelliaeflora Fort. 594.
— — dianthiflora Fort. 594.
— — versicolor Sieb. 594.
Pertya Schultz Bip. II. 767.
— sinensis Oliv. II. 767.
Petalolepis Cass. II. 761.
— rosmarinifolius Cass. II. 761.
Petrophytum Rydb. 484, II. 961.
— caespitosum Rydb. 484, II. 961.
Petteria Presl II. 36.
— ramentacea Presl II. 36.
Phalacros cordata Wenz. 790.
Phalerocarpus serpyllifolius Don II. 539.
Phellodendron Rupr. II. 124, 1018.
— amurense Rupr. II. 125.
— — × japonicum II. 1018.
— — sachalinense Schm. II. 125.
— chinense C. S. II. 126, II. 1018.
— Fargesii Dode II. 1018.
— japonicum Maxim. II. 125.
— Lavallei Dode II. 1018
— macrophyllum Dode II. 1018.
— sachalinense Kom. II. 125.
— — Sarg. II. 125.
— sinense Dode II. 1018.
Phenianthus sempervirens Raf. II. 734.
Philadelphus L. 362, II. 929.
— acuminatus Lge. 371.
— affinis Schlecht. 362.
— argyrocalyx Woot. 365.
— asperifolius Koern. 364.
— Billiardi Koch. 367.
— brachybotrys Koch. II. 930.
— — purpurascens Koch. II, 930.
— californicus Benth. 362.
— caucasicus Koch. 374.
— columbianus Koch. 368, II. 929
— confusus Pip. 368.
— cordifolius Lge. 366.
— — × latifolius II. 929.
— coronarius L. 373.
— — × grandiflorus II. 930.

Philadelphus coronarius × inodorus II, 930.
— — × latifolius II, 930.
— — × microphyllus 365.
— — nanus Dipp. 374.
— — salicifolius Dipp. 374.
— — Satsumi Max. If, 930.
— Coulteri Wats. 363, II. 929.
— Defavayi Henry 370, II. 930.
— Falconeri Sarg. 371.
— florihundus Schrd. 374, II. 930.
— — Usteri II. 930.
— floridus Bead. 366, II. 929.
— gloriosus Bead. 366.
— Godohokeri Kirchn. 364.
— Gordonianus Ldl. 368, II. 929.
— grandiflorus W. 366.
— Henryi Koch. II. 930.
— hirsutus Nutt. 364.
— incanus Koch. 370.
— — hupehensis Koeh. II. 930.
— — kulingensis Koeh. II. 930.
— — Sargentianus Koeh. II. 930.
— inodorus L. 366.
— — strigosus Beadle 366.
— insignis Carr. 367, II. 929.
— intectus Bead. 368.
— Karwinskyanus Koeh. 362.
— fancifolius Koeh. 369.
— latifolius Schrad. 369.
— — × laxus 369.
— laxus Schrad. 365.
— — × pubescens 369, II. **929.**
— Lemoinei Lem. 365.
— Lewisii Anct. 362, 368.
— — Pursh 368.
— Loddigesianus Koeh. 371.
— maculiflorus Koeh. 363, II. 929.
— Magdalenae Koeh. 369.
— magnificus Koeh. II. 929.
— Matsumuranus Koeh. 374.
— mexicanus Schlt. 362.
— — Coulteri Ift. 363.
— microphyllus Gr. 365.
— — Sargenti Koeh. 365.
— — typicus Koeh. 365.
— nanus Mill. 374.
— nepalensis Koeh. 373.
— occidentalis Nels. 365.
— pallidus Hay. 373, 807.
— parvifolius Carr. 374.
— pekinensis Rupr. 373.
— — hrachybotrys Koeh. 373, II. 930.
— pendufifolius Carr. 369.
— pubescens Koch [et Koeh.] II. 929.
— — Lois. 369, II. **929.**
— purpureo-maculatus Lem. II, 929.
— rnhricaulis Carr. 374.
— Satsumanus Sieh. II. 930.
— — nikoensis Rehd. II. 930.
— Satsumi Paxt. 371.
— — Sieh. II. 930.
— Schrenkii Rupr. 372.
— — Jackii Koeh. II. 930.
— sericanthus Koeh. 370.
— — Rehderianus Koeh. II. 930.
Philadelphus serpyllifolius Gr. 364.
— speciosus Schr. II. 929.
— stenopetalus Carr. 374
— suhcanus Koeh. 369, II. 930.
— — dubius Koeh. II. 930.
— tenuifolius Rupr. 372.
— tomentosus Wall. 371.
— trichopetalus Koern. 364.
— triflorus Wall. 373.
— umbellulatus Koeh. 367.
— venustus Koeh. II. 930.
— verrucosus Schrd. 369, II. **929.**
— Wilsonii Koeh. II. 930.
— Zeyheri Schr. II. 929.
Philageria Veitchii Mast. II. 867.
Philesia Com. II. 867.
— huxifolia Lam. II. 867.
Phillyrea L. II. 785.
— alaternoides Spach II. 788.
— angustifolia L. II. 786.
— — hrachiata Ait. II. 787.
— — lanceolata Ait. II. 787.
— — ligustrifofia C. S. II. 787.
— — rosmarinifolia Ait. II. 787.
— decora Boiss et Bal. II. 788.
— ilicifofia Willd. II. 788.
— latifolia L. II. 787.
— — media C. Schn. II. 788.
— — typica C. Schn. II. 788.
— laurifolia Ht. II. 788.
— ligustrifolia Mill. II. 787.
— media L. II. 788.
— — ligustrifolia Ait. II. 787.
— Medwediewi Sred. II. 788.
— ohliqua Willd. II. 788.
— oleaefolia Mill. II. 788.
— pendula Willd. II. 788.
— rosmarinifolia Mill. II. 787.
— spinosa Mill. II. 788.
— strieta Auct. 787.
— — Bertol. II. 788.
— variabilis Timb. et Lor. II. 787.
— — angustifolia Car. II. 787.
— — latifolia Car. II. 788.
— — media Car. II. 788.
— Vilmoriniana Boiss. et Bal. II. 788.
— virgata Willd. II. 788.
— vulgaris Car. II. 787.
— — angustifolia Car. II. 787.
— — latifolia Car. II. 788.
— — media Car. II. 788.
Phlomis L. II. 602.
— Iruticosa L. II. 602.
— umhrosa Turcz. II. 602.
Phlox L. II. 586.
— Stellaria A. Gray II. 586.
Photinia Ldl. 706, II. **997.**
— amphidoxa R. et W. II. 998.
— arhutifofia Ldl. 708.
— arguta Ldl. 708.
— Beauverdiana C. S. 710, II. 998.
— — notabilis R. et W. II. 999.
— Becki C. S. 707.
— Benthamiana Hance 710.
— herheridifolia R. et W. II. 998.
— Bergerae C S. 709.

Photinia birmanensis C. S. 709.
— Davidsoniae R. et W. II. 997.
— duhia Ldl. 711.
— foliolosa Koeh. 680.
— Fortuneana Max. 763.
— glahra Max. 707.
— — chinensis Max. 707.
— glomerata R. et W. II. 998.
— Griffithi Decne. 707.
— integrifolia Ldl. 707.
— japonica Fr. et Sav. II. 999.
— laevis DC. 710.
— lancifolia R. et W. II. 999.
— lasiogyna C. S. 707.
— Lindleyana W. et A. 707.
— lucida C. S. 710.
— melanostigma Hance 707.
— mexicana Ldl. 708.
— mollis Hk. 707.
— notahilis S. C. 711, II. 999.
— Notoniana W. et A. 707.
— parvifolia C. S. 711.
— prionophylla C. S. II. 998.
— prunifolia Ldl. 707.
— pustulata Ldl. 710.
— — S. Moore II. 997.
— salicifolia C. S. 709.
— Schneideriana R. et W. II. 999.
— serrulata Ldl 707, II. 997.
— subumbellata R. et W. II. 999.
— variahilis Ifemsl. 710.
— villosa DC. 710, II. 999.
— — laevis Dipp. 710.
— — formosana Hance 710.
— — sinica Rehd. et Wils. II. 999.
— — typica C. S. 710.
— — Zollingeri C.S. 710.
Phygellus E. Mey. II. 1049.
— capensis E. Mey. II. 1049.
Phyllanthus flueggeoides Müll.-Arg. II. 135.
— obovatus Müll.-Arg. II. 1020.
— ramiflora Pers. II. 135.
Phyllocytisus sessilifolius Fourr. II. 46.
Phyllodoce Salisb. II. 517.
— aleutica Mak. II. 518.
— Breweri A. A. Hell. II. 517, 1046.
— coerulea Bah. II. 518.
— empetriformis Don II. 518.
— erecta Drude II. 515.
— glanduliflora How. II. 519.
— nipponica Mak. II. 518.
— Pallasiana Don II. 518.
— taxifolia Salish. II. 519.
Phyllothamnus erectus C. Schn. II. 515.
Physocarpa Raf. 442.
— tomentosa Raf. 443.
Physocarpus Max. 442. 807.
— amurensis Max. 444, 807.
— capitatus Ktze. 443, 807.
— intermedius C. S. 807.
— monogynus Ktze. 807.
— — alternans C. S. 807.
— opulifolius Raf. 442, 807.
— — inebrians Zhl. 442, 807.
— — luteus Kirchn. 442.
Physocarpus opulifolius nanus Kirchn. 442, 807.
— pauciflorus C. S. 807.
— Torreyi Max. 445.
Phytolacca voluhilis Heimerl 267.
Pierasma Bl. II. 129.
— ailanthoides Planch. II. 129.
— japonica Gray II. 129.
Pieris florihunda Benth. If. 528.
— formosa Don II. 528.
— japonica Don II. 528.
— — albo-marginata Rehd. II. 528.
— — pygmaea Rehd. II. 528.
— Mariana Bth. et Hook. II. 532.
— nitida Buth. et Hk. II. 532.
— ovalifolia Don II. 532.
Pimpinella spinosa Gaertn. 536.
Pincknaya pubens Rich. II. 629.
Piptanthus Don II. 21.
— nepalensis Don II. 21.
— tomentosus Franch. II. 21.
Pirola L. II. 466.
— maculata L. II. 466.
— Menziesii R. Br. II. 466.
— umbellata L. II. 465.
Pirus = Pyrus 655.
Pistacia L. II. 144.
— chinensis Bge. II. 146, 1021.
— lentisco-terehinthus Sap. et Mar. II 146.
— Lentiscus L. II. 145.
— — angustifolia DC. II. 145.
— — genuina Rouy II. 145.
— — latifolia Coss. II. 145.
— — × Terehinthus II. 146.
— Saportae Burn. II. 146.
— Terebinthus L. II. 146.
Plagianthus Forst. II. 390.
— hetulinus A. Cunn. II. 390.
— divaricatus Forst. II. 390.
Plagiospermum Oliv. 651, 808.
— sinense Oliv. 651, II. 994
Planera Gmel. 222.
— Ahelicea Roem. et Sch. 226.
— acuminata Ldl. 226.
— aquatica Gmel. 222.
— carpinifolia K. Koch 225.
— chinensis Sweet 222.
— crenata Desl. 225.
— Davidii Hance 224.
— japonica Miq. 226.
— keaki K. Koch 226.
— Richardi Mchx. 225.
— — Torr. et Gr. 223.
— ulmifolia Mchx. 223.
Plantago L. II. 629.
— Cynops L. II. 629.
Platanus L. 435, II. 957.
— acerifolia W. 437, II. 957
— — Kelseyana C. S. 438.
— — pyramidalis C. S. 437.
— — Suttneri C. S. 437.
— californica Benth. 440.
— cretica Dode II. 958.
— cuneata Loud. 437.
— — W. 437. II. 957.

Platanus densicoma Dode II. 959.
— digitata Jankó 437.
— — Gord. II. 957.
— elongata Ait. 430.
— glabrata Fern. 439, II. 959.
— hispanica Ten. 437.
— hybrida Brot. 438.
— insularis DC. 436.
— Lindeniana M. et G. 439.
— lobata Moench 438.
— mexicana Moric. 439, II. 959.
— occidentalis L. 438, II. 959.
— — hispanica Wesm. 439.
— — Kelseyana Jaen. 438.
— — Lindeniana Jaen. 439.
— — mexicana Jankó 439.
— — × orientalis 437.
— — peltata Jaen. 439.
— — pyramidalis Jaen. 437.
— — Suttneri Jaen. 437.
— — tubifera Jaen. 439.
— orientalior Dode II. 957.
— orientalis L. 436, II. 957.
— — acerifolia Ait. 438.
— — pyramidalis Bolle 437.
— — liquidambarifolia C. S. 436.
— palmata Moench 437.
— racemosa Nutt. 440, II. 959.
— Reuteri Koch 437.
— undulata Ait. 436.
— vulgaris angulosa Spach 438.
— — liquidambarifolia Spach 436.
— — vitifolia Spach 438.
— Wrightii Wats. 440, II. 959.
Platycarya S. et Z. 75.
— strobilacea S. et Z. 75.
Platycrater S. et Z. 383.
— arguta S. et Z. 383.
— — hortensis Max. 383.
— — typica Max. 383.
Platyosprion platycarpum Mak. II. 17.
Pleurolobus St. Hil. II. 108.
Plumbago Larpentae Ldl. II. 572.
Podocytisus Boiss. II. 39.
— caramanicus Boiss. et H. II. 40.
Poeppigia cyanocarpa Bert. II. 1047.
Pollothyrsis Oliv. II. 361, 1038.
— sinensis Oliv. II. 361.
Polycodium Greene II. 550.
— candicans Small II. 550.
— melanocarpum Mohr II. 550.
— staminenm Greene II. 550
Polygala L. II. 133.
— chamaebnxus L. II. 133.
— — grandiflora Gaud. II. 133.
— — — heterochroa Beck II. 134.
— — lutea Neilr. II. 133.
— — purpnrea Neilr. II. 133.
— — rhodoptera Ball. II. 133.
— — typica Beck II. 133.
Polygonella buxifolia Meissn. II. 906.
Polygonum L. 258, II. 906.
— Auberti Henry II. 907.
— axillare Hk. II. 907.
— baldschuanicum Rgl. 258.
— buxifolium M. B. 256.
Polygonum cilinode Ht. II. 906.
— — Mchx. II. 906.
— complexum A. Cunn. 259.
— cordatum Ht. 258.
— crispulum Sims 256.
— equisetiforme S. et Sm. II. 906.
— flagellare Bert. 258.
— frutescens L. 257.
— multiflorum Thbg. 259.
— romanum Jacq. 258.
— scandens L. II. 906.
— scoparium Req. II. 906.
— setosum Jacq. II. 906.
— vaccinifolium Wall. 258.
Pongelium v. Tiegh. II. 130.
— Vilmorinianum v. Tiegh. II. 131.
Populus L. 2, II. 869.
— acerifolia Ht. 22.
— acuminata Rydhg. 14, II. 869.
— adenopoda Max. 20.
alba L. 21. II. 869, 870.
— — Bolleana Wesm. 22, 802.
— — croatica Wesm. 22.
— — denudata Max. 21.
— — genuina Wesm. 22.
— — — globosa C. S. 22.
— — — nivea C. S. 22.
— — globosa Dipp. II. 22.
— — × nigra 23.
— — pendula Loud. 33, II. 870.
— — pyramidalis Bge. [et Dipp.] 22, II. 870.
— — subintegerrima Willk. et Lge. 22.
— — × tremula 23.
— angulata Ait. 9.
— — × canadensis 11.
— — × Eugenei 11.
— — × laurifolia 11.
— — × monilifera 11.
— — × nigra italica 10.
— — serotina Koeh. 11.
— angustifolia James 14.
— — parvifolia C. S. 14
— Aremhergiana Ht. 22.
— argentea Ht. 22.
— — vera Ht. 22.
— atheniensis Ludw. 19.
— australis Ten. 19.
— Bachofenii Wierzb. 23, II. 870.
— balsamifera L. 14.
— — Pall. 16.
— — angustata C.S. 14
— — angustifolia Wats. 15.
— — candicans Gr. 13.
— — laurifolia Wesm. 16.
— — × nigra italica 11.
— — oblongata Dipp. 14.
— — suaveolens Loud. 14.
— — typica C. S. 14.
— — Wobstii Rgl. 16.
— — × vetla 11.
— berolinensis Dipp. 11.
— betulifolia Pursh 5.
— Bolleana Lauche 22, II. 869.
— Brandegeei C. S. 23, 803.
— Braunii C. S. 11.

Populus brevifolia Carr. 16.
— canadensis Mnch. 7, II. 869
— — angustifolia Wesm. 15.
— — × candicans 11.
— — erecta Dipp. 7.
— — Petrowskyana Dipp. 11.
— — × suaveolens 11.
— candicans Ait. 13, II. 869.
— — elongata Dipp. 13, II. 869.
— — × laurifolia 13.
— — × nigra 6, 11.
— — × suaveolens 11.
— canescens Sm. 23, II. 870.
— — pendula Schwer. II. 870.
— certinensis Ht. 11.
— charkowiensis Schroed. 10.
— ciliata Wall. 13.
— coloradensis Dode II. 869.
— cordifolia Burgsd. 21.
— croatica W. et K. 22, 803.
— deltoides Marsh. 7, II. 869.
— — × laurifolia 11.
— — × monilifera 8.
— — × nigra italica 9.
— — occidentalis Britt. II. 869.
— denudata A. Br. 23.
— dilatata Ait. 5.
— diversifolia Schrk. 5.
— elongata Dode 13, II. 869.
— Eugenei S.-L. 9, II. 869.
— euphratica Oliv. 5.
— fastigiata Desf. 5.
— Fremontii Wats. 9.
— — Wislizenii Wats. 9.
— glohosa Dode II. 869.
— graeca Ait. 19.
— — Lauche 19.
— grandidentata Mchx. 17.
— grandifolia Ht. 7.
— grandis Ht. 7.
— heterophylla L. 21, II. 869.
— hispida Hsskn. et Sint. 5.
— hudsonica Mchx. 5.
— hyhrida M. B. 23.
— — herolinensis Koch 11.
— italica Mnch. 5.
— lasiocarpa Oliv. 17, II. 869.
— lanrifolia Ledeb. 15.
— — × monilifera 11.
— — × nigra italica 11.
— — × suaveolens 11.
— — viminalis Dipp. II. 869.
— Lindleyana Carr. II. 869.
— longifolia Fisch. 803.
— macrophylla Ht. 22.
— — Lodd. 9.
— marilandica Poir. 7.
— mexicana Wesm. 9.
— microcarpa Hk. et Th. 20.
— monilifera Ait. 7, II. 869.
— — Nouv. Duh. II. 869.
— — erecta Selys 7.
— monticola Brand. 23, 803, II. 870.
— moscaviensis Schroed. 11.
— nigra L. 5.
— — betulifolia Torr. II. 870.

Populus nigra croatica C. S. 803.
— — hudsonica C. S. 5.
— — — × nigra italica 7.
— — italica Dur. 5.
— — — × suaveolens 11.
— — pannonica Dipp. 6.
— — plantièrensis C. S. 803.
— — pubescens Parl. 5.
— — pyramidalis Spach 5.
— — × suaveolens 11.
— — typica C. S. 5.
— nivea W. 22, II. 869.
— Nolestii Ht. 6.
— odorata Schroed. 11.
— ontariensis Desf. 13.
— ovata Ht. 6.
— pannonica Kit. 6.
— pekinensis Henry 21.
— Petrowskyana Schr. et Rgl. 11.
— — Sim.-L. 803.
— pruinosa Schrk. 5.
— Przewalskii Maxim. 14, II. 869.
— pseudocanadensis C. S. 8.
— pyramidalis Roz. 5.
— pyramidata Mnch. 5.
— Rasumowskyana Schroed. 11, II. 869.
— regenerata Ht. 7.
— robusta C. S. 11, II. 869.
— rotundifolia Griff. 13.
— Salomonii Ht. 22.
— Sargentii Dode II. 869.
— serotina Hart. 11.
— Sieholdii Miq. 17.
— — suhsericea S. C. 17.
— — typica C. S. 17.
— Simoni Carr. 16.
— Steiniana Bornm. 23.
— suaveolens Fisch. 14.
— — ohlongata Koeh. 14.
— — pyramidalis Rgl. II. 870.
— — typica C. S. 14.
— suhintegerrima Lge. II. 870.
— tacamahaca Mill. 14.
— thevestina Dode 6.
— tomentosa Carr. 21, II. 870.
— tremula L. 19, II. 870.
— — Freynii Herv. 19.
— — microphylla A. Br. 19.
— — pendula Kirch. 19.
— — puhescens A. Br. 19.
— — typica Koeh. 19.
— — — Freynii C. S. 19.
— — — microphylla C. S. 19.
— — — pubescens C. S. 19.
— — — sericea Koeh. 19.
— — — viridifolia C. S. 19.
— — villosa Koeh. 19.
— — — Lang 19.
— — — Max. 19.
— — viridifolia Dipp. 19.
— tremuloides Mchx. 19, II. 870.
— — pendula C. S. 19.
— trepida W. 19.
— trichocarpa Hook. 16.
— tristis Fisch. 13.
— — elongata Koch. 13, II. 869, 1008.

Populus tristis elongata × laurifolia 16.
— — longifolia C. S. 803.
— — typica C. S. 13.
— Viadri Rüd. 6, II. 869.
— virginiana Fong. II. 869.
— vistulensis Dode 7.
— Wislizenii Sarg. 9.
— Wohstii Schroed. 16.
Portuna floribunda Nutt. II. 528.
Potaninia Max. 525.
— mongolica Max. 525.
Potentilla L. 522.
— arbuscula Don 525.
— biflora W. 522.
— davurica Nestl. 522.
— — × fruticosa 523.
— discolor Jacq. 525.
— eriocarpa W. 522.
— florihunda Pursh 524.
— Friedrichseni Späth 523.
— — leucantha Späth II. 968.
— — ochroleuca Späth II. 968.
— fruticosa L. 523.
— — alpina Ht. 524.
— — — W. et R. 524.
— — armerioides Hk. 522.
— — grandiflora W. 524.
— — humilis Rgl. 524.
— — Inglesi Hk. 522.
— — manshurica Max. II. 968.
— — monticola Rydbg. 524.
— — ochreata Lehm. 524.
— — parvilolia Wats. 524.
— — pumila Hk. 522.
— — pyrenaica W. 524.
— — tenuifolia Lehm. 524.
— — tenuiloba Ser. 524.
— — Vilmoriniana Kom. II. 968.
— — vulgaris W. 524.
— — — micrandra C. S. 524.
— glabra Lodd. 523.
— Inglesi Royle 522.
— lignosa W. 522.
— Lindenhergia Lehm. 522.
— micrandra Koeh. 524.
— micrantha Ram. 522.
— ochreata Ldl. 524.
— parvilolia Fisch. 524.
— prostrata Lap. 524.
— rigida Wall. 525.
— Salessowi Steph. 525.
— santalinoides Greene 522.
— tenuilolia W. 524.
— tridentata Sol. 522.
— xylorrhiza B. et H. 522.
Poterium L. 536.
— spinosum L. 536.
Pourthiaea arguta Decne. 708.
— — Hookeri Hk. 709.
— — latilolia Hk. 709.
— — salicifolia Hk. 709.
— — Wallichi Hk. 708.
— Calleryana Decne. 710.
— coreana Decne. 710.
— Cotoneaster Decne. 710, II. 999.
— Hookeri Decne. 709.
Pourthiaea lucida Decne. 710.
— Oldhami Decne. 710.
— parvilolia Pritz. 711.
— salicilolia Decne. 709.
— Thunbergi Decne. 710.
— villosa Decne. 710.
— Zollingeri Decne. 710.
Prinos L. II. 166.
— ambigua Mchx. II. 168.
— coriacea Pursh II. 160.
— duhia Don II. 169.
— glaber L. II. 161.
— laevigata Dum. II. 166.
— lucida Ait. II. 160.
— verticillata L. II. 167.
Prinsepia Royle 651.
— sinensis Oliv. II. 994.
— utilis Royle 651.
Prunopsis Lindleyi André 595.
Prunus L. 589, II. 978.
— acida Ehrh. 615.
— — Koch 615.
— — Koeh. II. 989.
— — semperflorens Koeh. II. 989.
— acuminata Hk. 649.
— — W. 622.
— affinis Mak. II. 979.
— alabamensis Mohr 643, II. 991.
— alleghaniensis Port. 625, II. 990
— americana Marsh. 622, II. 989.
— — × angustilolia 622.
— — × hortulana II. 990.
— — lanata Sudw. 622, II. 989.
— — mollis T. et Gr. 622, II. 989
— — nigra Waugh II. 989.
— — × nigra 622.
— ampla Koeh. II. 986.
— Amygdalus Stokes 593.
— — ovalifolia Franch. 593.
— — tangutica Batal. 593.
— anadenia Koeh. II. 993.
— Andersoni Gray 598.
— angustilolia Ht. II. 990.
— — Marsh. 624, II. 990.
— — × triflora Bail. 625.
— — varians Wight et Hedr. II. 990.
— — Watsoni Waugh 625, II. 990.
— — — × pumila Besseyi 613.
— anomala Koeh. II. 991.
— Ansu Kom. II. 991.
— apetala Ht. 620.
— — Fr. et Sav. 608, II. 978.
— — iwozana C. S. 608, II. 978.
— — typica C. S. 608, II. 979.
— aproniana Beck 616.
— Armeniaca L. 637.
— — Ansu Max. II. 991.
— — Anzu Mats. II. 991.
— — brigantiaca Dipp. 634.
— — × cerasilera myrohalana 633.
— — dasycarpa Koch 633.
— — holosericea Bat. II. 991.
— — mandschurica Max. 635.
— — pendula Dipp. 637.
— — sibirica Koch 636.
— — variegata C. S. 637.

Prunus austera Ehrh. 615.
— australis Beadle 645, II. 991.
— autumnalis Koeh. II. 978.
— avium L. 616, II. 989.
— — actiana L. 616.
— — asplenilolia C. S. 616.
— — × Cerasus 616.
— — decumana Koeb 616.
— — duracina L. 616.
— — Juliana L. 616.
— — × Mahaleb 617.
— — pendula Rebd. 616.
— — plena C. S. 616.
— — salicifolia C. S. 616.
— baldschuanica Rgl. 595, II. 974.
— Batalinii Koeh. II. 976.
— Besseyi Bail. 613, II. 977.
— bicolor Koeh. II. 994.
— bifrons Fritsch 604.
— blireiana André 632.
— bokhariensis Royle 627.
— borealis Poir. 619.
— — Schneb. 640.
— brachypetala Walp. 604, II. 976.
— — Bornmülleri C. S. 604.
— brachypoda Bat. 638, II. 993.
— — microdonta Koeh. II. 994.
— — pseudossiori Koeh. II. 993.
— bracteata Fr. et Sav. 620, II. 988.
— bracteopadus Koeh. II. 992.
— brigantiaca Vill. 634.
— Brittoniana Rusby 648.
— Buergeriana Miq. 646, II. 992.
— — nudiuscula Koeh. II. 992.
— Bungei Walp. 612.
— calycosus Aitch. et Hemsl. 604.
— campanulata Max. 607, II. 982.
— canescens Bois 620, II. 981.
— Capollin DC. 644, II. 991.
— caproniana Zbl. 616.
— Capuli Cav. II. 991.
— caroliniana Ait. 650.
— carcharias Koeh. II. 977.
— cartilaginea Lehm. II. 991.
— caudata Fr. 608, II. 978.
— ceraseidos Max. II. 978, 979.
— — kurilensis Miyabe II. 979.
— cerasifera Ehrh. 632.
— — angustifolia Ht. 632.
— — — pendula Ht. 632.
— — atropurpurea Dipp. 632.
— — divaricata C. S. 632.
— — elegans Ht. 632.
— — gigantea Ht. 632.
— — myrobalana C. S. 632.
— — Pissardi Koeh. 632, II. 991.
— — — Hessei C. S. II. 991.
— — — Purpusi C. S. II. 991.
— cerasoides Don 606, II. 982.
— — tibetica C. S. II. 982.
— Cerasus L. 614, II. 989.
— — austera L. 615.
— — avium L. 616.
— — caproniana L. 615.
— — × Chamaecerasus 614.
— — fl. simplici Thbg. II. 984.
Prunus Cerasus frutescens C. S. 615.
— — — Neilr. 614.
— — × fruticosa 614.
— — globosa Späth 616.
— — pendula fl. roseo Ht. II. 982.
— — pumila L. 614.
— — typica C. S. 615.
— — — aureo-variegata C. S. 616.
— — — cucullata C. S. 616.
— — — globosa C. S. 616.
— — — marasca C. S. 615.
— — — Rhexi C. S. 616.
— — — semiplena C. S. 616.
— — — semperflorens C. S. 616.
— Chamaecerasus Jacq. 614.
— — salicilolia Zbl. 614.
— chicasa Mchx. 624, II. 990.
— — normalis T. et Gr. 624.
— cinerascens Fr. II. 976
— clarofolia C. S. 617, II. 988.
— claudiana Poir. 630.
— cocomilia Ten. 633.
— — brutia Fiori 633.
— — typica Fiori 633.
— communis Huds. 631.
— — Fritsch 593.
— — fragilis C. S. 593.
— — insititia Hook. 627.
— — × elaeagrilolia 591.
— — × orientalis 591.
— — × persica 593.
— — typica C. S. 593.
— — — albo-plena C. S. 593..
— — — amara C. S. 593.
— — — compacta C. S. 593.
— — — macrocarpa C. S. 593.
— — — marginata C. S. 593.
— — — pendula C. S. 593.
— — — purpurea C. S. 593.
— — — roseoplena C. S. 593.
— — — variegata C. S. 593.
— conadenia Koeh. II. 988.
— concinna Koeb. II. 985.
— Conradinae Koeh. II. 983.
— consociiflora C. S. 612, II. 990.
— cornuta Steud. 639, II. 993.
— corymbulosa Rydb. II. 989.
— cuneata Ral. 612.
— Cupaniana Guss. 617.
— curdica Fenzl et Fritsch 628.
— Cuthberti Small 645, II. 991.
— Cyclamina Koeh. II. 986.
— — biflora Koeb. II. 986.
— dasycarpa Ehrh. 633.
— Davidiana Franch. 595.
— — alba Bean II. 973.
— — albillora C. S. 595.
— dehiscens Koeh. II. 975.
— demissa A. Dietr. II. 993.
— — melanocarpa Nels. II. 993.
— — Nuttallii Koeh. II. 993.
— depressa Pursh 613.
— diamantinus Lév. II. 993.
— dictyoneura Diels II. 976.
— Dielsiana C. S. II. 986.
— — conlerta Koeh. II. 986.

Prunus Dielsiana laxa Koeh. II. 986.
— diffusa C. S. 606, II. 976.
— discadenia Koeh. II. 988.
— discolor C. S. 591.
— divaricata Ledeb. 632.
— diversifolia Koeh. II. 993.
— domestica L. 630, II. **991.**
— — insititia C. S. 630.
— — — pomariorum Bout. 630.
— — — × spinosa 630.
— — — subsylvestris Bout. 630.
— — italica C. S. 630.
— — myrobalana L. 632.
— — oeconomica C. S. 631.
— — — sylvestris C. S. 631.
— — syriaca Koeh. 630.
— droseracea Koeh. II. 980.
— Duclouxii Koeh. II. 986.
— ebnrnea C. S. 599.
— — furcata C. S. 600.
— effusa C. S. 616.
— emarginata Walp. 618, II. 989.
— — mollis Brew. et W. 618.
— — eminens Beck 614.
— exigua Bechst. 631.
— eximia Small II. 991.
— fasciculata Gray 598.
— Fauriei Lév. II. 993.
— Fenzliana Fritsch 593.
— Fontanesiana C. S. 617.
— formosana Mats. 612, II. 977.
— Fremonti Wats. 597.
— Irnticans Weihe 630.
— fruticosa Pall. 614, II. 989.
— — dispar Beck 614.
— — pendula Dipp. 614.
— — typica C. S. 614.
— — — umbelliflora Beck 614.
— Giraldiana C. S. 609, 980.
— glabra Koeh. II. 986.
— glandulifolia Rupr. et Max. 607, II 985.
— glandulosa C. S. 597, II. **976.**
— — Thbg. 612, II. 976.
— — glabra Koeh. II. 976.
— — — albiplena Koeb. II. 976.
— — — Sieboldiana Koeb. II. 976.
— — — — alba Koeb. II. 976.
— — — — rosea Koeb. II. 976.
— — Purdomii Koeh. II. 976.
— — salicifolia Koeb. II. 976.
— — trichostyla Koeb. II. 976.
— — — Faberi Koeb. II. 976.
— — — paokangensis Koeb. II. 976.
— — — sinensis Koeb. II. 976.
— glaucifolia Koeh. II. 993.
— glyptocarya Koeb. II. 980.
— gracilifolia Koeb. II. 978.
— gracilis Engelm. et Gr. 624.
— graeca Desf. 617.
— Gravesi Small 624.
— Grayana Max. 640, II. 994.
— Griffithi C. S. 603, II. 976.
— guanaiensis Rusby 650.
— gymnodonta Koeb. II. 990.
— Haussknechti C. S. 592, II. 973.
Prunus Heleuae Koeh. II. 983.
— Henryi Koeb. II. 987.
— Hernicquiana Lav. 608, II. **981.**
— — ascendens C. S. II. 981.
— — × subhirtella II. 981.
— hiemalis Mchx. 622.
— hirtifolia Koeh. II. 987.
— hirtipes Hemsl. 609, II. 986
— — glabra Pamp. II. 986.
— Hookeri C. S. 597, II. 975.
— hortulana Bail. 622, II. **989.**
— — Ht. II. 990.
— — Mineri Bail. 622, II. 990.
— — robusta Waugb II. 990.
— — × trillora 623.
— — Waylandi Bail. 622.
— Hosseusi Diels 606, II. 982.
— humilis Bge. 612, II. 976.
— ichangana C. S. 627, II. **990.**
— ilicifolia Walp. 648.
— — integrifolia Ludw. 648.
— — occidentalis Brand. 648.
— incana Stev. 603, II. 976.
— — angustifolia C. S. 603.
— — × pumila 603.
— — Sintenisi C. S. 603.
— — viridis C. S. 603.
— — vulgaris C. S. 603.
— — — viridis C. S. 603.
— incisa Thbg. 607, II. **979.**
— — kurilensis Koidz. II. 979.
— — × Sargentii II. 979.
— injucunda Small 624.
— insititia L. 630, II. **991.**
— — glaberrima Wirtg. 631.
— integrifolia Sarg. 648.
— intermedia Poir. 614
— involucrata Koeh. II. 986.
— italica Borkh. 630.
— Itosakra ascendens Koidz. II. 981.
— — — amabilis Koidz. II. 981.
— — pendula Koidz. II. 982.
— — subhirtella Koidz. II. 981.
— Itosakura Sieb. II. 982.
— — ascendens Mak. II. 981.
— iwagiensis Koeh. II. 978.
— Jacquemonti Hk. 601, II. 975.
— Jamasakura borealis Koidz. II. 984.
— — elegans parvifolia Koidz. II. 985.
— japonica Ker.-Gawl. II. 977.
— — Oudem. II. 976.
— — Thbg. 612, II. **977.**
— — Engleri Koeh. II. 977.
— — eujaponica Koeb. II. 977.
— — — Fauriei Koeh. II. 977.
— — — Oldhamii Koeb. II. 977.
— — fl. albo-pleno Lem. II. 976.
— — glandulosa Max. 612.
— — gracillima Koeb. II. 977.
— — — Engleri Koeb. II. 977.
— — — minor Koeb. II. 977.
— — — sphaerica Koeh II. 977.
— — — Thunbergii Koeh. II. 977.
— — Kerii Koeh. II. 977.

Prunus japonica packangensis C. S. 612, II. 976.
— — salicifolia Kom. II. 976.
— — sphaerica Carr. II. 977.
— — Thunbergi Koeh. II. 977.
— — typica Max. 612.
— javanica Miq. 647.
— Jenkinsi Hk. 650.
— Kerii Steud. II. 977.
— kermanensis Bornm. II. 973.
— Kotschyi C. S. 592.
— kurilensis Miyab. II. 979.
— lanata M. et B. 622, II. **989**.
— lanceolata W. 619.
— latidentata Koeh. II. 979.
— Laucheana Bolle 640.
— laurifolia Schlecht. 650.
— Laurocerasus L. 646.
— — brachystachius C. S. 647.
— — caucasica Ht. 647.
— — colchica Ht. 647.
— — laurifolius C. S. 647.
— — schipkaensis Späth 646.
— — — Mischeana Späth 646.
— — — Zabeliana Späth 646.
— laxiflora Koeh. II. 994.
— leiocarpa C. S. 590.
— Leveilléana Koeh. II. 985.
— litigiosa C. S. 609, II. **988**.
— — abbreviata Koeh. II 988.
— littoralis Bigel. 624.
— lobulata Koeh. II. 980.
— lusitanica L. 646.
— — marginata Zbl. 646.
— — variegata Zbl. 646.
— lutea Bechst. 631.
— lycioides C. S. 600.
— Maacki Rupr. 646, II. 994.
— Macgregoriana Koeh. II. 987.
— macradenia Koch. II. 988
— macrophylla Poir. 616.
— — S. et Z. 647.
— Mahaleb L. 617, II. 989.
— — albomarginata Dipp. 617.
— — chrysocarpa Zbl. 617.
— — cerasifolia Ht. 617.
— — compacta Späth 617.
— — Cupaniana Fior. et Paol. 617.
— — globosa Dieck 617.
— — Hartmanni Koeh II. 989.
— — monstrosa Kirchn. 617
— — pendula Dipp. 617.
— — transsilvanica Schur 617.
— — variegata Zbl. 617.
— majestica Koeh. II. 982.
— malifolia Koch. II. 986.
— mandschurica Koeh. 635.
— marasca Rchb. 615.
— maritima Wangh 624, II. 990.
— — × triflora II. 990.
— martabanica Kurz 648
— Maureri Zbl. 603.
— Maximowiczii Rupr. 620, II **988**.
— — adenophora Fr. II. 987.
— — aperta Kom. II. 988.
— melanocarpa Rydb. II. 993.
Prunus mesadenia Koeh. II. 985
— microbotrys Koeh. II. 992.
— microcarpa C. A. M. 604, II. 976.
— — pubescens Bornm. 606.
— — tortuosa C. S. 605.
— — typica C. S. 605.
— microlepis Koeh. II. 982.
— — ternata Koeh. II. 982.
— micromeloides Koeh. II. 979.
— microphylla Hemsl. 599.
— minutiflora Engelm. 599.
— Mineri C. S. II. 990.
— Miqueliana C. S. II. **982**.
— — Koidz. II. 979.
— — Max. 609, II. **978**.
— mira Koeh. II. 973.
— mitis Beadle 626, II. **990**.
— mollis Torr. II. 989
— — Walp. 618, II. 989.
— — angustior Koeh. 618.
— mongolica Max. II. 974
— monticola Koch 623.
— Mume S. et Z. 637, II. 991.
— — Goethartiana Koeh. II. 991.
— — pleiocarpa Max. 637.
— Munsoniana W. et H. II. 990.
— myrobalana × spinosa 631.
— myrtifolia Ht. 614.
— Nakaii Lévl. II. 976.
— nana du Roi 643.
— — Stokes [et Focke] 599.
— — campestris Dipp. 599.
— — — albiflora C. S. 599.
— — georgica Dipp. 599.
— — — alba C. S. 599.
— — — angustifolia C. S. 599.
— — Gessleriana C. S. 599.
— napaulensis Steud. 639, II. 992.
— neglecta Koeh. II. 987.
— — sericea Bat. 639, II. 993.
— nigra Ait. 621, II. 989.
— nikkoensis Koeh. II. 978.
— nipponica Mats. 608, II. 979.
— normalis Small 624.
— oblongifolia Max. 608.
— obtusata Koehne II. 994.
— occidentalis Swartz 648.
— oeconomica Borkh. 631.
— — sylvestris Borkh. 631.
— oregona Greene 620, II. 989.
— orientalis Koeh. 591.
— orthosepala Koeh. 621, II. **989**.
— oxycarpa Bechst. 631.
— — Max. 647.
— oxyodonta Koeh. II. 979.
— pachyclada Zbl. 639.
— Padus L. 639, II. 993.
— — aurea Zbl. 640.
— — commutata Dipp. 640.
— — cornuta Ht. 639.
— — japonica Miq. 641.
— — leucocarpa Koch 640.
— — pendula Dipp. 640.
— — pubescens Rgl. 640.
— — rotundifolia Ht. 640, 642.
— — transsilvanica Schur 640.

Prunus paniculata Edw. 611, II. 983.
— — Thbg. II. 576.
— paracerasus Koeh. II. 984.
— parvifolia Koeh. II. 985.
— pauciflora Bge. 609, II. 983.
— pearcei Rusby 648.
— pectinata Koeh. II. 976.
— pedunculata Max. 597.
— pendula Ht. 608.
— — Koeh. 609, II. **982**.
— — Max. 608, II. **982**.
— — ascendens Mak. II. 981.
— pennsylvanica L. 618, II. 989.
— — saximontana Rehd. II. 989.
— persica Stokes 593, II. 973.
— — densa Mak. 594.
— — necturina Max. 594.
— — nucipersica C. S. 594.
— — Potanini Bat. 595.
— — vulgaris Max. 594.
— — — alba C. S. 594.
— — — alba-plena C. S. 594.
— — — atropurpurea C. S. 594.
— — — camelliflora C. S. 594.
— — — coccineo-plena C. S. 594.
— — — dianthiflora C. S. 594.
— — — magnifica C. S. 594.
— — — pendula C. S. 594.
— — — pyramidalis C. S. 594.
— — — rubro-plena C. S. 594.
— — — versicolor C. S. 594.
— persicifolia Desl. 619.
— persico-amygdala C. S. 593.
— perulata Koeh. II. 992.
— petraea Tausch 640.
— Petzoldi Ht. II. 974.
— — Koch 595, II. 974.
— phaeosticta Max. 649.
— phyllopoda Koeh. II. 980.
— pilosa Max. II. 974.
— pilosiuscula Koeh. II. 987.
— — harbata Koeh. II. 988.
— — media Koeh. II. 988.
— — subvestita Koeh. 988.
— Pissardi Carr. 632.
— — Hessei Pnrp. II. 991.
— — Purpusii Hesse II. 991.
— platysepala Koeh. II. 990.
— pleiocerasus Koeh. II. 988.
— pleuradenia Grish. 650.
— pleuroptera Koeh. II. 980.
— plurinervis Koeh. II. 986.
— podadenia Koeh. II. 980.
— polytricha Koeh. II. 988.
— pogonostyla Max. 612, II. 977.
— — globosa Koeh. II. 977.
— — obovata Koeh. II. 977.
— praecox André 620.
— prostrata Lah. 604, II. 976.
— — hilrons Koeh. 604, II. **976**.
— — concolor Boiss. 604.
— — discolor Raulin 604.
— — subdiscolor Koeh. II. 976.
— pseudoarmeniaca Heldr. et Sart. 634.
— — puberula C. S. 634.
Prunus Pseudocerasus Ldl. 610, II. **983**.
— — Max. 611.
— — Sarg. II. 984.
— — borealis Mak. II. 984.
— — hortensis fl. simpl. alb. Max. II. 984.
— — Jamasakura Mak. II. 979.
— — — glabra Mak. II. 984.
— — — — praecox Mak. II. 984.
— — parvifolia Mats. 116, II. **985**.
— — serrulata glabra Mak. II. 984.
— — — — Fugenzo Mak. II. 984.
— — — — viridiflora Mak. II. 984.
— — Sieboldii Max. II. 983.
— — spontanea Max. [et Koidz.] II. 984.
— — — hortensis Koidz. II. 984.
— — typica parvifolia Koidz. II. 985.
— — — Sieboldii Koidz. II. 983.
— — virescens Koeh. II. 983.
— — Watereri Koeh. 610, II. 984.
— pubescens Poir. 624.
— puhigera Koeh. II. 994.
— — obovata Koeh. II. 994.
— — Potaninii Koeh. II. 994.
— — Prattii Koeh. II. 994.
— puddum Roxb. 606.
— — tihetica Bat. 606, II. 983.
— pulchella Koeh. II. 989.
— pumila Fritsch 614.
— — L. 612, II. 977.
— — Besseyi Waugh 612.
— — cuneata Bail. 612.
— — pendula Ht. 614.
— punctata Hk. 649.
— pygmaea W. 624.
— racemosa Lam. 640.
— Ramhourei Boiss. 628.
— reflexa Gard. 650.
— Regeliana Zhl. 640.
— Rehderiana Koeh. II. 988.
— rivularis Scheele 625.
— Rossiana Koeh. II. 978.
— rubella Bechst. 631.
— rula Steud. [et Hk.] 609, II. 982.
— ruloides C. S. 609, II. **986**.
— — glahrilolia C. S. 609, II. 983.
— rufomicans Koeh. II. 993.
— salicilolia Kuntb 645, II. 991.
— saltuum Koeh. II. 983.
— Salzeri Zdarek 640.
— samydoides Schlecht. 650.
— Sargentii Rehd. II. 984.
— sativa R. et F. II. 991.
— Schneideriana Koeh. II. 986.
— scoparia C. S. 590.
— scopulorum Koeh. II. 985.
— sempervirens W. 650.
— seoulensis Lév. II. 993.
— sericea Koeh. II. 993.
— — Batalinii Koeh. II. 993.
— — brevilolia Koeh. II. 993.
— — septentrionalis Koeh. II. 993.
— serotina Ehrh. 643, II. 991.

Prunus serotina alabamensis Schwer. II. 991.
— — albovariegata Schwer. II. 991.
— — asplenifolia Ilt. 643.
— — cartilaginea Dipp. 643, II. 991.
— — neomontana Sudw. 643.
— — pendula Dipp. 643.
— — phelloides Schwer. II. 991.
— — pyramidalis Zbl. 643, II. 991.
— — Smalli Britt. 643.
— serrula Fr. 606, II. 983.
— — tibetica Koeh. II. 983.
— serrulata Ldl. 611, II. **984**.
— — albida Koeh. II. 984.
— — albo-plena C. S. 611.
— — borealis Mak. II. 984.
— — fl. pl. Ht. 611.
— — grandiflora Wagn. II. 984.
— — hisakura Koeh. 611, II. 984.
— — Kriegeri Koeh. II. 984.
— — Lannesiana Koeh. II. 984.
— — mucronata Koeh. II. 984.
— — ochichima Koeh. II. 984.
— — shidare-sakura Koeh. II. 984.
— — shirolugen Ht. II. 984.
— — serrulata albida Mak. II. 984.
— — — Sieboldii Mak. II. 983.
— — Veitchiana Koeh. 984.
— — yoshino Koeh. II. 984.
— setulosa Bat. 609, II. 980.
— sibirica Ht. 614, 633.
— — L. 636.
— Sieboldii Koidz. II. 983.
— Simoni Carr. 634, II. 990.
— — × triflora 627.
— sinensis Pers. 612, II 976.
— Sontagii Koeh. II. 985.
— spartioides C. S. 590.
— spec. Texas Dipp. 621.
— sphaerocarpa Auct. 648.
— — Mchx. 624.
— — Swartz 650.
— spinosa L. 628, II. 991.
— — coetanea W. et Gr. 628.
— — dasyphylla Schur 628.
— — fl. pl. Kirchn. 628.
— — macrocarpa Wallr. 630.
— — praecox Wim. et Grab. 628.
— — purpurea André 628.
— — sessiliflora Beck 628.
— — typica C. S. 628.
— — — coaetanea C. S. 628.
— — — plena C. S. 628.
— — typica praecox C. S. 628.
— — — purpurea C. S. 628.
— — — variegata C. S. 628.
— — variegata Zbl. 628.
— spinosissima Fr. 601, II. 975.
— spinulosa S. et Z. 649.
— Sprengeri Pamp. II. 983
— Ssiori Schm. 641, II. 993.
— stellipila Koehne II. 992.
— stipulacea Maxim. 601, II. **979**.
— subcordata Bentb. 620.
— — Kelloggi Lem. 621.
— subhirtella Miq. 608, 609, II. **981**
Prunus subhirtella Hk. 608, II. **981**.
— — antumnalis Mak. II. 978.
— — Fukubana Mak. II. 981.
— — pendula Tan. II. 982.
— subrotunda Bechst. 631.
— susquebanae W. 613.
— Sweginzowii Koeh. II. 975.
— syriaca Borkh. 630.
— szechuanica Bat. 617, II. **988**.
— taiwaniana Hay. II. 981.
— tangutica Koeh. II. 973.
— tarda Sarg. 627, II. **990**.
— tatsienensis Bat. 617, 987.
— — adenophora Koeh. 987.
— — pilosiuscula C. S. 617, II. 987.
— — stenadenia Koeh. II. 987.
— tenuiflora Koeh. II. 984.
— texana A. Dietr. II. 975.
— — Scheele 625.
— thibetica Fr. 627, II. **990**
— tomentosa Thbg. 601, II. **975**
— — Batalini C. S. II. 976.
— — breviflora Koeh. II. 976.
— — endotricha Koeh. II. 976.
— — Graebneriana Koeh. II. 975.
— — heteromera Koeb. II. 976.
— — insularis Koeh. II. 975.
— — Kashkarowii Koeh. II. 975.
— — Spaethiana Koeh. II. 975.
— — Souliei Koeh. II. 975.
— — trichocarpa Koeh. II. 975.
— — tsuluensis Koeh. II. 976.
— trichantha Koeh. II. 982.
— trichocarpa Bge. 602, II. 975.
— trichostoma Koeh. II. 979.
— triflora Roxb. 627, II. 990.
— — pubipes Koeh. II. 990.
— triloba Ldl. 595, II. 973.
— — Il. simpl. Ht. II. 974
— Tschonoskii Koeh. II. 978
— Twymaniana Koeh. II. 985.
— ulmifolia Franch. 596, II. 974.
— umbellata Ell. 625, II. **990**.
— — injucunda Sarg. 624.
— undulata Ham. 646, II. 992.
— ursina Kotschy 634.
— — flava Boiss. 634.
— utahensis Koeh. 613.
— variabilis Koeh. II. 987.
— Veitchii Koeh. II. 981.
— velutina Bat. 638, II. 994.
— venosa Koeh. II. 992.
— venusta Koeh. II. 988.
— verrucosa Fr. 604, II. 976.
— vinaria Bechst. 631.
— vinariensis Hsskn. 628.
— virgata Ht. 595.
— virginiana L. II. 993.
— — cartilaginea Ht. II. 991.
— — demissa Torr. 642, II. 993.
— — Duerinckl Zbl. 642.
— — leucocarpa Wats. 642.
— Watsoni Sarg. 624.
— Wildeniana Koeh. II. 985.
— Wilsoni Koeb. II. 992.
— — leiobotrys Koeh. II. 992.

Prunus yedoensis Mats. 611, II 983.
— yunnanensis Franch. 609, II. 987.
— — Henryi C. S. 609, II. 987.
— Zappeyana Koeh. II. 980.
— — subsimplex Koeh. II. 980.
Psedera Necker II. 313, 1033.
— Henryana C. S. II. 318.
— heptaphylla Rehd. II. 316.
— himalayana C. S. II. 313.
— quinquefolia Greene II. 317.
— — hirsuta Rehd. II. 317.
— — minor Rehd. II. 317.
— — murorum Rehd. II. 317.
— — Saint-Pauli Rehd. II. 317.
— — × vitacea II. 316.
— sinensis C. S. II. 314.
— texana Greene II. 316.
— tricuspidata Rehd. II. 315.
— vitacea Greene II. 315.
— — duhia Rehd. II. 315.
— — laciniata Rehd. II. 315.
— — macrophylla Rehd. II. 315.
Pseudaegle Miq. II. 128.
— sepiaria Miqn. II. 129.
Pseudocydonia C. S. II. 1001.
— sinensis C. S. II. 1001.
Pseva Raf. II. 464.
Psoralea L. II. 68.
— bituminosa L. II. 68.
— glandulosa L. II. 68.
Ptelea L. II. 123.
— mollis Anct. II. 124.
— monophylla Lam. II. 157.
— trifoliata L. II. 123.
— — mollis Torr. et Gr. II. 124.
— — pubescens Pursh II. 124.
Pterocarya Kunth 91, II. 880.
— caucasica C. A. Mey. 94.
— chinensis Ht. 92.
— Delavayi Franch. 92, II. 880.
— fraxinifolia K. Koch 94.
— — Spach 93.
— — dumosa Lav. 94.
— — × stenoptera 93.
— — typica C. S. 94.
— hupehensis Skan II. 880.
— japonica Dipp. II. 880.
— laevigata Ht. 93.
— macroptera Bat. 92, II. 881.
— Paliurus Bat. 92, II. 881.
— Rehderiana C. S. 93.
— rhoifolia S. et Z. 94.
— serrata C. S. II. 880.
— sorbifolia Dipp. 94.
— — S. et Z. 95.
— Spachiana Lav. 94.
— stenoptera DC. 92.
Pteroceltis Max. 227.
— Tatarinowii Max. 227.
Pterochiton occidentale Torr. 262.
Pterococcus aphyllus Pall. 258.
Pterospartum sagittale Willk. II. 36.
Pterostyrax S. et Z. II. 583.
— corymbosus S. et Z. II. 583.
Pterostyrax bispidus S. et Z. II. 584.
— micranthum S. et Z. II. 584.
— psilophyllus Diels II. 584.
Ptilotrichum spinosum Boiss. II. 929.
Pueraria DC. II. 114.
— hirsuta C. S. II. 114.
— Thunbergiana Benth. II 115.
— yunnanensis Franch. II. 114.
Pulmonaria suffruticosa L. II. 590.
Punica L. II. 415.
— granatum L. II. 415.
Purshia DC. 528.
— Sprgl. 528.
— glandulosa Curr. 529.
— tridentata DC. 528.
— — glandulosa Jones II. 968.
Pygeum oxycarpum Hance 647.
— phaeostictum Hance 649.
Pyracantha Roem. 761.
— angustifolia C. S. 761.
— coccinea Roem. 762.
— — Lalandi Dipp. 762.
— — latifolia Zbl. 762.
— — pauciflora Dipp. 762.
— crenulata Roem. 761, II. 1004
Pyrularia Mchx. 247.
— oleifera A. Gr. 247.
— pubera Mchx. 247.
Pyrus (L.) Medic. 655.
— acerba DC. 715.
— acutiloba Ilse 688.
— Achras Koch 662.
— alpina W. 689.
— americana DC. 677.
— — decora Sarg. 676.
— amygdaliformis Vill. 657.
— — × communis 658.
— — lobata Decne. 658.
— — microphylla Dene. 657.
— — × nivalis 658.
— — pyraina Decne. 657.
— — triloba Bornm. 658.
— angustifolia Ait. 725.
— — Decne. 657.
— apetala Münchh. 716.
— arbutifolia L. 699.
— — intermedia Ldl. 698.
— — serotina Ldl. 698.
— aria Ehrh. 688.
— — acutifolia DC. 687.
— — angustifolia Ldl. 688.
— — bullata Ldl. 688.
— — cretica Ldl. 690.
— — majestica Prain II. 996
— — obtusifolia DC. 688, 690.
— — rotundifolia Ht. 695.
— — rugosa Ldl. 688.
— — Silvestrii Pamp. II. 996.
— — undulata Ldl. 688.
— Armud Hsskn. et Borum. 659.
— astracania DC. 717.
— atrosanguinea Ht. 729.
— Aucuparia Gaertn. 674.

Digitized by Google

Pyrus Aucuparia glahra Trautv. 678.
— — glabrata W. et Grab. 673.
— — maderensis Lowe 672.
— auricularis Knoop 666.
— austriaca Kern. 659.
— baccata L. 721.
— — himalaica Max. 721.
— — mandschurica Max. 721.
— — sihirica Max. 720.
— Balansae Decne. 663.
— betulaefolia Bge. 665.
— Boissieriana Boiss. et Buhse 663.
— Bollwylleriana DC. 667.
— — hulhiformis Tat. 667.
— botryapium L. 734.
— Boveana Decne. 657.
— Bourgaeana Decne. 662.
— brachypoda Kern. 663.
— brunnea Lévl. II. 995.
— bucharica Litw. 655, II. 994
— Calleryana Decne. 666, II. 995.
— canescens Ht. 657.
— — Spach 656.
— cathayensis Hemsl. 730
— ceratocarpa Wend. 719.
— chamaemespilus Ehrh. 698.
— collivaga Vel. 658.
— communis L. 661.
— — Thhg. II. 995.
— — Achras Wallr. 661.
— — fol. var. Kirchn. 662.
— — hortensis Beck 662.
— — Mariana Wllk. 662.
— — nana Dipp. 662.
— — × nivalis 660.
— — pendula Kirchn. 662.
— — Pyraster L. 661.
— — — cordata C. S. 661.
— — Sahauda Decne. 658.
— — × salicifolia 657.
— — sativa DC. 662.
— — — nana C. S. 662.
— — — pendula C. S. 662.
— — — variegata C. S. 662.
— — × sinensis 663.
— — × Sorhus Aria 666.
— — × syriaca 661.
— confusa Gremli 689.
— Conwentzi Graeh. 688.
— cordata Desv. 661, 663.
— coronaria L. 724.
— — angustifolia Wenz. 725.
— — ioensis Wood. 724.
— crataegifolia Savi 724.
— crenata Don 656.
— — Ldl. 684.
— cretica W. 733.
— cuneifolia Guss. 658.
— cnspidata Bertol. 700.
— Cydonia L. 654.
— decipiens Bechst. 668.
— Delavayi Franch. 727.
— dentata Ilse 695.
— depressa Ldl. 698.
— dimorphophylla Mak. II. 995.
— — × sinensis II. 995.
Pyrus dioeca Moench 716.
— discolor Max. 669.
— diversifolia Bong. 724.
— domestica Sm. 683.
— Doumeri Bois 728.
— edulis W. 687.
— — acutifolia DC. 687.
— elaeagrifolia Pall. 658.
— — Kotschyana Boiss. 659.
— — pontica Hsskn. et Bornm. 659, 660.
— — × salicifolia 656.
— eriopleura Rchh. 658.
— Fauriei C. S. 666.
— ferruginea Hk. 700.
— florentina Targ. 724.
— floribunda Ldl. 699.
— Folgneri Lév. II. 997.
— foliolosa Wall. 680.
— formosana Kaw. et Koidz. II. 999.
— fusca Raf. 724.
— glabra Boiss. 655.
— gracilis S. et Z. 679.
— graeca Lodd. 690.
— grandifolia Ldl. 700.
— granulosa Bert. 700.
— Griffithi Hk. 701.
— Halliana Voss 720.
— heterophylla Ht. 658, 665.
— — Rgl. et Schm. 655.
— — dissecta Ht. 655.
— — Koopmannni Späth 665.
— hupehensis Pamp. II. 995.
— hybrida Mnch. 676.
— indica Wall. 728.
— insignis Hk. 667.
— intermedia Bechst. 695.
— — Ehrh. 692.
— — angustifolia DC. 687.
— irregularis Münchh. 666.
— Jacquemontiana Decne. 664.
— ioensis Bail. 724.
— japonica Thhg. 730, II. 1001.
— kansuensis Bat. 726.
— karensium Kurz 700.
— Koehnei C. S. 665.
— — Lévl. II. 997.
— kolupana C. S. 665.
— Korshinskyi Litw. 655, II. 994.
— Kotschyana Boiss. 659.
— kumaonensis Wall. 691.
— kumaoni Decne. 665, II. 995.
— Kurzi Watt. 679.
— lanata Don 691.
— latifolia acutifolia Irm. 689.
— — dentata Irm. 695.
— — parumlohata Irm. 695.
— longipes Coss. et Dr. 663.
— malifolia Spach II. 995.
— Malus L. 716.
— — aucubaefolia Kirchn. 716.
— — austera Wall. 715.
— — glahra Koch 715.
— — mitis Wall. 715.
— — sylvestris L. 715.
— — tomentosa Koch 716.

Pyrus Matsumurana Mak. 669.
— Maulei Mast. 731.
— melanocarpa W. 700.
— — subpubescens Ldl. 700.
— Mengo Sieb. 723.
— meridionalis Guss. 691.
— Michauxi Bosc 658.
— micrantha Fr. et Sav. 669.
— microcarpa Ht. 717.
— — Sprgl. 677.
— microphylla Wall. 682.
— minima Ley 692.
— Miyabei Sarg. 703.
— nebrodensis Guss. 754.
— Neumanniana Tausch 734.
— Niedzwetzkyana Hemsl. 716.
— nigra Sarg. 700.
— nivalis Jacq. 658.
— — elaeagrifolia C. S. 658.
— — — × syriaca 660.
— — Kotschyana C. S. 659.
— — × salicifolia 656.
— — typica C. S. 659.
— — — austriaca C. S. 659.
— Nussia Ham. 713.
— oblongifolia Spach 657, 658.
— occidentalis Wats. 670.
— odorata Ht. 717.
— ovalis W. 738.
— Parkmani Ht. 720.
— parviflora Desf. 658.
— pashia Ham. 664.
— — kumaoni Stapf II. 995.
— — trigyna Decne. 665.
— pancicrenata Ilse 695.
— persica Pers. 658.
— pinnatifida Ehrh. 691.
— — Sm. 674.
— pohuashanensis Hance 672.
— Pollveria L. 667.
— polycarpa Hk. 700.
— praecox Pall. 715.
— praemorsa Guss. 672.
— Pratti Hemsl. 719.
— prunifolia W. 717.
— pubens Ldl. 699.
— pyrainus Raf. 657.
— Pyraster Borkh. 662.
— rhamnoides Hk. 701.
— Ringo Wenz. II. 1000.
— Riversi Ht. 717.
— rivularis Dougl. 724.
— — levipes Nutt. 724.
— rotundifolia Bechst. 695.
— salicifolia Pall. 656.
— — pendula Ht. 656.
— salvifolia DC. 660.
— sambucifolia Auct. 669.
— — Cb. et Schl. 668.
— sanguinea Pursh 757.
— Scheideckeri Späth 721.
— semilobata Bechst. 695.
— semipinnata Bechst. 692.
— — Roth 674.
— sempervirens W. 725.
— Sieboldi Carr. 653.
Pyrus Sieboldi Rgl. 723.
— Sieversi Led. 715.
— sikkimensis Hk. 719.
— Simoni Carr. 663.
— sinai Nouv. Duh. 658.
— sinaica Dum.-Cours. 658.
— sinensis Ilt. 721.
— — Ldl. 663.
— — Poir. 729.
— — culta Mak. II. 995.
— — Maximowiciana Lévl. II. 995.
— — ussuriensis Mak. II. 995.
— Soulardi Bail. 718.
— spectabilis Ait. 719.
— spbaerocarpa Wend. 719.
— subcordata Led. 724.
— sudetica Tausch 698.
— syriaca Boiss. 660.
— thianshanica Franch. 668.
— Thomsoni Hk. 701.
— thuringiaca Ilse 675.
— tomentosa Mnch. 667.
— Toringo Koch 723.
— torminalis Ehrh. 696.
— — mollis Beck 696.
— transitoria Bat. 726.
— trilobata DC. 726.
— Tschonoski Maxim. 727.
— turcestanica Franch. 693.
— ursina Wall. 680.
— ussuriensis Max. 663.
— Uyematsuana Mak. II. 995.
— variolosa Wall. 665.
— verruculosa Bert. 665, 700.
— vestita Wall. 684.
— Wallichi Hk. 680.
— Wangenheimiana Tausch 734.
— Wilbelmi C. S. 665.
— yunnanensis Franch. 727.
— Zumi Mats. 722.
Pyxidanthera Mchx. II. 570.
— barbulata Mchx. II. 570.

Quercus L. 161.
— Abelicea Lam: 226.
— acuminata Sarg. 207.
— — × macrocarpa 202.
— acuta Thbg. 210.
— aegylopifolia Pers. 184.
— aegilops L. 181.
— — Mill. 195.
— agrifolia Née 186.
— aizoon Koch. 805.
— ajndaghensis Ht. 195.
— alba L. 203.
— — × bicolor 805.
— — Gunnisoni Torr. II. 901.
— — × macrocarpa 201.
— — minor Marsb. 206.
— — × minor 203.
— — × platanoides 202.
— — × prinus 203.
— — × stellata 805.
— Allardi Hy 197.
— alnifolia Poech 183.

Quercus ambigua Kit. 195.
— — Mchx. 175, II. 900.
— Ambrozyana Simk. II. 900.
— andegavensis Hy 194.
— anodonta Borb. 184.
— apennina Lam. 197.
— — Lois. 193.
— aquatica Walt. 168.
— — laurifolia DC. 167.
— asperata Pers. 195.
— asterotricha Borb. et Csató 195.
— aurea Wierzb. 196.
— austriaca W. 181.
— — sempervirens Ht. 200, II. 901.
— badensis Beck 195.
— Ballota Desf. 188, II. 901.
— Banisteri Mchx. 169.
— Bebbiana C. S. 201.
— Benderi Baen. 174.
— — coccinoides Baen. 174.
— — — volvato-annulata Baen. 174.
— — rubrioides Baen. 174.
— bicolor W. 202, 805.
— bivoniana Guss. 186.
— borealis Mchx. II. 900.
— Bossebovii Hy 197.
— Braunii Borb. 194.
— Brayi Small 207.
— brevifolia Sarg. 165, 804.
— breviloba Sarg. 206.
— brevipes Heuff. 197.
— Brittoni Davis 169.
— brutia Ten. 197.
— budensis Borb. 195.
— budenziana Borb. 194.
— Bungeana Forb. 778.
— californica Coop. 172.
— — × Wislizeni 172.
— camata pendula Ht. 194.
— Castanea Müblbg. 207.
— castaneaefolia C. A. M. 178.
— Catesbaei Mchx. 172.
— — × cinerea 804.
— — × laurifolia 167.
— — × nigra 168.
— Cerris L. 181.
— — Pall. 195.
— — austriaca Loud. 181.
— — — haliphlaeos C. S. 181.
— — dentata Wats. 183.
— — × ilex 183.
— — laciniata Kirchn. 181.
— — pendula Neill. 181.
— — × suber 182, 183.
— — × pubescens 183.
— — typica Loud. 181.
— — — argenteo-variegata C. S. 181.
— — — aureo-variegata C. S. 181.
— — — laciniata C. S. 181.
— chinensis Bge. 178.
— chinquapin Pursh 207.
— chrysolepis Liebm. 188.
— — vaccinifolia Engelm. 188
— cinerea Mchx. 165, 804.
— coccifera L. 184.
— — × ilex 185.

Quercus coccinea Münchh. 173.
— — ambigua Gr. II. 900.
— — × ilicifolia 169, 804.
— — × imbricaria 167.
— — × nana 169.
— — × palustris 174.
— — × phellos 165.
— — × rubra 174.
— — Rugelii DC. 174.
— — × tinctoria 173.
— — × velutina 173.
— conferta Kit. 193.
— — × lanuginosa 194.
— — × robur 194.
— — × sessilis 194.
— crinita Lam. 181.
— crispata Stev. 195.
— crispula Bl. 209.
— Csatoi Borb. 197.
— cuneata Wangh. 170, 804, II. 900.
— — × ferruginea 169.
— — × ilicifolia 169, 804.
— — × marylandica 804.
— — × phellos 804.
— — × rubra 805.
— — × velutina 805.
— cuneifolia Vucot. 198.
— cuspidata Thbg. 160.
— cypria Jaub. et Spach 183.
— — Kotschy 191.
— daimio Ht. 210.
— densifolia Chev. 195.
— densiflora Hook. et Arn. 161.
— dentata Thbg. 209.
— devensis Simk. 195.
— digitata Sudw. 170.
— — × marylandica 169.
— — × nana 169.
— — × phellos 165.
— — × rubra 172.
— — × velutina 171.
— dilatata Hort. 190.
— — Ldl. 190.
— discolor Ait. 173.
— Donglasii Hk. et Arn. 206.
— — Gambeli A. DC. II. 901.
— dschorochensis Koch 196.
— dumosa Nutt. 189.
— — bullata Engelm. 190.
— — revoluta Sarg. 190.
— echinata Salisb. 181.
— Ehrenbergii Kotsch. 181.
— ellipsoidalis Hill 174.
— erioneura Borb. 197.
— esculus intermedia Heuff. 194
— exoniensis Lodd. 182.
— falcata Mchx. 171, II. 900.
— — × tinctoria 171.
— farnetto Ten. 193.
— fastigiata Lam. 199.
— Feketei Simk. 197.
— femina Mill. 199.
— ferruginea Mchx. 168.
— — × tinctoria 169.
— Fontanesii Guss. 184.
— fructipendula Schrk. 199.

Quercus fruticosa Brot. 190.
— fulhamensis Lond. 183.
— Gambeli Nntt. 204, II. 901.
— Garryana Hook. 205.
— georgiana Curt. 177.
— — × marylandica 169.
— — × nigra 169.
— glabra Thbg. 161.
— glahrescens Kern. 195.
— glandulifera Bl. 208.
— glauca Thbg. 210.
— — glahra Fr. et Sav. 210.
— — sericea Fr. et S. 210.
— grammuntia L. 188.
— grosseserrata Bl. 209.
— Gnerangeri Hy 194.
— haas Kotschy 200.
— halipbloeos Lam. 181.
— Hartwissiana Ht. 195.
— — Stev. 194.
— Haynaldiana Simk. 194.
— heterophylla Mchx. 165.
— Heuffelii Simk. 194.
— hispanica Lam. 184.
— Hollickii C. S. 165.
— — Graehnerii C. S. 165.
— — karlsruhensis C. S. 165.
— — typica C. S. 165.
— hudsonica Ht. 169.
— hnmilis Lam. 190.
— — Walt. 166.
— hungarica Hub. 193.
— hybrida Bechst. 197.
— hyemalis Stev. 199.
— ilex L. 188.
— — Ballota DC. II. 901.
— — × Rohur II. 901.
— — × sessilis II. 901.
— — × suber 187.
— ilicifolia Salish. 188.
— — Wangh. 169, 804.
— — × marylandica 804.
— — × phellos 804.
— — × velutina 804.
— imbricaria Mchx. 166.
— — × marylandica 167.
— — × palustris 167.
— — × phellos 165.
— — × rubra 167.
— — × velutina 167.
— intercedens Beck 195.
— intermedia Boenn. 197.
— Jackiana C. S. 202.
— Kanitziana Borb. 195.
— Kelloggii Newh. 172, 805.
— — × Wislizenii 172, 805.
— Kerneri Simk. 195.
— Koehnei Amhr. II. 901.
— laciniata Lodd. 199.
— laciniosa Bor. 195.
— lanuginosa Lam. 194, II. 901.
— — hrachyphylloides C. S. 194.
— — crispata Beck 195.
— — pinnatifida Beck 195.
— — prionota Beck 195.
— — × rohur 195.

Quercus lanuginosa × sessilis 195.
— — typica Beck 195.
— laurifolia Mchx. 167.
— leana Nutt. 167.
— lihani Oliv. 178.
— lobata Née 203.
— longaeva Salish. 199.
— lucombeana Holw. 182.
— lusitanica Lam. 190.
— lyrata Walt. 204.
— macedonica DC. 178.
— macranthera Fisch. et M. 192
— — × sessilis 192.
— macrocarpa Mchx. 201.
— — olivaeformis Gray 201.
— — × prinoides 202.
— magnifica Ht. 169.
— Margaretta Ashe 206, II. 901.
— marylandica Muenchh. 168.
— — × nana 169.
— — × phellos 165.
— — × velutina 169.
— mespilifolia Wallr. 197.
— mesto Boiss. 184.
— Michauxii Nutt. 207.
— microcarya Small 168, II. 900
— minor Sarg. 106.
— Mirbeckii Dur. 192.
— mongolica Fisch. 209.
— montana W. 207.
— morehus Kell. 172.
— Morisii Borzi 187.
— Mühlenbergii Engelm. 207, 805
— nana Sarg. 169.
— — × phellos 165.
— — × velutina 169.
— nigra Duroi 173.
— — L. 168.
— — Wangh. 169.
— — aquatica Lam. 168.
— — digitata Marsh. 171.
— — hybrida Ht. 169.
— — marylandica L. 169.
— — × ruhra 168.
— — tridentata DC. 167.
— ohovata Bge. 209.
— ohtusiloha Mchx. 206.
— occidentalis Gay 187.
— olivaeformis Mchx. 201.
— ostriaefolia Borh. 180.
— pagodaefolia Ashe 170, II. 900.
— pallida Heuff. 195.
— palustris Münchh. 177.
— — × phellos 165.
— — × ruhra 176.
— pannonica Hort. 193.
— pedunculata Ehrh. 199.
— — asplenifolia Kirchn. 198
— — aureo-hicolor Kirchn. 198.
— — bullata Ht. 198.
— — cochleata Ht. 198.
— — concordia Kirchn. 198.
— — crispa Ht. 198.
— — cucullata Kirch. 198.
— — filicifolia Topf 199.
— — fol. atropnrp. Kirchn. 198.

Quercus pedunculata gracilis Ht. 198.
— — Hentzei Ht. 198.
— — heterophylla Loud. 199.
— — latiloba Lasch 198.
— — monstrosa Dipp. 198.
— — monstrosifolia Zab. 198.
— — pectinata Kirchn. 199.
— — pendula Loud. 199.
— — purpurascens DC. 198.
— — purpurea Loud. 198.
— pendula Lodd. 199.
— pendulina Kit. 195.
— phellos L. 164.
— — brevifolia Lam. 166.
— — microcarpa Dipp. 164.
— — × rubra 165.
— — subimbricaria DC. 165.
— — × velutina 165.
— phillyraeoides Gray 189.
— platanoides Sudw. 202.
— pontica Koch 192.
— prinoides W. 206.
— — rufescens Rehd. II. 901.
— prinus L. 207.
— — acuminata Mchx. 207.
— — humilis Marsh. 207.
— — palustris Mchx. 208.
— — platanoides Lam. 202.
— pseudococcifera Webb 184.
— pseudoilex Chat. 188.
— pseudosuber Santi 184.
— pseudoturneri C. S. 200, 805, II 901.
— — Veitch 805, II. 901.
— pubescens W. 194.
— — brachyphylloides Wiesb. 194.
— — pinnatifida A. Br. 195.
— pumila Walt. 165.
— pyramidalis Gmel. 199.
— pyrenaica W. 194.
— quinqueloba Englm. 169
— Raineri Manetti 168.
— Redöi Borb. 195.
— Richteri Baenitz 176.
— robur L. 197, II. 901.
— — Mill. 197.
— — cuneifolia Beck 198.
— — — aureo-variegata C. S. 198.
— — — diversifolia C. S. 198.
— — — filicifolia C. S. 199.
— — — laciniata C. S. 199.
— — — pectinata C. S. 199.
— — fastigiata Spach 199.
— — hyemalis Beck 199.
— — laciniata DC. 199
— — lanuginosa Lam. 805.
— — pendula C. S. 199.
— — sanguinea Spach 198.
— — sessiliflora aurea DC. 196.
— — — Szovitsii DC. 192.
— — sessilis Martyn 197.
— — × sessilis 197.
— — × toza 194.
— — typica Beck 197.
— — — argenteo-marginata C. S. 198.

Quercus robur typica argenteo-picta C. S. 198.
— — — atropurpurea C. S. 198.
— — — aureo-bicolor C. S. 198.
— — — concordia C. S. 198.
— — — cucullata C. S. 198.
— — — latiloba C. S. 198.
— — — maculata C. S. 198.
— — — pallida C. S. 198.
— — — sanguinea C. S. 198.
— rosacea Bechst. 197.
— rubra L. 175.
— — ambigua Fern. II. 900.
— — dissecta Lam. 177.
— — nana Marsh. 169.
— — ramosissima Marsh. 177.
— — runcinata DC. 172.
— — × velutina 173.
— — viridis Dipp. 175.
— Rudkini Britt. 165.
— Rugelii Zbl. 174.
— runcinata Engelm. 172.
— sanguinea Bechst. 198.
— Saulii C. S. 203.
— Sebneckii Britt. 176.
— Schochiana Zbl. 165.
— semilanuginosa Borb. 195.
— sempervirens Mill. 188.
— — Walt. 190.
— serrata Thbg. 178.
— sessiliflora Salisb. 196.
— — acuminata Kirchn. 196.
— — cochleata Kirchn. 196.
— — crispa Ht. 196.
— — decipiens Bechst. 196.
— — laciniata Koeb. 197.
— — longifolia Dipp. 196.
— — Louettei Kirchn. 196.
— — purpurea Dipp. 196.
— — sublobata Koeb 137.
— sessilis Ehrh. 196, II. 901.
— — decipiens C. S. 196.
— — — laciniata C. S. 196, 197
— — — longifolia C. S. 196.
— — — sublobata C. S. 196.
— — pendula C. S. 197.
— — — Louettei C. S. [non Kirchn.] 197.
— — × toza 194.
— — typica C. S. 196.
— — — albo-variegata C. S. 196.
— — — aurea C. S. 196.
— — — aureo-variegata C. S. 196.
— — — cochleata C. S. 196.
— — — pinnata C. S. 196.
— — — purpurea C. S. 196.
— sinuata Walt. 168.
— sonchifolia Ht. 167.
— sonomensis DC. 172.
— spectabilis Kit. 194.
— stellata Wangh. 206, 805.
— stolonifera Lap. 194.
— Streimii Heuff. 195.
— striata Sieb. 190.
— subcrispa Borb. 195.
— suber L. 186.

Digitized by Google

Quercus subera St. Lag. 186.
— suberosa Salisb. 186.
— sublobata Kit. 197.
— subglandulosa Borh. 194.
— superlata Borb. 197.
— Szechenyiana Borb. 194.
— Szovitsii Zbl. 192.
— Tabajdiana Borb. 194.
— tauzin Pers. 194.
— texana Buckl. 176.
— thalassica Hance 210.
— Thomasii Ten. 197.
— tinctoria Mchx. 172.
— — californica Torr. 172.
— — Willdenowiana Dipp. 171.
— Tiszae Simk. et Fek. 195.
— Tournelortii W. 181.
— toza Bosc 194.
— — pendula Dipp. 194.
— Trabuti Hy 194.
— tridentata Eng. 167.
— triloba Mchx. 171, II. 900.
— tulae Simonk. 194.
— Turneri Hort. 200.
— — W. 200, II. **901**.
— uliginosa Wangh. 168.
— — laurifolia Zbl. 167.
— undulata Torr. 206.
— — Gamhelii Englm. II. 901.
— vacciniifolia Kell. 188.
— velutina Lam. 172.
— veneris Kern. 191.
— Vibrayeana Fr. et S. 210.
— virens Ait. 190.
— virginiana Mill. 199.
— Willdenowiana Zbl. 171.
— Wislizenii DC. 185.
Quinaria hederacea Ral. II. 317.
— himalayana Gilg II. 314.
— birsuta Raf. II. 317.
— quinquelolia Koeh. II. 316.
— radicantissima Koeh. II. 317.
— tricuspidata Koeh. II. 315.
— Veitchi Koeh. II. 315.

Rajana hexaphylla Tbbg. 295.
— ovata Walt. 260.
Ramona incana Briqu. II. 602.
Raphiolepis Ldl. 704.
— indica Ldl. 705.
— integerrima Hk. et A. 706.
— japonica S. et Z. 705.
— Mertensi S. et Z. 706.
— ovata Briot 706.
— phaeostemon Ldl. 705.
— rubra Ldl. 705.
— salicifolia Ldl. 705.
— spiralis Don 705.
— umbellata C. S. 705.
— — ovata C. S. 706.
Raphithamnus cyanocarpus Miers II. 590.
Réaumuria L. II. 340.
— cistoides Adam II. 340.
— hypericoides Willd. II. 340.

Razoumofskya Hollm. 251.
— caucasica Hollm. 251.
— oxycedri Schultz 251.
Rebis Gayana Spach 420.
Retama Boiss. II. 26.
— Ral. II. 26.
— monosperma Boiss. II. 26.
— sphaerocarpa Boiss. II. 27.
Rhamnella Miqu. II. 263.
— Iranguloides Weberb. II. 263.
— japonica Miqu. II. 263.
Rhamnus L. II. 263.
— adriaticus Jord. II. 281.
— Alaternus L. II. 270.
— — × alpinus II. 271.
— — angustifolius Willd. II. 271.
— alnifolius L'Hér. II. 277.
— — Pursh II. 266.
— alpinus Auct. et Ht. II. 271.
— — L. II. 272.
— — colchicus Kusn. II. 275.
— — glaucophyllus Fior. et Paol. II. 274
— — grandifolius Dipp. II. 275.
— — pumilus Dipp. II. 274.
— americana Ht. II. 271.
— amygdalina DC. II. 279.
— argutus Maxim. II. 289.
— asplenifolia Simk. II. 265.
— baeticus Willk. et Rev. II. 265.
— Billardi Ht. II. 271.
— Buergeri Miqu. II. 285.
— californicus Eschsch. II. 267.
— — ruhra Trel. II. 267.
— — tomentellus Brew. et Wats. II. 267.
— canadensis Ht. II. 264.
— carniolicus Kern. II. 271.
— carolinianus Walt. II. 268.
— — mollis Fern. II. 1032.
— carpinifolius Pall. 225.
— catharticus L. II. 287.
— — davuricus Maxim. II. 287.
— — hydriensis DC. II. 287.
— — intermedius Maxim. II. 287.
— — serawschanicus Kom. II. 288.
— — × tinctoricus II. 283.
— chlorophorus Koeh. II. 288.
— Clusii W. II. 271.
— colchicus Somm. et Lév. II. 275.
— cornifolius Boiss. et Hoh. II. 274.
— costatus Maxim. II. 276.
— crenatus S. et Z. II. 269.
— croceus Nutt. II. 270.
— curdicus Boiss. et Hoh. II. 280.
— daburicus Herb. II. 270.
— — apricus Maxim. II. 284.
— davuricus Pall. II. 287.
— — nipponicus Mak. II. 287.
— dumosus Ht. II. 281.
— erythroxylon Auct. II. 278
— — Pall. II. 278.
— fallax Boiss. II. 271.
— — Guicciardii Boiss. II. 274.
— — × pumilus II. 271.
— — × Sibthorpianus II. 275.
— Frangula L. II. 264.
— — angustifolia Loud. II. 265.

Rhamnus Frangula asplenifolia Dipp. II. 265.
— — ellipticus Hauskn. II. 264.
— — eximius C. S. II. 265.
— — latifolius Dipp. II. 264.
— — orientalis Somm. et Lev. II. 264.
— — sempervirens Ht. II. 265.
— — subrotunda Rouy et Fouc. II. 264
— franguloides Mchx. II. 277.
— glaucophyllus Somm. II. 274.
— globosus Bge. II. 284.
— graecus Auct. II. 279.
— — Boiss. et Reut. II. 279.
— grandifolius Fisch. et Mey. II. 265.
— Guicciardii Heldr. et Sart. II. 274.
— Heldreichii Boiss. II. 280.
— Hemsleyanus C. S. II. 270.
— hirtellns Boiss. II. 280.
— bybridus L'Hér. II. 271.
— — Billardi Lav. II. 271.
— hydriensis Hacqu. II. 287.
— bypochrysus C. Schn. II. 290.
— imeretinus Booth [et Koeh.] II. 275.
— infectorius L. II. 283.
— — latifolius R. et F. II. 283.
— — pubescens Grisb. II. 281.
— intermedius Steud. et Hochst. II. 281.
— iranicus Hausskn. II. 279.
— iteinophyllus C. S. II. 281.
— japonicus Maxim. II. 285.
— — decipiens Maxim. II. 285.
— Jujuba Lam. II. 261.
— koraiensis C. S. II. 284.
— lamprophyllus C. S. 289.
— lanceolatus Pursb II. 277.
— latifolia Kirchn. II. 264.
— latifolius L'Hér. II. 264.
— leptopbyllus C. S. II. 285.
— libanoticus Auct II. 275.
— — Boiss. II. 274, 275.
— lineatus L. II. 262.
— lycioides L. II. 277.
— — Pall. II. 278.
— — velutinus Willk. II. 277.
— macrophyllus Carr. II. 290.
— mandscburicus Ht. II. 287.
— microcarpus Boiss. II. 273.
— — microphyllus Trautv. II. 273.
— Mulleyanus Fritsch II. 271.
— Nicolae Simk. II. 274.
— — Budnae Simk. II. 274.
— nipponicus C. S. II. 287.
— occidentalis How. II. 267.
— oleifolius Hook. II. 267.
— — Hort. II. 264.
— oleoides L. II. 279.
— orbiculatus Bornm. II. 283, 289.
— palaestinus Boiss. II. 279.
— Paliurus L. II. 260.
— Pallasii F. et M. II. 277.
— — spatnlaefolius Maxim. II. 279.
— — tortuosus C. S. II. 278.
— parvifolius Bge. II. 285.
— — Torr. et G. 277.
— persicifolius Moris II. 288.
— persicus Boiss. II. 280.
Rhamnus petiolaris Boiss. II. 288.
— — velutinus Boiss. II. 288.
— polymorphus Turcz. II. 285.
— prunifolius Sibth. et Sm. II. 281.
— pubescens Sibtb. et Sm. II. 274.
— pumilus L. II. 274.
— — Wulf. II. 268.
— punctatus Boiss. II. 280.
— purpureus Edgew. II. 271.
— Purpnsi Koeh. II. 267.
— Purshianus DC. II. 266.
— — californicus Rehd. II. 267.
— — intermedius Koehne II. 267.
— — tomentellus Brandeg. II. 267.
— rhodopeus Vel. II. 281.
— Rostborni Pritzel II. 283.
— rubra Greene II. 267.
— rugulosus Hemsl. II. 276.
— rupestris Scop. II. 268.
— — cinerascens Murb. II. 268.
— Sargorskii Bornm. II. 289.
— saxatilis Jacqu. II. 282.
— — dumosns Ht. II. 281.
— — intercedens Beck II. 283.
— — tinctorius Beck II. 283.
— — Villarsii Rouy et Fouc. II. 283.
— scandens Hill II. 262.
— Schneideri Lév. et Vt. II. 1032.
— sempervirens Ht. II. 265, 271.
— Shortii Nutt. II. 277.
— Sibthorpianus Roem. et Schult. II. 274.
— Simonii Ht. II. 281.
— spatulaefolius F. et M. 279.
— tinctorius Ht. II. 285.
— — Waldst. et Kit. II. 283.
— tomentellus Benth. II. 267.
— tortuosus Somm. et Lév. II. 278.
— ulmoides Güldenst. 225.
— utilis DC. II. 289.
— velutinns Boiss. II. 277.
— Villarsii Jord. II. 283.
— — Lagg. II. 287.
— virgatus Roxb. II. 285.
— — sylvestris Maxim. II. 286.
— volubilis L. II. 262.
— Wulfenii Hoppe [et Sprgl.] II. 268.
— Yoshinoi Mak. II. 285.
— Zizyphus L. II. 261.
Rhaphithamnus Miers II. 590.
— cyanocarpus Miers II. 590.
Rhododendron L. II. 470, **1042**.
— aeruginosum Hook. II. 492.
— albicans Wat II. 499.
— albiflorum Hook. II. 509.
— — plenum Rehd. II. 1046.
— Albrechti Maxim. II. 496.
— album Don II. 492.
— — elegans × catawbiense II. 485.
— altaclerense Ldl. II. 485.
— ambiguum Hemsl. II. 1043
— anthopogon Don II. 480.
— anthopogonoides Maxim. II. 480.
— arborescens Torr. II. 500.
— — × calendulaceum II. 1046.
— — × luteum II. 500.

Rhododendron arboreum Smith II. 491.
— — album Wall. II. 492.
— — cinnamomeum Ldl II. 492.
— — — × maximum album II. 488.
— — × caucasicum II. 483.
— — × catawbiense II. 485.
— — × (catawbiense × ponticum) II. 485.
— — × dabnricum II. 472.
— — × Griffithianum II. 1046.
— — limbatum Hook. II. 492.
— — × nudiflorum II. 492.
— — × ponticum II. 488.
— arbutifolium Rehd. II. 474.
— Aucklandi Hook. II. 487.
— — × catawbiense II. 485.
— Angnstinii Hemsl. II. 475, 1045.
— auriculatum Hemsl. II. 492.
— azaleoides Desf. II. 488.
— baeticum Boiss. et Reut. II. 488.
— barbatum Wall. II. 489.
— Batemanni Hook. II. 492.
— Benthamianum Hemsl. II. 1043.
— blepharocalyx Franch. II. 481.
— brachycarpum Don II. 493.
— Brettii H. et Wils. II. 1045.
— Breynii Planch. II. 506.
— Burmanni Don II. 504.
— calendulaceum Torr. II. 500, **1046**.
— — croceum II. 1046.
— — flammeum Zab. II. 500.
— — Morterii Don II. 500.
— — × nudiflorum II. 1046.
— — speciosum Zab. II. 500.
— — × viscosum II. 1046.
— californicum Hook. II '89.
— — washingtonianum [illegible] II. 489.
— calophytum Franch. II. .
— campanulatum Don II. 49 .
— — aeruginosum Nich. II. 492.
— — Batemani Nich. II. 492.
— — Wallichii Hook. II. 492.
— campylogynum Franch. II. 479.
— canadense Zab. II. 494.
— — album Zab. II. 494.
— — × flavum II. 494.
— canescens G. Don II. 502.
— catawbiense Mchx. II. 485.
— — × cancasicum II. 482.
— — fastnosum II. 485.
— — × nudiflorum II. 485.
— — × ponticum II. 485.
— caucasicum Pall. II. 482.
— — flavidum Rgl. II. 482.
— — × ponticum II. 483.
— — stramineum Hook. II. 482.
— cepbalantbum Franch. II. 481.
— cbamaecistns L. II. 515.
— cbartophyllum Fr. II. 1044.
— chrysanthnm Pall. II. 481.
— ciliatum Hook. II. 473.
— — × dahuricum II. 471.
— — × glaucum II. 473.
— ciliicalyx Franch. II. 473.
— cinnabarinum Hook. II. 473.
Rhododendron Collettianum Aitch. et Hemsl. II. 480
— concinnum Hemsl. II. 1044.
— coombense Hemsl. II. 1044.
— crispiflorum Planch. II. 506.
— Cunninghami Moore II. 488.
— „Cunninghams White" II. 482
— dahuricum L. II. 471.
— — atrovirens Edw. II. 471.
— — mucronulatum Maxim. II. 472
— — sempervirens Sims II. 471.
— Danielsianum Planch. II. 506.
— daphnoides Ht. II. 474.
— Davidi Franch. II. 485.
— Daviesi Ht. II. 499.
— — Zab. II. 499.
— decorum Franch. II. 485.
— Delavayi Franch. II. 491.
— dendrocharis Franch. II. 480.
— dilatatum Miqu. II. 497.
— elaeagnoides Hook. II. 479.
— eximium Don II. 492.
— — Nutt. II. 492.
— Faberi Hemsl. II. 494.
— Falconeri Hook. II. 493.
— Farrerae Weyrichi Diels II. 496.
— fastuosum Houtt. II. 485.
— ferrugineum L. II. 477.
— — albiflornm Schroet. II. 477.
— — × hirsutum II. 477.
— — myrtifolium Schroet. II. 478
— — × punctatum II. 474.
— flavidum Fr. II. 1045.
— flavum Don II. 499
— — albiflorum Zab. II. 499.
— — × japonicum II. 1046.
— — × molle II. 499.
— — × ponticnm II. 488.
— — × sinense II. 499.
— — × viscosnm II. 500.
— Fortunei Ldl. II. 487.
— fragrans Maxim. II. 481.
— — Paxt. II. 485.
— fulgens Hook. II. 493.
— glaucum Hook. II. 475.
— Gowenianum Sweet II. 485.
— Griffitbianum Aucklandi Hook. II 487.
— Halopeanum André II. 1046.
— Hammondi Ht. II. 474.
— Harrovianum Hemsl. II. 1043.
— birsutum L. II. 478.
— — albiflorum Schroet. II. 478.
— — — laciniatum Schroet. II. 478.
— — glabratum Asch. II. 478.
— — hispidissimum Schroet. II. 478.
— — Iasiopus Brügg. II. 478.
— — latifolium Hoppe II. 478.
— — × punctatnm II. 475.
— bybridum Ker II. 488.
— Hymenantbes Mak. II. 490.
— — heptamerum Mak. II. 1046.
— — — angustifolia Mak. II. 1046.
— — pentamerum Mak. II. 1046.
— indicum Sweet II. 506, 1046.
— — amoenum Max. II. 505.

Digitized by Google

Rhododendron indicum amoenum japonicum Max. II. 505.
— — crispillorum C. S. II. 506.
— — japonicum Mak. II. 505.
— — Kaempferi Max. II. 506.
— — macrostemon Mak. II. 507.
— — pulchrum Don II. 504.
— — × rosmarinifolum II. 504
— — sublanceolatum Mak. If. 504.
— intermedium Tausch II. 477.
— — halense Gremb. II. 477.
— — hirsutiforme Gremb. II. 477.
— intricatum Franch. II. 481.
— japonicum C. S. II. 490, **1046**
— — Sur. II. 1046.
— — × occidentale II. 1046.
— — pentamerum Hutch. II. 1046
— — × viscosum II. 1046.
— Kaempferi Planch. II. 505.
— — amoenum Rehd. II. 505.
— — japonicum Rehd. II. 505.
— kamtschaticum Pall. II. 507.
— Keiskei Miqu. II. 475, II. 1043.
— Kesselringii Woll II. 1045
— Keysii Nutt. II. 1043.
— Kosterianum C. S. II. 499.
— Kotschyi Simk. II. 478.
— — albiflorum Schur If. 478.
— lacteum Franch. II. 494, 1046.
— Laetitia Ht. II. 488.
— lanatum Hook. II. 490.
— lancilolium Moench II. 488.
— lapponicum Wahlb. II. 477.
— ledifolium Don II. 504
— — leucanthum DC. II. 504.
— — narcissiflorum Max. II. 504
— — phoeniceum DC. II. 504.
— — purpureum Maxim. II. 504.
— lepidotum Wall. II. 479.
— — obovatum J. D. Hook II. 480.
— leucanthum Bge. II. 504.
— linearifolium S. et Zucc. II. 504.
— longesquamatum C. S. II. 483, 1045.
— Ludoviciae Ht. II. 488.
— lutescens Franch. II. 473.
— luteum C. S. II. 500, **1046**
— — croceum C. S. II. 500
— — flammeum C. S. II. 500.
— — × nudiflorum II. 500.
— — × viscosum II. 500.
— macranthum Don II. 506.
— macrophyllum Don II. 489.
— macrosepalum Maxim. II. 503.
— — linearifolium Mak. II. 503, 504.
— — rhodoroides Maxim. II. 503.
— macrostemon Maxim. II. 507.
— Manglesi Veitch II. 485.
— Mariesii Hemsl. et Wils. II. 496.
— maximum L. II. 488.
— — album Pursh II. 488.
— — hybridum Hook. II. 488.
— — × nudiflorum II. 488.
— Metternichi S. et Z. II. 490, **1046**.
— — heptamerum Max. II. 1046.
Rhododendron Metternichi pentamerum Max. II. 1046.
— micranthum Turcz. II. 475.
— minus Michx. II. 474.
— molle Don [et S. et Z.] II. 497.
— — Miqu. II. 497, 499.
— — × occidentale II. 499.
— — × sinense II. 499.
— — × viscosum II. 499.
— Morterii Sweet II. 500.
— Mortieri Zab. II. 500.
— moupinense Franch. II. 473.
— mucronulatum Turcz. II. 472.
— myrtilolium Lodd. II. 475.
— — Schott et Kotschy II. 478.
— — albiflorum Schur. II. 478.
— narcissiflorum Planch. II. 504
— nigropunctatum Bur. et Franch. II. 477.
— nitidum Torr. II. 502.
— niveum Hook. II. 491.
— Nobleanum Ldl. II. 483.
— nudiflorum Torr. II. 502.
— — × ponticum II. 488.
— obovatum Hook. II. 480.
— obtusum Planch. II. 506.
— — album C. S. II. 506.
— — calyciflorum C. S. II. 506.
— occidentale Gray II. 501.
— odoratum Ht. II. 488.
— oleaefolium Ht. II. 474.
— orbiculare DC. II. 483.
— ornatum Sweet fl. 500.
— ovalifolium Ht. II 475.
— ovatum Ht. II. 475.
— — Planch. II. 509.
— parvilolium Adams II. 476.
— phoeniceum Don II. 504.
— pittosporifolium Hemsl. II. 509, 1046.
— ponticum L. II. 488.
— — album Rehd. II. 488.
— × Smirnowii II. 1045.
— praecox Carr. II. 471.
— primulinum Hemsl. II. 1045.
— Pritzelianum Diels II. 475.
— procerum Salisb. II. 488.
— Przewalskii Maxim. II. 485.
— pulchellum Salisb. II. 494.
— pulcherrimum Ldl. II. 483.
— pulchrum Sweet II. 504
— pumilum Hook. II. 479.
— punctatum Andr. II. 474.
— — album Rehd. II. 474.
— puniceum Planch. II. 504.
— Purshii Don II. 488.
— racemosum Franch. II. 472.
— — rigidum Rehn. II. 1043.
— ramentaceum Planch. II. 506.
— Redowskianum Maxim. II. 508.
— reticulatum Don II. 497.
— Rhodora Don II. 494.
— rhombicum Miqu. If. 497, 1046.
— — albillorum Mak. II. 497.
— rigidum Fr. fl. 1043.
— ripense Mak. II. 503.
— robustissimum Ldl. II. 485.

Rhododendron robustissimum lastuosum fl. pl. III. II. 485.
— rosmarinifolium Dipp. II. 503.
— — album C. S. II. 504.
— — narcissiflorum Dipp. II. 504.
— — phoeniceum Dipp. II. 504.
— — purpureum C. S. II. 504.
— — × suhlanceolatum II. 504
— Rosthorni Diels II. 476.
— rotundifolium Dav. II. 483.
— Rovellii Briot. II. 472.
— rufescens Franch. II. 480
— Russelianum Sw. II. 485.
— salignum Hook. II. 479.
— Schlippenbachi Maxim. II. 494.
— semiharbatum Maxim. II. 509.
— serpyllifolium Miqu. II. 507.
— — alhiflorum Mak. II. 507.
— Seymonri Herh. II. 494.
— Shikokianum Mak. II. 495.
— Sieholdi Miqu. II. 506.
— Simsi Planch. II. 506.
— sinense Hort. II. 499.
— — Sweet II. 497.
— Smirnowi Trantv. II. 489.
— Smithii Sweet II. 488.
— sonomense Greene II. 500.
— speciosum Don II. 500.
— spinulilerum Fr. II. 1043.
— stamineum Franch. II. 509, 1046.
— stenophyllum Mak. II. 1046.
— suhlanceolatum Miqu. II. 504.
— sutchuenense Fr. II. 1045.
— Thomsoni Hook. II. 486.
— tosaense Mak. II. 506.
— trichostomum Franch. II. 481.
— trinerve Franch. II. 507.
— Tschonoski Maxim. II. 507.
— — trinerve Mak. II. 507.
— Ungerni Trautv. II. 489, 1046.
— Vaseyi A. Gray II. 495.
— villosum II. et Wils. II. 1045.
— virgatum Hook. II. 472.
— viscosum Torr. II. 502.
— — glaucum Gray II. 502.
— — hispidum C. S. II. 502.
— — nitidum Gray II. 502.
— — ornatum Don II. 500.
— Wallichii Hook. II. 492.
— Weyrichi Maxim. II. 495.
— Wilsoni Ht. II. 474.
— — Nutt. II. 473.
— yanthinum Fr. II. 1045.
— yunnanense Franch. II. 475, 1045.
Rhodora L. II. 454.
— canadensis L. II. 494.
— deflexa Grill. II. 521.
Rhodothamnus Rchh. II. 514.
— chamaecistus Rchb. II. 514.
— — × Phyllodoce empetriformis II. 515.
— kamtschaticus Pall. II. 507.
Rhodotypos S. et Z. 501.
— kerrioides S. et Z. 501.
— tetrapetala Mak. 501, II. 962.
Rhus L. II. 147, 1022.
Rhus ailanthoides Bunge II. 129.
— amhigua Lav. II. 151.
— aromatica Ait. II. 148.
— Ashei C. S. II. 154.
— canadensis Marsh. II. 149.
— — Mill. II. 154.
— caroliniana Ashe II. 154.
— copallina L. II. 156.
— — arborescens Demck. II. 1022.
— — salicifolia Demck. II. 1022.
— coriaria L. II. 154.
— coriarioides Dipp. II. 155.
— cotinoides Nutt. II. 147.
— Cotinus L. II. 146.
— — atropurpurea Cow. II. 146.
— crenata Dipp. II. 149.
— Delavayi Franch. II. 153.
— diversiloha Torr. et Gr. II. 149.
— elegans Ait. II. 154.
— — glauca Demck. II. 1022.
— — superba Demck. II. 1022.
— lilicifolia Demck. II. 1022.
— glahra L. II. 154.
— — elegans Engl. II. 154, 1022.
— — × hirta II. 154.
— — laciniata Carr. II. 154.
— Henryi Diels II. 154.
— hirta Sudw. II. 153, 1022.
— — laciniata C. S. II. 154, 1022.
— lohata Hook. II. 149.
— Michauxi Sarg. II. 155.
— microcarpa Steud. II. 149.
— ohscurum Mey. 94.
— orientalis C. S. II. 151.
— Oshecki Steud. II. 156.
— Potanini Maxim. II. 154.
— pumila Mchx. II. 155.
— radicans L. II. 150, 1021
— Rydbergi Small II. 149.
— semialata Oshecki DC. II. 156
— silvestris S. et Z. II. 151.
— sinica Diels II 1022.
— suaveolens Ait. II. 149.
— succedanea L. II. 152.
— — japonica Engl. II. 152.
— Toxicodendron Auct. II. 150.
— — L. II. 149.
— — hispida Engl. II. 151.
— — malacotrichocarpum Moore II. 1021
— — microcarpon Mich. II. 149.
— — radicans Auct. II. 150.
— trichocarpa Miqu. II. 152.
— trilohata Nutt. II. 148.
— typhina L. II. 153, 1022.
— — dissecta Rehd. II. 1022.
— — lilicina Spr II. 1022.
— — laciniata Cow. II. 154.
— — — Wood II. 1022.
— velutina Wall. II. 146.
— venenata DC. II. 152.
— vernicifera DC. II. 152.
— — columnaris Schwer. II. 1022.
— — pubens C. S. II. 152.
— Vernix L. II. 152.
— viridiflora Poir. II. 154.

Rhynchosia Lour. II. 1018.
— pseudocajan Camb. II. 1018.
Rhynchospermum Ldl. II. 851.
— jasminoides Ldl. II. 851.
Ribes L. 399, II. **943.**
— acerifolium How. II. 952.
— — Koch 420, II. 943.
— aciculare Sm. 413, II. 949.
— acuminatum Wall. 405, II. 948.
— — minus Jancz. II. 948.
— affine Dougl. 420.
— — Kunth 420, II. 953.
— albidum Paxt. 418.
— albinervium Mchx. 402.
— alpestre Decne. 413, II. 949.
— alpinum Hlt. II. 945.
— — L. 406, II. 945.
— — japonicum Fr. II. 946.
— — — Max. II. 945.
— — manchuricum Max. II. 945.
— Altamirani Jancz. II. 953.
— altissimum Turcz. II. 944.
— amarum M. Cl. 411, II. 949.
— ambiguum Max. 400, II. 951.
— — Wats. 412.
— americanum Mill. 421.
— amictum Greene 410, II. **949.**
— — cruentum Jancz. 410, II. 949.
— — hispidulum Jancz. II. 949.
— — pubescens Jancz II. 949.
— arcuatum Jancz. II. 951.
— aridum Greene 413, II. 949.
— ascendens Eastw. II. 952.
— — Jasperae Eastw. II. 952.
— atropurpureum C. A. M. 404.
— — tomentosum Max. II. 944.
— — var. *β* C. A. M. 403, II. **943.**
— aureum L. 416, II. **953.**
— — chrysococcum Rydb. II. 953.
— — grandiflorum Jancz. II. 953.
— — — intermedium Jancz. II. 953.
— — — revolutum Jancz. II. 953.
— — leiobotrys Zabel 417.
— — × sanguineum 417.
— — tenuiflorum Jancz. II. 953.
— — — longiflorum Jancz. II. 953.
— — — parviflorum Jancz. II. 953.
— Beatoni Hlt. 417.
— Bethmonti Jancz. 417.
— Biebersteinii Berl. 404.
— Billiardii Carr. II. 948.
— bracteosum Dougl 422, II. 953.
— — fuscescens Jancz. II. 953.
— — × nigrum II. 953.
— — viridiflorum Jancz. II. 953.
— bullatum O. et D. 403.
— burejense Schm. 411, II. 949.
— californicum Greene II. 949.
— — Hk. et A. 410, 948.
— campanulatum H. B. II. 952.
— camporum Blank. II. 950.
— carpaticum Kit. 403.
— Carrièrei C. S. 418.
— caucasicum M. B. II. 944.
— cereum Dougl. 419, II. **953.**
— — farinosum Jancz II. 953.
Ribes cereum × inebrians 419.
— — viridescens Jancz. II. 953.
— ciliatum H. B. K. 420, II. 953.
— — Kit. 403.
— ciliosum Howell 402.
— coeleste Jancz. II. 946.
— — velutinum Jancz. II. 948.
— cognatum Greene 413, II. 950.
— coloradense Cov. II. 951.
— Congdoni Hell. II. 950.
— cruentum Jancz. 410.
— Culverwelli Mcf. 414.
— cuncatum Kar. et Kir. 407.
— curvatum Small 409, II. 951.
— Cynosbati L. 411, II. **950.**
— — × grossularia 412.
— — inerme Rehd. II. 951.
— Davidii Fr. 400, II. 948.
— deductum Greene II. 952.
— desmocarpum Hk. et Th. 405.
— diacantha Pall. 406, II. 944.
— dikuscha Fisch. 421, II **953.**
— distans Jancz. 406, II. **945.**
— — japonicum Jancz. II. 945.
— — manchuricum Jancz. II. 945.
— divaricatum Dougl. 415, II. 950.
— — × gracile 951.
— — × grossularia II. 951.
— — × niveum 409, 948.
— domesticum Jancz. 401.
— erythrocarpum Cov. et L. II. 951.
— Fargesii Fr. 400, II. 951.
— fasciculatum S. et Z. 406. II. 948.
— ferox Wall. II. 948.
— flavum Berl. II. 953.
— floridum L'Hér. 421, II. 954.
— — intermedium Jancz. 421.
— — × nigrum 421.
— Fontenayense Jancz. 414, II. **951.**
— fragrans Pall. 423, II. 953.
— Francheti Jancz. II. 948.
— fuchsioides Moc. et Ses. 409.
— fuscescens Jancz. II. 953.
— futurum Jancz. 401.
— Gayanum Steud. 420.
— Giraldii Jancz. II. 945.
— glabellum Hedl. II. 943.
— glaciale Wall. 406, II. 947.
— — Rosthornii Jancz. II. 948.
— glanduliferum Hell. II. 950
— glaucescens Eastw. II. 952.
— glutinosum Benth. 418, II. 952.
— — albidum Jancz. 418.
— — — × nigrum 418.
— Gonduini Jancz. 402.
— Gordonianum Lem. 417.
— gracile Mchx. 415, II. 950.
— — Pursh II. 951.
— — Torr. II. 950.
— — Torr. et Gr. II. 950.
— — × rotundifolium II. 951.
— graveolens Bge. II. 953.
— Griffithii Hk. et Th. 400, II. 945.
— grossularia L. 413, II. **950.**
— — glabrum Koch 413.
— — glanduloso-setosum W. Koch 413.

Ribes grossularia × nigrum 414.
— — pubescens Koch 413.
— — reclinatum Berl. 413.
— — × sanguineum 413.
— — uva-crispa Sm. 413.
— — — × oxycanthoides II. 951.
— — vulgare Jancz. II. 950.
— grossularioides Max. 413, II. 949.
— Hallii Jancz. II. 952.
— Henryi Fr. 400, II. 948.
— hesperium M. Cl. 410, II. 949.
— heterotrichum C. A. M. 405, II. 945.
— himalayense Dene. 403, II. 943.
— — appendiculatum Jancz. II. 943.
— — urceolatum Jancz. II. 943.
— — glandulosum Jancz. II. 943.
— hirtellum Mchx. 415.
— — Purpusii Koeh. II. 950.
— Hittelianum Eastw. II. 952.
— holosericeum O. et D. 403.
— Houghtonianum Jancz. 402.
— Howelli Greene 420, II. 951.
— Hudsonianum Rich. 423, II. **953**.
— — canadense Jancz. II. 953.
— — petiolare Jancz. II. 953.
— humile Jancz. II. 946.
— indecorum Eastw. II. 952.
— inebrians Ldl. 420, II. 953.
— — majus Jancz. 420, II. 953.
— — mesealerium Jancz. II. 953.
— — minus Jancz. 420.
— — Spaethianum Jancz. II. 953
— inerme Rydb. II. 950.
— innominatum Jancz. II. 951.
— integrifolium Phil. 421.
— intermedium Carr. 418.
— — Tausch 421.
— irriguum Dougl. 415, II. 950.
— japonicum Max. 422, II 953.
— jorullense Kunth 420.
— Kitaibelii Dörfl. 403.
— Koebneanum Jancz. 402.
— Kunthii Berl. II. 953.
— laciniatum Hk. et Th. 406, II. 947.
— laeustre Poir. 407.
— — horridum Jancz. 407.
— — lentum Jones 408.
— — molle Gray 408.
— latifolium Jancz. 400, II. 944.
— laurifolium Jancz. II. 948.
— laxiflorum Pursh 420, II. 951.
— leiobotrys Koeh. 417, 807.
— lentum Cov. et R. 408.
— leptanthum Gray 412, II. **949**
— — brachyanthum Gr. II. 950.
— — quercetorum Jancz. II. 950.
— leptostachyum Decne. 406.
— leucoderme Hell. II. 950.
— lithuanicum Jancz 403.
— Lobbii Gray 411, II. 948.
— longeracemosum Fr. 400, II. **945**.
— — Davidii Jancz. II. 945.
— — Wilsonii Jancz. II. 945.
— longiflorum Nutt. II. 953.
— lucidum Kit. II. 945.
— luridum Hk. et Th 406, II. 947.
Ribes macrocarpum Jancz. 401.
— malvaceum Sm. 417, II. 952.
— — × sanguineum 417.
— manshuricum Kom. 400, II. 944.
— Marshallii Greene II. 948.
— Maximowiezianum Kom. 406, II. **945**
— — japonicum C. S. II. 945.
— — manchuricum C. S. II. 945.
— — nmbrosum Kom. II. 945.
— Maximowiczii Bat. 405, II. 948.
— — Kom. 406.
— melananthum Boiss. II. 945.
— — B. et H. 405.
— Menziesii Pursh 411, II. 948.
— — amarum Jancz. 411, II. 949.
— — minus Jancz. II. 949.
— — subvestitum Jancz. 411, II. 949.
— — Victoris Jancz. II. 949.
— mescalerium Cov. 420, II. 953.
— Meyeri Max. 403, II. 943.
— — tanguticum Jancz. II. 944.
— — turcestanicum Jancz. II. 944.
— mierophyllum Kunth 412.
— migratorium Suksd. 402.
— missouriense Nutt. 415, II. 951.
— mogollonicum Greene 417, 807, II 952.
— molle How. 408.
— montigenum M. Cl. 408, 807.
— moupinense Fr. II. 944.
— — laxiflorum Jancz. II. 945.
— — lobatum Jancz. II. 945.
— — tripartitum Jancz. II. 945.
— multiflorum Kit. 404.
— — Kunth II. 953.
— — mandschuricum Max. 400.
— — × petraeum 404.
— — urceolatum Max. 404.
— — × vulgare 402.
— mupinense Fr. 400.
— nevadense Kell. 417, II. 952.
— — Jasperae Jancz. II. 952.
— nigrum L. 422, II **953**.
— — aconitifolium Kirchn. 422.
— — apiifolium Kirchn. 422.
— — europaeum Jancz. II. 953.
— — pauciflorum Jancz. II. 953.
— — pennsylvanicum Marsh. 421.
— niveum Ldl. 409, II. 951.
— — × oxyacanthoides II. 951.
— nubigenum M. Cl. 408.
— occidentale Hk. et A. 410, II. **949**
— — albidum Jancz. II. 949.
— — californicum Jancz. II. 949.
— — hesperium Jancz. II. 949
— orientale Desf. 405, II. **945**
— — genuinum Jancz. II. 945.
— — heterotrichum Hk. II. 945.
— — — Jancz. 405, II. 945.
— — melananthum Jancz. 405.
— — resinosum Jancz. II. 945.
— oxyacanthoides L. 414, II **950**.
— — irriguum Jancz. II. 950.
— — leucoderme Jancz. II. 950.
— — nevadense Jancz. II. 950.

Ribes oxycanthoides Purpusii Jancz. II. 950.
— — vagnm Jancz. II. 950.
— pachysandroides Oliv. II. 948.
— pallidum O. et D. 403.
— palmatum Desf. 417.
— palouense Elm. II. 950.
— pauciflorum Turcz. II. 953.
— pennsylvanicum Lam. 421.
— petiolare Dougl. II. 953.
— petraeum Wulf. 403, II. **944**.
— — altissimum Jancz. II. 944.
— — atropurpureum Jancz. 404, II. 944.
— — Biebersteini Jancz. 404, II. 944.
— — bullatnm Jancz. 403.
— — carpaticum Jancz. 403.
— — caucasicum Jancz. II. 944.
— — Litwinowii Jancz. II. 944.
— — × rubrum 403.
— — × vulgare 402.
— pinetorum Greene 412, II. 949.
— polyantbes Phil. 421.
— Pringlei Ht. II. 953.
— procumbens Pall. 423, II. 953.
— propinquum Turcz. 402.
— prostratum L'Hér. 420, II. 951.
— pulchellum Turcz. 407, II. 944.
— punctatum R. et P. 421.
— — Ldl. II. 945.
— purpurascens Hell. II. 952.
— Purpusii Koeh. II. 950.
— quercetorum Greene II. 949.
— reclinatum L. 413.
— recurvatum Mchx. II. 954.
— rigens Mchx. II. 951.
— robustum Jancz. II. 951.
— Roezlii Rgl. II. 949.
— Rosthornii Diels 405, II. 948.
— rotundifolium Auct. 415, II. 950.
— — Mchx. 415, II. 950, **951**.
— rubrum Auct. 401, 402.
— — L. 403.
— — asiaticum Jancz. 403, II. 943.
— — bracteosum Max. 402.
— — glabellum Trautv. II. 943.
— — hispidulum Jancz. II. 943.
— — Palczewskii Jancz. II. 943.
— — pseudopetraeum Baen. II. 943.
— — pubescens Sw. [et Jancz.] 403, II. **943**.
— — rubellum Regl. et Till. 402.
— — scandicum Jancz. II. 943.
— — subglandulosum Max. 402.
— — × vulgare 402.
— rusticum Jancz. II. 951.
— sanguineum Pursh 418, II. 952.
— — variegatum Wats. 417.
— Santa Luciae Jancz. II. 955.
— sardoum Mart. 406.
— saxatile Pall. 406.
— saximontanum E. Nels. II. 950.
— scandicum Hedl. II. 943.
— Schneideri Maur. 414.
— setchuenense Jancz. 400, II. 944.
— setosum Ldl. 413, II. 950.
Ribes Sonlieanum Jancz. 400, II. 945.
— Spachii Jancz. 419.
— Spaethianum Koeh. 420, II. 953.
— — majus Koeh. 420.
— — minus Koeh. 420.
— speciosum Pursh 409, II. 948.
— spicatum Vis. 404.
— stamineum Sm. 409.
— stenocarpum Max. 413, II. 949.
— subvestitnm Hk. II. 948.
— — Hk. et A. 411, II. 949.
— succirubrum Zbl. 409, II. 948.
— sucbeziense Jancz. II. 952.
— Suksdorfii Hell. II. 950.
— Tacare Don II. 948.
— tenue Ht. II. 945.
— — Jancz. II. 946.
— tenuiflorum Ldl. 417, II. 953.
— tomentosum Koch II. 950.
— tortuosum Bnth. II. 952.
— trifidum Mchx. II. 951.
— triflorum W. 415.
— trilobum Meyen II. 954.
— tripartitum Bat. II. 944.
— triste Pall. 402.
— tnbulosum Escb. 417.
— urceolatum Tausch 404.
— ussnriense Jancz. 421, II. 953.
— utile Jancz. II. 951.
— uvacrispa L. 413.
— variegatum Nels. 417.
— velutinum Greene 413, II. 950.
— — brachyanthum Jancz. II. 950.
— — Congdoni Jancz. II. 950.
— — Greeneanum Jancz. II. 950.
— viburnifolium Gray 421, II. 953.
— Victoris Greene 411, II. 949.
— villosum Gay II. 954.
— — Nutt. 415, II. 950.
— Vilmorini Jancz. 405, II. **946**.
— viscosissimum Pursh 418, II. 952.
— — Hallii Jancz. II. 952.
— vitifolium Host 404.
— vulgare Lam. 401.
— — macrocarpum Jancz. 401.
— — — × Warscewiczii 401.
— Warscewiczii Jancz. 400, II. 943.
— Watsonianum Koeh. 412, II. 949.
— Wilsonianum Greene 411, II. 949
— Wolfii Rothr. II. 952.
Robinia L. II. 79, II. **1010**.
— Altagana Pall. II. 97.
— ambigua Poir. II. 81.
— bella-rosea Nichols.-Mott. II. 81.
— Boyntoni Ashe II. 82, 1010.
— Caragana L. II. 95.
— chinensis Pers. II. 102.
— coloradensis Dode II. 1011.
— dubia Foue. II. 81.
— — albiflora Zab. II. 81.
— — Decaisneana Zab. II. 83.
— — formosissima Zab. II. 81.
— erbinata Mill. II. 81.
— Elliotti Ashe II. 85, 1011.
— ferox Pall II. 100.
— frutescens L. II. 103.

Robinia frutex L. II. 103.
— glutinosa Sims II. 81.
— grandiflora Ift. II. 81.
— — M. B. II. 101.
— halodendron L. II. 94.
— hispida L. II 80, 1010.
— — Camusetti Kirchn. II. 81.
— — inermis Kirchn. II. 81.
— — macrophylla DC. II. 81.
— — nana DC. II. 81.
— — rosea Pursh II. 82.
— — typica C. S. II. 81.
— — — Camusetti C. S. II. 81.
— hispido-rosea Lois. II. 81.
— Holdti Beissn. II. 84.
— — britzensis Späth II. 84.
— hybrida Audib. II. 81.
— inermis Dum. Cours. II. 83.
— intermedia Soul.-Bod. II. 81.
— jubata Pall II. 99.
— Kelseyi Cow. II. 85, 1010.
— macrophylla Schrad. II. 81.
— microphylla Pall. II. 97.
— mollis M. B. II. 102.
— myrtifolia Ht. II. 84.
— nana Spach II. 81.
— neomexicana Gray II. 84, 1011.
— — coloradensis Vilm. II. 1011.
— — × Pseudoacacia II. 84.
— pendula Ortega II. 83.
— Pseudoacacia L. II. 82, 1011.
— — amorphaefolia Loud. II. 83, 84.
— — angustifolia Dipp. II. 83.
— — — Koch. II. 84.
— — argenteo-variegata C. S. II. 83.
— — atropurpurea Dipp. II. 83.
— — aurea Kirchn. II. 83.
— — aureo-variegata C. S. II. 83.
— — bella-rosea Cow. II. 81.
— — Bessoniana Nich.-Mott. II. 83.
— — bullata Koch II. 83.
— — coluteoides Koch II. 84.
— — crispa DC. II. 83.
— — Decaisneana Carr. II. 83.
— — dissecta Nich. et Mott. II. 84.
— — fastigiata Nich. Mott. II. 83.
— — floro luteo Dum.-Cours II. 83.
— — fol. argenteo-variegatis Kirchn. II. 83.
— — fol. aureo-variegatis Kirchn. II. 83.
— — Gondouini Kirchn. II. 83.
— — heterophylla Ht. II. 83.
— — inermis DC. II. 83.
— — — Kirchn. II. 83.
— — — Rehderii Kirchn. II. 83.
— — linearis Kirchn. II. 84.
— — lutea C. S. II. 83.
— — microphylla Lodd. II. 83.
— — — Loud. II. 84.
— — monophylla Kirchn. II. 83.
— — — fastigiata Dieck II. 83.
— — — pendula Dieck II. 83.
— — myrtifolia C. S. II. 84.
— — pendula Loud. II. 83.
— — pendulifolia Kirchn. II. 83.
Robinia Pseudoacacia purpurea Dipp. II. 83.
— — pyramidalis Pép. II. 83.
— — Rozynskiana Späth II. 83.
— — semperflorens Carr. II. 83.
— — sophoraefolia Kirchn. II. 84.
— — spectabilis Cow. II. 83.
— — — Nich.-Mott. II. 83.
— — stricta Lk. II. 83.
— — tortuosa DC. II. 83.
— — — elegans Kirchn. II. 83.
— — — microphylla Kirchn. II. 83.
— — — volubilis C. S. II. 83.
— — tragacanthoides Kirchn. II. 84.
— — — dissecta C. S. II. 84.
— — Uriciana Reut. II. 83.
— — umbraculifera DC. II. 83.
— — — Rehderi C. S. II. 83.
— — — Bessoniana Cow. II. 83.
— — Uterharti Pép. II. 83.
— — × viscosa II. 81.
— — volubilis Kirchn. II. 83.
— pygmaea L. II. 102.
— rosea Lois. II. 81.
— — Mill. II. 82.
— spectabilis Dum. Cours. II. 83.
— spinosa L. II. 100.
— spinosissima Laxm. II. 100.
— tragacanthoides Pall. II. 100.
— viscosa Vent. II. 81, 1011.
— — bella-rosea Voss II. 81.
Rosa L. 536, II. 969.
— abietina Gren. 567.
— — uriensis Christ 568.
— abyssinica Br. 543.
— ecae Aitch. 584.
— acicularis Ldl. 582.
— — Engelmanni C. S. 582.
— — fennica Lall. 582, II. 972.
— — Gmelini C. S. 582.
— — nipponensis Koch. 582.
— — × pimpinellifolia 582.
— — Sayi Rehd. 582.
— aciphylla Rau 564.
— adenophora Kit. 579.
— adjecta Des. 579
— admista Burm. 559.
— aeduensis Dés. et Gil. 559.
— alfabilis Vuk. 545.
— affinis Rau 563.
— — Sternbg. 579.
— agraria Rip. 564.
— agrestis Savi 560.
— — × (arvensis × sempervirens) 544.
— — × gallica 549.
— — × micrantha 559.
— — × Pouzini 560.
— — × rubiginosa 557.
— — × spinosissima 560.
— alba L. 549.
— Alberti Rgl. 580.
— albida Kmet. 566.
— albiflora Opiz 560.
— Aldersoni Greene 574.
— algocensis Crép. 573.
— Allioni Burm. et Grem. 563.

Rosa alpestris Rap. 555.
— alpina L. 579.
— alpinoformis Hayn. 579.
— alpinoides Dés. 566.
— altaica W. 584.
— amblyphylla Rip. 565.
— amiliavensis Coste et Sim. 564.
— amoyensis Hance 538.
— andegavensis Bást. 564.
— Andrzeiovi Stev. 554.
— anemonaeflora Fort. 541.
— anisopoda Christ 549.
— anserinaefolia Boiss. 573.
— apennina Woods 561.
— apricorum Rip. 556.
— arduennensis Crép. 554.
— arkansana Port. 581, II. 971.
— arkansanoides C. S. II. 971.
— — alba C. S. II. 971.
— armasissima Dés. et Rip. 564.
— arvatica Pug. 560.
— arvensis Huds. 545.
— — bibracteata Ser. 545.
— — brevistyla Gelmi 545.
— — × chinensis 545.
— — × gallica 545.
— — ruga Ht. 545.
— — × tomentosa 545.
— Aschersoniana Graeb. 546.
— aspera Schleich 559.
— asperifolia Borb. 566.
— assurgens Vuk. 545.
— atrovirens Viv. 544.
— Aunieri Car. 549.
— australis Pug. et Rip. 562.
— austriaca Crtz. 547.
— Axmanni Gmel. 545.
— baicalensis Turcz. II. 972.
— balsamea Kit. 579.
— Banksiae R. Br. 547.
— — × laevigata 547.
— Beatricis B. et Gr. 563.
— Beggeriana Kell. 572.
— beluensis Ozan. 560.
— bengalensis Pers. 546.
— berberifolia Pall. 537.
— Bernardi Mont. 556.
— Berneti Schmidel. 566.
— bibracteata Bast. 545.
— bicolor Jacq. 584.
— Billieti Pug. 559.
— blanda Ait. 577.
— — arkansana Best 581.
— — × carolina 570.
— — Solandri C. S. 577.
— — typica C. S. 577.
— — × virginiana 570.
— Blondaeana Rip. 564.
— bohemica Braun 560.
— Boraeana Bér. 545.
— Boreykiana Bess. 549.
— Bourgeauiana Crép. 582.
— Bouvieri Crép. 559.
— Bovernieriana Lagg. et Del. 566.
— Brachti Braun 565.
— bracteata Wendl. 586.
Rosa Brauni Kell. 556.
— Bridgesi Crép. 578.
— britzensis Koch. II. 969.
— Brueggeri Kil. 551.
— Brunoni Ldl. 543, II. 969.
— Bungeana B. et B. 585.
— burmiensis Cornaz 568.
— cabulica Boiss. 573.
— caesia Bak. 565.
— calabrica Hut. 557.
— calendularum Borkh. 549.
— californica Ch. et Schl. 574.
— — × nitida 572.
— — × rugosa 574.
— — ultramontana Wats. 579.
— campicola Br. 566.
— canina L. 564.
— — × gallica 549.
— — × Jundzilli 550.
— — × rubrifolia 551.
— — × spinosissima 564.
— capnoides Kern. 555.
— carelica Fries 582.
— Carioti Chab. 564.
— carolina L. 568.
— — × humilis 570.
— — × rugosa 570.
— — × virginiana lucida 570.
— caroliniana Mchx. 570.
— caryophyllacea Bess. 561.
— — Christ 567.
— — typica flavescens Kmet 560.
— caviniacensis Ozan. 560.
— centifolia L. 547.
— — bilera Poir. 549.
— cerasifera Timb.-Lagr. 566.
— Chaberti Dés. 549.
— chavini Rap. 567.
— cherokeensis Donn 588.
— chinensis Jacq. 546.
— — × blanda 546.
— (× damascena)× spinosissima 546
— — fragrans Mouillef. 546.
— — — viridiflora C. S. 546.
— — indica Koch. 546.
— — × moschata 543.
— — × multiflora 540.
— — × pendulina 546.
— — × rugosa 546.
— — semperflorens Koch 546.
— — — minima Curt. 546.
— — — viridiflora Dipp. 546.
— — × sempervirens 544.
— chlorocarpa Fzl. et H. Br. 542.
— chlorophylla Ehrh. 584.
— Christi Wiesb. 549.
— — M. Schulze 548.
— ciliatopetala Pers. 554.
— cimelium Kmet' 549.
— cimerosa Dés. 565.
— cinerascens Cariot 565.
— — Dum. 555.
— cinerea Rap. 566.
— cinnamomea L. 573, 579.
— — davurica Mey. 578.
— — foecundissima Koch 574.

Rosa cinnamomea fulgens Christ 574.
— — × gallica 549.
— — × rugosa 574.
— clinophylla Thory 587.
— — × moschata 544.
— — × persica 537.
— Colletti Crép. 540.
— collina Lam. et DC. 565.
— collina Jacq. 549.
— collivaga Cott. 555.
— comosa Rip. 556.
— comosella Dés. et Oz. 556.
— complicata Gren. 565.
— condaminea Burn. 560.
— conferta Pug. 568.
— consanguinea Gren. 549.
— coriifolia Fries 566.
— — × gallica 549.
— — × pendulina 566.
— — × tomentella 563.
— coronata Crép. 556.
— coruscans Waitz II. 972.
— corylifolia Vuk. 545.
— corymbosa Ehrh. 569.
— Costeana Hy 549.
— Costei Duff. 544.
— Cotteti Pug. 555.
— croatica Kit. 579.
— cujavica Spirih. 555.
— cymellifolia Borh. et Vuk. 545.
— cymosa Tratt. 538.
— dalmatica Kern. 557.
— damascena Mill. 549.
— — × rugosa 550.
— — trigintipetala Dieck 550.
— — variegata Kel. 549.
— Davidi Crép. 574.
— — pungens Focke 574.
— — subinermis Focke 574.
— davurica Pall. 578.
— decipiens Bor. 545.
— dematranea Lag. et Pug. 567.
— densa Timh.-Lagr. 556.
— Déséglisei Bor. 565.
— dimorphacantha Mart. 556.
— dimorphocarpa Borb. 566.
— diversifolia Vent. 546.
— doljensis Borh. et Vuk. 545.
— dolorosa Dés. et Oz. 556.
— Doniana Woods 556.
— dryadea Rip. 549.
— Duffti Schulze 549.
— dumalis Bechst. 564.
— dumetorum Thuill. 565.
— — × gallica 549.
— dumosa Pug. 555.
— Ecae Aitch. 584, II. 973.
— echinocarpa Rip. 556.
— echinoclada Boull. 549.
— edita Dés. 564.
— eglanteria L. 556, 584
— — punicea Réd. II. 972.
— elliptica Tausch 558.
— — × glauca 559.
— — × ruhiginosa 557.
— — × spinosissima 559.
Rosa elliptica × tomentosa 555.
— elymaitica Boiss. et H. 553.
— Engelmanni Wats. 582.
— euvestita Borh. 555.
— exilis Crép. 564.
— farinosa Bechst. 555.
— farinulenta Crép. 555.
— fasciculiflora Bull. 545.
— fastigiata Bast. 562.
— Fedschenkoana Rgl. II. 970.
— Fendleri Crép. 577.
— ferox Lawr. 582.
— — M. B. 560.
— ferruginea Vill. 551.
— Fischeriana Ht. II. 969.
— — Lk. II. 969.
— foecundissima Münchh. 574.
— — Bast. 555.
— — Gren. 567.
— foetida Herrm. 584.
— foliolosa Nutt. 570, II. 969.
— formosula Gren. 549.
— Fortuniana Ldl. et Paxt. 547.
— Fourraei Dés. 545.
— fragrans Th. et R. 546.
— francofurtana Borkh. 549.
— Franzoni Christ 553.
— fraxinea W. 570.
— fraxinifolia Gmel. 577.
— Freundiana Graeh. II. 969.
— frihurgensis Lag. et Pug. 553.
— Friedlaenderiana Bess. 549. 563.
— Friesii Lag. et Pug. 566.
— frutetorum Bess. 566.
— gallica L. 547.
— — centifolia Crép. 547.
— — — muscosa Ser. 547
— — eriostyla Kel. 547.
— — × glauca 549.
— — × Jundzilli 548.
— — leiostyla Gelmi 547.
— — × micrantha 549.
— — × moschata 544, 549.
— — × multiflora 540.
— — × Noisettiana 543.
— — × omissa 548.
— — × ruhiginosa 549.
— — × tomentella 549.
— — × tomentosa 549.
— — vittata Ilt. 544.
— Gehleriana Schrenk 573.
— geminata Rau 545.
— genevensis Pug. 549.
— gentilis Dés. 579.
— — Sternbg. 579.
— gigantea Coll. 545.
— Gilloti Dés. et Luc. 555.
— Gisleri Pug. 555.
— gizella Borb. 560.
— glaberrima Dum. 564.
— glahrifolia Rupr. II. 969.
— glandulosa Bell. 579.
— — Bess. 550.
— glauca Pour. 551.
— — Vill. 565.
— — × glutinosa 558.

Rosa glauca × montana 566.
— — × omissa 555.
— — × pendulina 566.
— — × Pouzini 564.
— — × rubrifolia 551.
— — × (spinosissima × tomentosa)556.
— — × tomentosa 555.
— — × villosa 554.
— glaucescens Desv. 564.
— — Wull. 551.
— globata Dés. 565.
— glutinosa S. et Sm. 557.
— — dalmatica Kel. 557.
— Gmelini Bge. 582.
— gombensis Pug. 554.
— granensis Kmet' 563.
— gratissima Greene 575.
— graveolens Gren. 559.
— Graveti Crép. 565.
— Gremlii Christ 556.
— Gronieri Dés. 553.
— Guepini Dés. 549.
— Gulielmi-Waldemari Kl. 576.
— gutensteinensis Jacq. 551.
— gymnocarpa Nutt. 575.
— — pubescens Wats. 575.
— Halacsyi Braun 563.
— Hampeana Griseb. 550.
— Hampeliana Wiesb. 555.
— Hardi Paxt. 537.
— Hawrana Kmet' 555.
— Heckeliana Tratt. 552.
— Hedevigae Blocki 555.
— Heimerli Braun 549.
— hemisphaerica Herrm. 585.
— Herculis Borb. 555.
— heteracantha Kar. et Kir. 584.
— hibernica Sm. 564.
— hirtifolia Br. 566.
— Hirziana Braun 559.
— hispida Sims II. 972.
— hispidula Rip. 564, 565.
— hispanica Boiss. et Reut. 564.
— Hollmeisteri Klotzsch 576.
— bolikensis Kmet' 579.
— Hookeriana Wall. 576.
— horrida Fisch. 560.
— hudsonica Red. 569.
— Hugonis Hemsl. II. 973.
— humilis Marsh. 570.
— hungarica Kern. 559.
— hybrida Schleich. 545.
— hystrix Leman 559.
— ilseana Crép. 551.
— immitis Dés. 562.
— incana Kit. 566.
— incanescens Br. 566.
— inclinata Kern. 565.
— inconsiderata Dés. 564.
— indica Focke 546.
— — L. 538.
— — Ldl. 546.
— — Lawrenceana Ldl. 546.
— inodora Hook. 563.
— infesta Kmet' 549.
— inermis Roxb. 547.
Rosa inodora Fries 560.
— insidiosa Rip. 549.
— intercalaris Dés. 579.
— intermedia Carr. 540.
— intricata Gren. 565.
— intromissa Crép. 555.
— involucrata Roxb. 587.
— involuta Sm. 556.
— iwara Sieb. 540.
— — yesoensis Fr. et Sav. II. 969.
— jaluana Kom. II. 970.
— Jordani Désgl. 559.
— Jundzilli Bess. 550.
— — × tomentosa 550.
— Jundzilliana Bess. 550.
— Kabathi Ans. 549.
— kalksburgensis Wiesb. 545.
— Kerneri Br. 566.
— Kluki Bess. 559.
— — Gren. 549.
— Kmetiana Borb. 566.
— Kochiana Koch. 570.
— koreana Kom. II. 972.
— Kosinsciana Bess. 549.
— Kotschyana Boiss. 573.
— lacerans B. et B. 573.
— lactiflora Dés. 559.
— laevigata Mchx. 588.
— lagenaria Vill. 579.
— Laggeri Pug. 567.
— lancifolia Small 569.
— lantoscana Bur. et Gren. 559.
— latispina Boiss. 573.
— laxa Retz. 573.
— — pubescens C. A. M. 573.
— laxiflora Borb. 564.
— Leschenaultiana W. et A. 543.
— Lehmanniana Bge. 573.
— Lereschii Rip. 566.
— leucantha Bast. 563.
— leucochroa Desv. 562.
— Leveillei Boull. 549.
— libanotica Boiss. 557.
— livida Host 551.
— Lloydi Dés. 549.
— longicuspis Bert. 543.
— Luciae Fr. et R. 541, II. 969.
— lucida Ehrh. 570.
— lugdunensis Dés. 559.
— lutetiana Lem. 564.
— lutea Mill. 584.
— — bicolor Curt. II. 972.
— — punicea Asch. et Gr. 584, II. 972.
— — × rubiginosa 557.
— — × spinosissima 584.
— lutescens Pursh II. 972.
— Lyelli Ldl. 544.
— Maasi Schulze 557.
— macartnea Dum. 586.
— Macdougali Hols. 577.
— Macouni Greene 577.
— macrocarpa Boiss. 549.
— macrophylla Ldl. 575.
— majalis Herrm. 574.
— Malyi Kern. 579.
— manca Greene 581.

Rosa Marcyana Boull. 549.
— marginata Rap. 555.
— Mariae-Graebneriae Asch. 570.
— maritima Gren. 565.
— massilvanensis Org. et D. 502.
— Matbonnati Crép. 583.
— Maureri Scbulze 555.
— Maximiliana Nees 577.
— Maximowicziana Rgl. 541.
— medioxima Dés. 564.
— melanocarpa Link 583.
— melina Greene 574.
— meridionalis Bur. et Gren. 559.
— micans Dés. 555.
— micrantha Sm. 559.
— — × rubiginosa 557.
— microcarpa Bess. 584.
— — Ldl. 538.
— microphylla Roxb. 588.
— — × rugosa II. 972.
— microtypos Borb. et V. 545.
— microsa Henk. II. 972.
— minutifolia Engelm. 586.
— mitis B. et B. 573.
— mitissima Gmel. 584.
— mollis Sm. 554.
— — × spinosissima 554.
— — × tomentosa 554.
— mollissima Fries 554.
— montana Chaix 568.
— — chavini Christ 567.
— — × rubiginosa 557.
— moschata Mill. 542.
— — × multiflora 540.
— — nastarana Christ 542.
— — yunnanensis Crép. 543.
— Moyesii Hemsl. et W. II. 970.
— multiflora Thbg. 540.
— — platypbylla Thor. et R. 540.
— — × rugosa 540, II. 969.
— — × sempervirens 540.
— Mureti Rap. 566.
— Murithi Pug. 553.
— muscosa Ait. 547.
— myriacantha Lam. et DC. 584.
— myrtilloides Tratt. 564.
— Naumanni Schulze 550.
— neglecta Bruhin 570.
— nemorosa Lib. 559.
— nitens Desv. 564.
— nitida W. 571.
— nivea DC. 588.
— Noisettiana Red. 543.
— nnmmulifolia Vuk. 545.
— nutkana Presl 577.
— — bispida Fern. 577.
— Nuttaliana Ht. II. 969.
— Obornyana H. Br. 563.
— obtusifolia Desv. 563.
— oligacantha Borb. 545.
— omissa Dés. 554.
— — × pendulina 555.
— — × spinosissima 555.
— operta Pug. 559.
— oreades Cott. et Cast. 564.
— oreopbila Rydb. 574.
Rosa orientalis Dup. 551.
— oxyacantha M. B. 582.
— oxyacantbos Koch 570.
— Ozanoni Dés. 579.
— Pacheri Kell. 566.
— palustris Marsh. 569.
— parviflora Ehrh. 570.
— parvula Sauz. et M. 562.
— patens Kmet' 566.
— pendulina L. 579.
— — × ruhiginosa 557.
— — × rubrifolia 551.
— — × spinosissima 579.
— — × tomentosa 555.
— — × villosa 554.
— pennsylvanica Mich. 569.
— permiscibilis Schmid. 566.
— permixta Dés. 559.
— perparva Borb. 559.
— Perrieri Soug. 566.
— persica Mich. 537, II. 969.
— personata Rip. 549.
— petropbila Borb. 555.
— pboenicea Boiss. 542.
— — chlorocarpa Crép. 542.
— — typica C. S. 542.
— pimpinellifolia L. 583.
— pinetorum Hell. 575.
— pisocarpa Gray 578.
— platyacantha Schrenk 584, II. 973.
— platypbylla Rau 565.
— Pliniana Corn. 568.
— podolica Tratt. 564.
— Polliniana Sprgl. 545.
— polyacantha Borb. 559.
— polyadena Bur. et Grem. 563.
— polyantha Ht. 540.
— — S. et Z. 540.
— — grandiflora Ht. 540.
— pomifera Herrm. 553.
— poteriifolia Bess. 584.
— Pouzini Tratt. 563.
— pratincola Greene 581, II. 971.
— — H. Br. II. 972.
— — alba Rehd. II. 971.
— prostrata DC. 544.
— protea Rip. 549.
— protogenes Ozan. 579.
— provincialis M. B. 560.
— pseudocorymbifera Rouy 502.
— pseudoglauca Pinkw. 559.
— pseudomontana Kell. 565.
— pseudopsis Gremli 566.
— pseudosepium Callay 560.
— pulchella Sebtt. et Ky. 552.
— pulverulenta M. B. 557.
— pumila Jacq. 547.
— punicea Mill. 584.
— pustulosa Bert. 557.
— pyrenaica Gouan 579.
— pyriformis Dés. 565.
— rameatis Pug. 565.
— Rapa Bosc II. 969.
— Rapini B. et B. 585.
— Ravaudi Boull. 568.
— reclinata Thory 546.

Rosa recondita Pug. 553.
— Regeli Reut. 573.
— Regeliana André 582.
— repens Scop. 545.
— resinosa Sternhg. 553.
— resinosoides Crép. 555.
— Reuteri God. 566.
— reversa Kit. 579.
— rhaetica Gremli 566.
— rhombifolia Boull. 545.
— Riparti Dés. 584.
— rotundifolia Rchb. 556.
— rubescens Rip. 564.
— rubicunda Hall. 551.
— rubifolia R. Br. 542.
— rubiginella Br. 556.
— rubiginosa L. 556.
— — cretica Ser. 557.
— — × spinosissima 557.
— — × tomentella 557.
— rubrifolia Vill. 550.
— — × spinosissima 551.
— rubispina Bosc 572.
— rugosa Thbg. 582.
— rupestris Crtz. 579.
— ruscinonensis Dés. et Gr. 543.
— rusticana Dés. 562.
— sabauda Rap. 556.
— Sabini Woods 556.
— salaevensis Rap. 566.
— salvanensis de la Soie 559.
— sanguisorbella de la Soie 557.
— Sauzeana Boull. 580.
— saxetana H. Br. 566.
— Sayi Schweinitz 582.
— scabrata Crép. 564.
— scabriuscula Sm. 555.
— scandens Mill. 544.
— Scharnkeana Graeb. 572.
— schemnitzensis Kmet' 566.
— Schultzii Rip. 564.
— sclerophylla Scheutz 563.
— scotinophylla Boull. 549.
— semiglabra Rip. 565.
— semperflorens Curt. 546.
— sempervirens L. 544.
— — S. et Z. 541.
— — brachystyla A. et Gr. 544.
— — microphylla DC. 544.
— — prostrata Desv. 544.
— — scandens DC. 544.
— — typica A. et Gr. 544
— — — scandens C. S. 544.
— senticosa Achar. 564.
— sepioides Ozan. 560.
— sepium Thuil. 560.
— septicola Dés. 559.
— Serafini Christ 557.
— — Viv. 561
— Seraphini Guss. 537.
— sericea Ldl. 586.
— — pteracantha Fr. II. 973.
— setigera Rich. 542.
— sicula Tratt. 557.
— Silverhjelmi Schrenk 573.
— silvestris Herrm. 545.
Rosa Simkowiczi Kmet' 580.
— simplicifolia Salisb. 537.
— sinica Ldl. 588.
— Solandri Tratt. 577.
— solstitialis Bess. 565.
— songarica Bge. 573.
— sonomensis Greene 578.
— Souliéana Crép. 544, II. 969.
— Spaethiana Graeb. 570.
— sphaerocarpa Dés. 565.
— spinosissima L. 583.
— — hispida Koch. II. 972.
— — × tomentosa 556.
— — × villosa 554.
— — × virginiana 570.
— spinulifolia Dematra 555.
— spithamaea Wats. 578.
— — sonomensis Crép. 578.
— squarrosa Rau 564.
— stellata Woot. 586.
— stenosepala Christ 566.
— stylosa Desv. 561.
— subalbida Vuk. 545.
— subcinerea Gent. 565.
— subdola Dés. 549.
— subglobosa Sm. 555.
— submissa Vuk. 545.
— submitis Gren. 565.
— subrepens Borb. et V. 545.
— Süfferti Kirschl. 555.
— suffulta Greene 581.
— sulphurea Ait. 585.
— superba J. Kern. et Kell 549.
— Sweginzowii Koch. II. 969.
— sylvicola Dés. et Rip. 549
— syntrichostyla Rip. 564
— systyla M. et K. 562.
— sytnensis Kmet' 555.
— Szaboi Borb. 559.
— tenella Boull. 545.
— ternata Poir. 588.
— tetrapetala Royle 586.
— therebintinacea Bess. 549.
— Thomasi Pug. 567.
— Thureti Burn. et Grem. 557.
— thyrsiflora Leroy 540.
— Timeroyi Chab. 549.
— tirolensis Kern 563.
— tomentella Lem. 560.
— tomentosa Sm. 555.
— — mollissima Dum. 554.
— Touranginiana Dés. 564
— trachyphylla Rau 550.
— transiens Kern. 565.
— transmota Crép. 549.
— tredecim-arborum Bus. 555.
— triphylla Roxb. 451.
— tunquinensis Crép. 541.
— turbinata Ait. 549.
— ultramontana Hell. 579.
— umbellata Leers 556.
— unguicularis Bert. 581.
— Unterwoodi Rydh. 574.
— uriensis Lag. et Pug. 568.
— vagiana Crép. 566.
— Vaillantiana Borb. 559.

Rosa Vaillantiana Cariot 559.
— Vanheurckiana Crép. 552.
— venensis Kern. 564.
— vestita God. 555.
— Villarsiana Sieb. 580.
— villosa L. 553.
— — mollissima Rau 554.
— — pomifera Desv. 553.
— vinealis Rip. 564.
— vinodora Kern. 560.
— virginea Rip. 562.
— virginiana Auct. 577.
— — Dnr. 569.
— — Mill. 570.
— — humilis C. S. 570.
— — lucida Best 570.
— — villosa Best 570.
— Solandri Koch. 577.
— virgultorum Dés. 560.
— Waitziana Rchb. 549.
— — Tratt. 549.
— Wallichi Tratt. 586.
— wasserburgensis Kirschl. 555.
— Watsoniana Crép. 541.
— Webbiana Wall. 581.
— Wichurae Koch 540.
— Wichuraiana Crép. 540, II. 969.
— Wiegmanni Schulze 549.
— Willdenowi Sprg. 578.
— Willmottiae Hemsl. II. 971.
— Wilsoni Borr. 556.
— Woloszczaki Kell. 565.
— Woodsi Ldl. 577.
— xanthina Ldl. 584.
— yesoensis Mak. II. 969.
— Zabeli Crép. 555.
— Zalana Wiesb. 561.
Rosmarinus L. II. 600.
— latifolius Mill. II. 600.
— officinalis L. II. 600.
— — latifolius Briqu. II. 600.
Rottlera japonica Spreng. II. 134.
Rubacer odoratus Small 506.
Rubia cordata Thbg. II. 629.
— cordifolia L. II. 629.
Rubus L. 503, II. 962.
— aceroides Miq. 504.
— adenopborus Rolfe II. 968.
— allegheniensis Port. 518, II. 968.
— amabilis Focke II. 967.
— argutus Link 520.
— armeniacus Focke 516.
— asper Wall. II. 967.
— australis Forst. 514.
— Baileyanus Britt. 520.
— bambusarum Focke 506, II. 965.
— bellidiflorus Koch 516.
— betulifolius Small 520.
— biflorus Buch. 513.
— Buergeri Miq. II. 965.
— caesius × Idaeus vulgatus 511.
— canadensis Auct. 520.
— — L. 519.
— — invisus Bail. 520.
— — roribaccus Bail. 520.
— canescens DC. 517.
Rubus caucasicus Focke 517.
— chroosepalus Focke 506, II. 963.
— columbianus Rydb. 506.
— Commersoni Poir. 514, II. 967.
— — simpliciflorus Mak. II. 967.
— coptophyllus Gr. 507.
— corchorifolius L. 507, 967.
— — Oliveri Focke 507.
— — glaber Matsm. 507.
— coreanus Miq. 514.
— crataegifolius Bge. 507.
— cuneifolius Pursh 515.
— deliciosus James 504.
— Dielsianus Focke II. 963.
— discolor Wh. et N. 516.
— Enslenii Tratt. 521.
— eriocarpus Liebm. 511.
— eugenius Focke II. 963.
— flagellaris W. 521.
— flagelliflorus Focke II. 964.
— flagelliformis Ht. II. 964.
— floridus Tratt. 518.
— foliolosus Don 513.
— frondosus Big. 519.
— fruticosus fl. alb. pl. Ht. 516.
— — fl. ros. pl. Ht. 516.
— glandulosus canescens Boiss. 517.
— glaucifolius Kell. 511.
— glaucus Benth. 511.
— Grossularia L. et V. II. 967.
— hedycarpus Focke 517.
— Henryi Hemsl. 506, II. 965.
— hispidus L. 521.
— Hoffmeisterianus Kth. et B. 513.
— hupehensis Oliv. II. 963.
— hydrastifolius A. Gr. 504, II. 965.
— hypargyrus Edgew. 513.
— ichangensis Hemsl. et K. II. 963.
— Idaeus L. 509.
— — anomalus Arrh. 510.
— — exsucca Fr. et S. 511.
— — maritimus Arrh. 510.
— — melanolasius Focke 510.
— — melanotrachys Focke 510.
— — nipponicus Focke 510.
— — × odoratus 506.
— — × pboenicolasius II. 967.
— — — × leucodermis 511.
— — — × occidentalis 510.
— — strigosus Focke 510.
— — × triphyllus II. 967.
— — viridis Doell. 510.
— — vulgatus Arrh. 510.
— — — angustifolius Schmid. 510.
— — — denudatus Sch. et Sp. 510.
— — — fr. luteis Focke 510.
— — — luteofructifer C. S. 510.
— — — maritimus Focke 510.
— — — obtusifolius Focke 510.
— — — × occidentalis 511.
— — — phyllanthus Lge. 510.
— — — semperflorens Focke 510.
— — — × spectabilis 508.
— — — strobilaceus Focke 510.
— illecebrosus Focke 514.
— incisus Thbg. 507, II. 967.

Rubus innominatus Ht. II. 967.
— — S. Moore II. 968.
— invisus Bail. 520.
— irenaeus Focke 506, II. 965.
— japonicus L. 502.
— keriifolius Lév. et Vt. II. 967.
— Koehneanus Focke II. 967.
— Kuntzeanus Hemsl. II. 967.
— laciniatus W. 517.
— lasiocarpus Sm. 514.
— — rosaefolius Hk. 514.
— lasiostylus Focke 506, II. 965.
— Leesii Bab. 510.
— leucodermis Dougl. 511.
— — Ir. lut. Purp. 511.
— Linkianus Ser. 516.
— macropetalus Dougl. 508.
— macropodus Ser. 513.
— macrostemon Focke 517.
— malifolius Focke 507, II. 963.
— Menziesi Hk. 508.
— Millspaughi Britt. 520.
— morifolius Ht. 507.
— myriadenus Lév. et Vt. II. 967.
— neglectus Peck 510.
— neo-mexicanus Gr. 504.
— nigrobaccus Bail. 518, II. 968.
— nivalis Dougl. 506.
— niveus Thbg. 514.
— — inopertus Focke 514.
— nobilis Rgl. 506.
— nutkanus Moç. 504.
— — velutinus Brew. 505.
— obovalis Mchx. 521.
— occidentalis L. 511.
— — exsuccus Mak. II. 967.
— — flavobaccus Blanch II. 967.
— — japonicus Miyab. 511, II. 967.
— — leucodermis Hk. 511.
— — pallidus Bail. II. 967.
— odoratus L. 505.
— — albus Zbl. 505.
— — columbianus Millsp. 506.
— omeiensis Rolfe II. 964.
— ostryifolius Rydb. 518.
— pacatus Focke 506.
— pacificus Hance 506.
— palmatus Thbg. 506.
— paniculatus Schlcht. 516.
— Parkeri Hance II. 964.
— parvifolius Auct. 513.
— parviflorus Nutt. 504.
— — velutinus Greene 505.
— Paxii Focke II. 967.
— peltatus Max. 507.
— pennsylvanicus Poir. 510.
— persicus Boiss. 517.
— persistens Rydbg. 521.
— phoenicolasius Max. 508.
— Playfairianus Hemsl. II. 965.
— Playfairii Hemsl. II. 965.
— platyphyllus Koch 517, II. 968.
— polytrichus Fr. II. 965.
— procumbens Mühlhg. 520.
— pubescens Weihe 516.
— purpureus Bge. 513.
Rubus Raddeanus Focke 517.
— rhodophyllus Rydb. 520.
— ribesifolius A. Cunn. 513.
— ribifolius S. et Z. 504.
— Roezlii Rgl. 504, II. 963.
— roribaccus Rydb. 520.
— rosaefolius Sm. 513, II. 967.
— — sorbifolius Mak. II. 967.
— — coronarius Sm. 514.
— rubrisetus Rydbg. 521.
— rusticanus Merc. 516.
— sagatus Focke II. 968.
— sinensis Ht. 514.
— sorbifolius Max. 514, II. 967.
— sozostylus Focke II. 965.
— spectabilis Pursh 507.
— — Mensiesi Wats. 508.
— strigosus Mchx. 510.
— subuniflorus Rydb. 520.
— Sweginzowianus Siv. II. 967.
— taiwanisnus Mats. 514.
— tephrodes Hance II. 963.
— thibetanus Fr. II. 967, 1065.
— trianthus Fcke. II. 967.
— trifidus Thbg. 504, II. 965.
— trilobus Moç. et S. 504.
— triphyllus Thbg. 513, II. 967.
— trivialis Mchx. 521.
— ulmifolius Schott 516.
— — anatolicus Focke 516.
— — bellidiflorus Focke 516.
— ursinus Ch. et Schl. 508.
— Veitchii Rolfe II. 967, 968, 1065.
— velutinus Hk. et A. 505.
— villosus Ait. 520.
— — Auct. 518.
— — Thbg. 507.
— — frondosus Torr. 519.
— — bumifusus T. et Gr. 521.
— vitifolius Cb. et Schl. 508.
— vulgaris Wb. et N. 517.
— — laciniatus Dipp. 517.
— xanthacantha Lév. II. 967.
— Zahlbrucknerianus Endl. 513.
Ruscus L. II. 861.
— aculeatus L. II. 861.
— — angustifolia Boiss. II. 861.
— — laxus A. et Gr. II. 861.
— androgynus L. II. 861.
— hypoglossum L. II. 862.
— hypophyllum L. II. 862.
— — hypoglossum Bak. II. 862.
— laxus Sm. II. 861.
— hyrcanus Wor. II. 862.
— racemosus L. II. 860.
Ruta L. II. 122.
— graveolens L. II. 123.
Salicornia L. 266.
— europaea fruticosa L. 266.
— fruticosa L. 266.
— glauca Del. 265.
— macrostachya Moric. 265.

Salix L. 23, II. 870.
— acuminata Koch 46.

Salix acuminata Mill. 58.
— — Patze 45.
— — Sm. 46.
— acutifolia W. 44.
— — × cinerea 45.
— — × (cinerea × viminalis) 45.
— — × stipularis 45.
— adenophylla Hook. 52, II. 871.
— alba L. 35.
— — × amygdalina 32.
— — argentea Wim. 36.
— — × babylonica 36.
— — coerulea W. Koch 36.
— — × fragilis 33.
— — × pentandra 30.
— — splendens And. 36.
— — typica C. S. 36.
— — — splendens C. S. 36.
— — vitellina Ser. 36, II. 871.
— — — britzensis Späth 36.
— — — pendula C. S. 36.
— — — × babylonica II. 871.
— albicans Bonj. 60.
— alopecuroides Tausch 31.
— alpigena Kern. 39.
— alpina Scop. 42.
— ambigua Ehrh. 63.
— americana pendula Ilt. 69.
— amplexicaulis Bor. et Ch. 69.
— amygdalina L. 30.
— — angustifolia Ser. 30.
— — × cinerea 32.
— — × fragilis 31.
— — × pentandra 30.
— — × purpurea 32.
— — Villarsiana Wim. 31.
— — × viminalis 32.
— — vulgaris Wim. 30.
— — — concolor Wim. et Grab. 30
— — — discolor Wim. et Grab. 30.
— angustata Pursh 52.
— angustifolia Ilt. 67.
— — W. 68.
— — Wulf. 65.
— — microstachya And. 68.
— — typica C. S. 68.
— angustissima Wim. 46.
— appendiculata Vill. 60.
— arbuscula L. 56.
— — erecta And. 55.
— — — angustifolia And. 55.
— — — grandifolia And. 55.
— — — ovalifolia And. 55.
— — — Waldsteiniana C. S 55.
— — foetida W. Koch 55.
— — × glauca 41.
— — × grandifolia 56.
— — × hastata 52.
— — × helvetica 49.
— — × herbacea 40.
— — humilis And. 55.
— — × myrtilloides 56.
— — × nigricans 54.
— — × reticulata 40.
— — × retusa 40.
— — Waldsteiniana Koch 55.

Salix arctica Pall. 41.
— arenaria L. 65.
— — Sm. 48.
— — helvetica W. 49.
— argentea Sm. 65.
— arguta And. 29.
— argyrophylla Nutt. 33.
— Aschersoniana Seem. 62.
— asplenifolia Ht. 67.
— attenuata Kern. 62.
— aurea Ilt. 36.
— aurita L. 61.
— — × bicolor 56.
— — × caprea 62.
— — × cinerea 62.
— — × cinerea × viminalis 46.
— — cordifolia Wim. 61.
— — × grandifolia 62.
— — × herbacea 40.
— — × incana 63.
— — × lapponum 49.
— — × livida 62.
— — × myrsinites 43.
— — × myrtilloides 63.
— — × nigricans 54.
— — oblongifolia Kern. 61.
— — × phylicifolia 56.
— — × purpurea 63.
— — × repens 63.
— — rhomboidalis Wim. 61.
— — × silesiaca 62.
— — spathulata Wim. 61.
— — typica Beck 61.
— — — cordifolia C. S. 61.
— — — heterophylla C. S. 61.
— — — rhomboidalis C. S. 61.
— — — uliginosa C. S. 61.
— — uliginosa Wim. 61.
— — × viminalis 46.
— auritoides Kern. 63.
— Ausserdorferi Hut. 39.
— australior Anders. II. 871.
— austriaca Host 62.
— babylonica L. 36.
— — annularis Aschers. 36.
— — × fragilis 34.
— — japonica And. 50.
— — × nigra II. 870.
— balsamifera Barr. 57.
— Barclayi And. 51.
— Bebbiana Sarg. 61.
— bicolor Ehrh. 55.
— — × caprea 55.
— — × — × cinerea 56.
— — × — × daphnoides 44.
— — × daphnoides 44.
— — × hastata 52.
— — × nigricans 54.
— — × repens 56.
— — × retusa 40.
— — × silesiaca 55.
— bifax Wolosz. 52.
— bigemmis Hoffm. 44.
— blanda And. 34.
— Bravi Ledeb. 37.
— buxifolia Schleich. 39.

Salix caesia Vill. 67.
— — × cordata II. 871.
— — × hastata 52, II. 871.
— — minutiflora Turcz. 68.
— — × nigricans 54.
— candida Flueg. 47.
— calliantha Kern. 45.
— calodendron Wim. 46.
— canthiana Kern. 46.
— caprea L. 60.
— — aurigera Schur 60.
— — × cinerea 62.
— — × — × viminalis 45.
— — × daphnoides 44.
— — × — pulchra 44.
— — × dasyclados 46.
— — elliptica Kern. 60.
— — × grandifolia 62.
— — × incana 62.
— — × lappanum 49.
— — × livida 62.
— — × myrsinistes 43.
— — × nigricans 54.
— — orbiculata Kern. 60.
— — × purpurea 62.
— — × repens 62.
— — × silesiaca 62.
— — × viminalis 46.
— capreiformis Wim. 46.
— capreola And. 62.
— capnoides Kern. 62.
— caspica Ilt. 44.
— chlorophana And. 52.
— chlorophylla And. 42.
— — typica C. S. 42.
— — vestita And. 42.
— chrysocoma Dode II. 871.
— ciliata DC. 41.
— cinerea L. 58.
— — W. 44.
— — × daphnoides 44.
— — × glabra 52.
— — × grandifolia 62.
— — × incana 62.
— — × lapponum 49.
— — × livida 62.
— — × myrtilloides 62.
— — × nigricans 54.
— — × purpurea 62.
— — × — × viminalis 46.
— — × repens 62.
— — × silesiaca 62.
— — × viminalis 46.
— coerulea Sm. 36.
— coerulescens Doell 62.
— combinata Hut. 52.
— cordata Mhbg. 50.
— — balsamifera Hook. 57.
— — × nigra 50.
— — × nigricans 52.
— — — purpurascens C. S. 50.
— — × purpurea 52.
— — rigida W. 50.
— — × sericea 52.
— — typica C. S. 50.
— coriacea Forb. 54.
Salix Cotteti Kern. 40.
— crataegifolia Bert. 51.
— cremensis Kern. 44.
— cuspidata Schultz 30.
— Cutleri Tuckerm. 37.
— daphnoides L. 44.
— — angustifolia Kern. 44.
— — — latifolia Kern. 44.
— — × incana 45.
— — pommeranica W. Koch 44.
— — pulchra Garcke 44.
— — × purpurea 45.
— — × repens 44.
— — typica C. S. 44.
— — — aglaja C. S. 44.
— — — latifolia C. S. 44.
— — — praecox C. S. 44.
— — × viminalis 44.
— dasyclados Wim. 45.
— — × purpurea 46.
— decipiens Hoffm. 33.
— depressa L. 62.
— desertorum Rich. 49.
— dichroa Doell 63.
— digenea J. Kern. 44.
— discolor Host 62.
— — Mhlbg. 54.
— — prinoides And. 54.
— — eriocephala And. 54.
— — typica C. S. 54.
— Doniana Sm. 65.
— dracunculifolia Boiss. 68.
— dumetorum Sut. 58.
— elaeagnifolia Tausch 46.
— elaeagnoides Schleich. 39.
— elaeagnos Scop. 67.
— elegans Bess. 63.
— elegantissima K. Koch 34
— Erdingeri Kern. 44.
— eriocephala Mchx. 54.
— erythroclados Simk. 32.
— euryadenia Ausserd. 39.
— excelsior Host 34.
— falcata Pursh 32.
— fallax Wolosz. 54.
— Fenzliana Kern. 40.
— finmarkica W. 65.
— Flueggeana W. 62.
— fluviatilis Nutt. 32.
— Forbyana Sm. 46.
— fragrans Salisb. 30.
— fragilis L. 33.
— — angustifolia Wim. 33.
— — concolor Neilr. 33.
— — × daphnoides 33.
— — discolor Kern. 33.
— — latifolia And. 33.
— — × nigricans 33.
— — × pentandra 30.
— — × purpurea 34.
— fragilissima Host 33.
— friburgensis Cott. 40.
— Friesiana And. 65.
— fruticosa Doell 46.
— fruticulosa Kern. 56.
— fusca Ht. 44.

Salix fusca L. 65.
— — W. 65.
— Ganderi Gand. 40.
— Geyeriana And. 57.
— glabra Scop. 51.
— — crataegifolia And. 51
— — × grandifolia 52.
— — × hastata × nigricans 52.
— — × nigricans 52.
— — × retusa 40.
— glauca L. 41.
— — Sm. 49.
— — W. 55.
— — × grandifolia 41.
— — × myrsinites 42.
— — pullata And. 41.
— — × reticulata 40.
— — × retusa 39.
— — sericea And. 41.
— — virescens And. 41.
— glaucoides And. 42.
— glaucops And. 41.
— gracilistyla Miq. 65.
— grandifolia Ser. 60.
— — albicans Beck 60.
— — angustifolia Kern. 60.
— — fagifolia Wim. 60.
— — × hastata 62.
— — × helvetica 49.
— — × incana 62.
— — lanata Gand. 60.
— — latifolia Kern. 60.
— — pubescens And. 60.
— — × purpurea 62.
— — × repens 62.
— — typica Beck 60.
— — vulgaris Wim. 60.
— — — angustifolia C. S. 60.
— — — latifolia C. S. 60.
— Gremliana Schwaigh. 44.
— Hankensonii Dode H. 870.
— Hartmanniana And. 49.
— hastata L. 51.
— — alpestris And. 51.
— — × helvetica 49.
— — × herbacea 40.
— — hyperborea Gürke 51.
— — × lanata 49.
— — × myrsinites 42.
— — × reticulata 40.
— — × retusa 39.
— — serrulata And. 51.
— — × silesiaca 52.
— — vegeta And. 51.
— Hegetschweileri Heer 55.
— Heimerlii H. Br. 54.
— helix Host 69.
— — L. 46.
— helvetica Vill. 48.
— — × herbacea 40.
— — × myrsinites 49.
— — × retusa 39.
— herbacea L. 39.
— — × lapponum 40.
— — × myrsinites 39.
— — × polaris 39.
Salix herbacea × reticulata 39.
— — × retusa 39.
— — synandra Bus. 39.
— heterandra Dode H. 870.
— heterophylla Host 61.
— hexandra Ehrh. 30.
— hippophaefolia Thuill. 32.
— hircina Kern. 62.
— Hirtii Strachl. 46.
— hirtula And. 63.
— holosericea W. 46.
— Hookeriana Barr. 48.
— Hoppeana W. 31.
— Hostii Kern. 46.
— Huguenini Brueg. 52.
— humilis Marsh. 64.
— — argentea W. Koch 65.
— — cylindrica Kern. 65.
— hungarica Kern. 44.
— Huteri Kern. 49.
— incana Schrk. 67.
— — lavandulifolia Koch. 67.
— — × purpurea 67.
— — × repens 65.
— — × viminalis 46.
— incubacea L. 65.
— intercedens Beck 62.
— interior Rowlee 33.
— intermedia Host 62.
— — Wim. 46.
— Jacquini Host 42.
— Jacquiniana W. 42.
— japonica Dipp. 66.
— — Thbg. 50.
— juratensis Schleich. 69.
— Kerneri Erd. 46.
— Kitaibeliana W. 39.
— Kochiana Trautv. 65.
— Koernickei And. 44.
— Kotulae Wolosz. 46.
— Kovatsii Kern. 31.
— Kraettliana Brueg. 54.
— Krausei And. 32.
— Laestadiana Hartm. 49.
— laeta Schultz 65.
— Laggeri Wim. 41.
— lagopina Ausserd. 39.
— Lambertiana Sm. 69.
— lanata L. 48.
— — Thuill. 65.
— lancifolia And. 29.
— — Doell. 46.
— Landaueri A. Meyer 54.
— lapponum L. 48.
— — daphneola Wim. 48.
— — marrubifolia Wim. 48.
— — × myrtilloides 49.
— — × purpurea 49.
— — × silesiaca 49.
— — typica Koch. 48.
— — — marrubifolia C. S. 48.
— — × viminalis 46.
— Laschiana Wohlf. 62.
— lasiandra Benth. 29.
— — caudata Sudw. 29.
— — Lyalli Sarg. 29.

Salix latifolia Forb. 54.
— laurina Sm. 55.
— laurifolia Wesm. 30.
— lavandulifolia Peyr. 67.
— laxiflora Kern. 52.
— Ledebouriana Trautv. 68.
— leucophylla Ht. 36.
— — W. 48.
— limnogena Kern. 62.
— limosa Wahlbg. 48.
— linearis Forb. 67.
— lispoclados Dode II. 871.
— livida Wahlbg. 61.
— — × myrtilloides 63.
— — × nigricans 54.
— — orbicularis Wim. 62.
— — pilosa Wim. 62.
— — × purpurea 63.
— — × repens 63.
— — rostrata Ht. 61.
— — × silesiaca 62.
— — typica C. S. 62.
— longifolia Heidenr. 46.
— — Host 45.
— — Mhlbg. 32.
— — argyropbylla And. 33.
— lucida Forb. 30.
— — Mhlbg. 29.
— ludificans White 56.
— macrocarpa Trautv. 41.
— macrophylla Kern. 62.
— macrorrhyncha And. 44.
— magnifica Hemsl. II. 870.
— malifolia Sm. 51.
— maunternensis Kern. 62.
— marchica Straehl. 63.
— Margaretae Seem. 34.
— Margarita White 40.
— Mariana Wolosz. 44.
— maritima Hart. 64.
— marrubifolia Tausch 48.
— Mauschkii Hart. 59.
— Medemii Boiss. 57.
— Medwediewii Dode II. 870.
— Meyeriana Rostk. 30.
— microstachya Turcz. 68.
— Milichhoferi Saut. 54.
— mollissima Ehrh. 32.
— monandra Ard. 69.
— monspeliensis Forb. 33.
— Müblenbergiana W. 64.
— multinervis Doell 62.
— — Franch. et Sav. 68.
— myricoides Mhlbg. 52.
— myrsinites L. 42.
— — Jacquini Wim. 42.
— — × nigricans 43.
— — × retusa 39.
— — serrata Neilr. 42.
— — × silesiana 43.
— — typica Kern. 42.
— myrsinitoides Fries 43.
— myrtoides Doell 54.
— myrtilloides L. 63.
— — Vill. 55.
— — W. 68.
Salix myrtilloides pedicellaris And. 63.
— — × purpurea 65.
— — × repens 65.
— Napoleonis Ht. 69.
— — Schultz 36.
— Neilreichii Kern. 62.
— neisseana Kern. 46.
— nepetifolia Presl 49.
— Nicholsoni Dieck 50.
— nigra Ht. 44.
— — Marsb. 32.
— — pendula Ht. 69.
— nigricans Sm. 53.
— — × pyrolaefolia 52.
— — × reticnlata 40.
— — × retusa 40.
— nitens Kern. 46.
— nitida W. 54.
— nivea Ser. 49.
— Normani And. 42.
— notbula And. 39.
— obtusifolia W. 49.
— oenipontana Kern. 62.
— oleaefolia And. 63.
— oleifolia Vill. 62.
— onusta Bess. 63.
— onychiopbylla And. 39.
— oppositifolia Host 69.
— oslaviensis Wolosz. 62.
— otites Ht. 67.
— ovata Ser. 40.
— oxica Dode II. 871.
— Pallasii And. 41.
— palustris Host 34.
— patula Ser. 63.
— Patzeana And. 44.
— Paxii Wolosz. 55.
— pendula Moench 36.
— pendulina Wend. 34.
— pentandra L. 30.
— — Nutt. 29.
— — nana Bolle 30.
— — × purpurea II. 870.
— petiolaris Sm. 64.
— — × sericea 65.
— — subsericea And. 65.
— phylicifolia L. 53.
— — Sm. 55.
— — Wahlbg. 53.
— — Wulf. 51.
— Pierotii Miq. 66.
— Pockornyi Kern. 33.
— polaris Whlbg. 39.
— pommeranica W. 44.
— pontederae Vill. 51.
— pontederana W. Koch 62.
— pontederanae Lois. 51.
— praecox Hoppe 44.
— prinoides Pursh 54.
— proteifolia Forb. 62.
— pruinosa Bess. 44.
— pseudomyrtoides Wohlf. 54.
— puberula Doell 54.
— pulchra Wim. 44.
— pumila Salisb. 39.
— purpurea L. 68.

Salix purpurea amplexicaulis Boiss. 69
— — angustifolia Kern. 69.
— — eriantha Wim. 69.
— — eupurpurea C. S. 68.
— — — eriantha C. S. 69.
— — — mirabilis C. S. 69.
— — — pendula C. S. 69.
— — — pyramidalis C. S. 69.
— — — sericea C. S. 69.
— — — styligera C. S. 69.
— — — typica C. S. 68.
— — — — angustifolia C. S. 69.
— — — — gracilis C. S. 69.
— — — — Lamhertiana C. S. 69.
— — furcata Wim. 69.
— — gracilis Gr. et God. 69.
— — helix W. Koch 69.
— — Lambertiana W. Koch 69.
— — latifolia Kern. 69.
— — longifolia Dipp. 69.
— — mirabilis Host 69.
— — monadelpha Koch 69.
— — multinervis Matsum. 68.
— — pendula Dipp. 69.
— — pyramidalis Dipp. 69.
— — × repens 65.
— — scharfenbergensis Bolle 69.
— — sericea Koch 69.
— — × silesiaca 62.
— — styligera Wim. 69.
— — typica Beck 68.
— — uralensis Ht. 69.
— — utilissima Ht. 69.
— — × viminalis 46.
— pyrenaica Gouan 41.
— pyrolaefolia Ledeb. 50.
— pyrolifolia And. 57.
— rakosina Borb. 62.
— recondita Ausserd. 39.
— regalis Ht. 36.
— Reichardtii Kern. 62.
— repens L. 64.
— — angustifolia Neilr. 65.
— — — laeta C. S 65.
— — fusca Koch 65.
— — laeta Seem. 65.
— — Rieseana Straehl. 65.
— — × viminalis 46, 65.
— — vulgaris W. Koch 65.
— — — fusca C. S. 65.
— — — lanata C. S. 65.
— — — Rieseana Seem. 65.
— — — vitellina G. Mey. 65.
— reticulata L. 40.
— — × retusa 39.
— reticuloides And. 40.
— retusa L. 38.
— — denticulata Kern. 39.
— — integrifolia Kern. 39.
— — Kitaibeliana W. Koch 39.
— — serpyllifolia W. Koch 37.
— — Thomsoniana Rchb. 39.
— — typica Koch. 39.
— — vulgaris Willk. 39.
— — — denticulata C. S. 39.
— — — integrifolia C. S. 39.
Salix retusoides Kern. 39.
— Reuteri Moritzi 45.
— rhaetica Kern. 52.
— riparia W. 67.
— Ritschelii And. 63.
— rosmarinifolia Gouan 67.
— — Ht. 67.
— — L. 65.
— — W. Koch 65.
— rostrata Rich. 61.
— — Thuill. 65.
— rotundifolia Trautv. 37.
— rubens Schrk. 33.
— — excelsior C. S. 34.
— — palustris C. S. 34.
— — viridis C. S. 33.
— rubra Huds. 46.
— — sericea W. Koch 46.
— rugosa Ser. 61.
— rugulosa And. 63.
— Russeliana W. Koch 33.
— Sacharowii Schroed. 45.
— Salamoni Ht. 36, II. 871.
— sarmentacea Fries 40.
— saxetana White 43.
— Schatilowi Schroed. 49.
— Schraderiana W. 56.
— Schroederiana C. S. 52.
— Schumanniana Seem. 30.
— Scouleriana Barr. 57.
— scrobigera Wolosz. 62.
— semireticulata White 40.
— semiretusa Beck 39.
— semperflorens Host 31.
— sepulcralis Simk. 36, II. 871.
— sericans Tausch 46.
— sericea Marsh. 64.
— — Vill. 41.
— — subsericea Rydbg. 65.
— Seringeana Gaud. 62.
— serotina Schur 31.
— serpyllifolia Scop. 37.
— serrulata W. 51.
— sibirica Ledeb. 68.
— — Pall. 67.
— Sieboldiana Bl. 57.
— Siegertii And. 62.
— silesiaca W. 59.
— — × viminalis 46.
— simulatrix White 40.
— sitchensis Sans. 69.
— Smithiana W. 46.
— sobrina White 40.
— Sommerfeltii And. 39.
— sordida Kern. 62.
— spadicea Chaix 53, 58.
— Spaethi Koopm. 68.
— spathulata W. 61.
— speciosa Host 31.
— — Nutt. 29.
— sphaerocephala Kern. 62.
— splendens Bray 36.
— — Turcz. 45.
— spuria Wohlf. 49.
— Starkeana W. 62.
— stenoclados Doell 63.

Salix stenostachya Kern. 52.
— stipularis Sm. 46.
— Stoderana Dürrnb. 62
— Straehleri Seem. 62.
— subalpina Forb. 65.
— subaurita And. 62.
— subcaprea And. 62.
— subcinerea And. 62.
— subcordata And. 41.
— subglabra Kern. 52.
— subincana And. 67.
— sublivida Gürke 62.
— subnivalis Brügg. 39.
— subsericea C. S. 65, II. 871.
— — Doell 62.
— subtriandra Neilr. 32.
— sudetica Host 48.
— syntriandra Beck 62.
— syrticola Fern. II. 871.
— tatrae Wolosz. 43.
— Tauschiana Sieb. 49.
— tephrocarpa Wim. 55.
— tetrapla Walk. 54.
— Thomsoniana Gürk. 39.
— Thunbergiana Bl. 66.
— thymelaeoides Schleich. 41
— tomentosa Host 49.
— Tominii Dode II. 871.
— Traunsteineri Kern. 62.
— Trevirani Spreng. 32.
— triandra L. 30.
— tristis Ait. 64.
— uliginosa W. 61.
— uva-ursi Pursh 37.
— vagans rostrata And. 61.
— vaudensis Forb. 54.
— velutina Schrad. 46.
— versilolia Wahlbg. 49.
— vestita Pursh 40.
— Villarsiana Fluegge 31.
— viminalis L. 45.
— — abbreviata Doell 45.
— — angustilolia Kern 45.
— — vulgaris Kern. 45.
— — — abbreviata C. S. 45.
— — — angustilolia C. S. 45.
— — splendens And. 45.
— violacea Andr. 44.
— viridis Fries 33.
— vitellina L. 36, II. 871.
— vratislaviana Kern. 46
— Waldsteiniana W. 55.
— Weigeliana W. 55.
— Wichurae Pok. 67.
— Wilhelmsiana M. B. 68.
— Wimmeriana Gren. et God. 62.
— wolgensis And. 68.
— Wulfeniana W. 51.
— Zedlitziana Kern. 46.
— zygostemon Boiss. et Hoh. 58.
Salpichroa Miers II. 607.
— rhomboidea Miers II. 607.
Salsola fruticosa L. 267.
— prostrata L. 264.
Salvia L. II. 602.
— carnosa Dougl. II. 602.
Salvia officinalis L. II. 602.
Salzwedella sagittalis G., M. et Sch. II. 36
Sambucus L. II. 632.
— angustilolia May II. 635.
— arboreseens Nutt. II. 637.
— aurea Carr. II. 634.
— bipinnata Ch. et Schl. II. 635.
— californica Koch II. 635.
— calliearpa Greene II. 638.
— canadensis L. II. 635.
— — acutiloba Rehd. II. 635
— — laciniata Gray II. 635.
— — maxima Schwer. II. 635.
— chinensis Ldl. II. 632.
— coerulea Ral. II. 635.
— — glauca Schwer. II. 635.
— — × nigra II. 634.
— — velutina Schwer. II. 635.
— dimidiata Ral. II. 637.
— lontenayensis Koch II. 634.
— Fontenaysii Carr. II. 634
— glauca Nutt. II. 635.
— hirta Tausch II. 635.
— Hookeri Rehd. II. 1057.
— intermedia Carr. II. 635.
— — neomexieana Schwer. II. 635.
— japonica Thbg. II. 187.
— javanica Reinw. II. 632, 1057.
— laciniata Mill. II. 633.
— leiosperma Leib. II. 638.
— maritima Greene II. 635.
— melanocarpa Gray II. 636.
— — Fürstenbergi Schwer. II. 636.
— mexicana Presl II. 634.
— — bipinnata Schwerin II. 635.
— — plantièrensis Schwerin II. 634.
— — typica Schwerin II. 634.
— microbotrys Rydb. II. 638.
— neomexieana Woot. II. 635.
— nigra L. II. 632.
— — albo-variegata Endl. II. 634.
— — argentata Bernh. II. 634.
— — aurea Sweet II. 634.
— — aureo-variegata Dipp. II. 634.
— — fasciata Lav. II. 633.
— — haematactea Asch. II. 632.
— — heterophylla Endl. II. 633.
— — hydractea Asch. II. 632.
— — irregularis latisecta Schwer. II. 633.
— — laciniata L. II. 633.
— — — laciniato-crispa C. Schn. II. 633.
— — — laciniato-variegata C. Schn. II. 633.
— — — latisecta C. Schn. II. 633.
— — — linearis C. Schn. II. 633.
— — laciniato-crispa Zab. II. 633.
— — laciniato-variegata Dav. II. 633.
— — latisecta Hesse II. 633.
— — linearis Kirehn. II. 633.
— — luteo-variegata Du Ham. II. 634.
— — monstrosa Sweet II. 633.
— — nana Schwerin II. 633.
— — — tricolor Ht. II. 634.
— — pendula Dipp. II. 633.
— — plantièrensis Lav. II. 634.
— — plena Bernhardi II. 632.

Sambucus nigra plena roseo-plena C. Scb. II. 632.
— — pubescens Zab. II. 635.
— — pulla Ait. II. 632.
— — pulverulenta Sweet II. 634.
— — pyramidalis Dipp. II. 633.
— — pyramidata Lav. II. 633.
— — roseo-plena Zab. II. 632.
— — rotundifolia Endl. II. 633.
— — semperflorens Desf. II. 632.
— — swinfenensis Ht. II. 633.
— — tricolor Dipp. II. 634.
— — variegata Hayne II. 634.
— — — albovariegata C. Schn. II. 634.
— — — luteo-variegata C. Schn. II. 634.
— — viridis Ait. II. 632.
— oreopola Donn.-Smith II. 635.
— plantièrensis Sim. II. 635.
— pubens Mich. II. 636.
— — albicocca Britt. II. 637.
— — arborescens Torr. II. 636.
— — dimidiata Schwer. II. 637.
— — dissecta Britt. II. 637.
— — leucocarpa Bernhardi II. 637.
— — maxima Hesse II. 635.
— — pubescens Schwer. II. 636.
— — pulverulenta Schwer. II. 637.
— — xanthocarpa Cock. II. 637.
— pubescens Pers. II. 636.
— pyramidata Lebas II. 633.
— racemosa L. II. 637.
— — arborescens Koch. II. 637.
— — aurco-variegata Neub. II. 638.
— — callicarpa Jeps. II. 638.
— — dentata Carr. II. 638.
— — flavescens Sweet II. 638.
— — glabra Miqu. II. 638.
— — — normalis marmorata Schwer. II. 638.
— — — semperflorens Schwer. II. 638.
— — laciniata Koch II. 638.
— — maritima Jeps. II. 635.
— — marmorata C. Schn. II. 638.
— — nana Carr. II. 638.
— — ornata Carr. II. 638.
— — plumosa André II. 638.
— — pubescens Miqu. II. 637.
— — — Schwer. II. 637.
— — purpurea Sweet II. 638.
— — rosaeflora K. Koch II. 638.
— — rubra Duh. II. 638.
— — semperflorens C. Schn. II. 638.
— — Sieboldiana Miqu. II. 638.
— — spectabilis Carr. II. 638.
— — tenuifolia Carr. II. 638.
— — violacea Woll II. 638.
— — viridis Wolf II. 638.
— — rotundifolia Lodd. II. 633.
— — Mileri Podp. II. 633.
— — trifoliata Dipp. II. 633.
— Schweriniana Rehd. II. 1057.
— Sieboldiana Blume II. 638.
— — gracilis Schwer. II. 638.
— — longifolia Schwer. II. 638.
— Thunbergi Don II. 632.
— Thunbergiana Bl. II. 632.
Sambucus velutina Dur. II. 635.
— virescens Desl. II. 632.
— — albida Sweet II. 632.
— — chlorocarpa Hayne II. 632.
— — leucocarpa Hayne II. 632.
— — virescens Sw. II. 632.
— Williamsi Hance II. 638.
Sanguisorba spinosa Bertol. 536.
Santolina L. II. 762.
— chamaecyparissus L. II. 762.
— — viridis Rouy II. 762.
— ericoides Poir. II. 762.
— incana Lam. II. 762.
— squarrosa Willd. II. 762.
— villosissima Poir. II. 762.
— virens Mill. II. 762.
— viridis Willd. II. 762.
Sapindus L. II. 254.
— chinensis L. II. 255.
— Delavayi Radlk. II. 254.
— Drummondii Hook. et Arn. II. 254.
— marginatus Auct. II. 254.
— Mukorossi Gaertn. II. 255, **1030.**
Sarcobatus Nees 266.
— Maximiliani Nees 266.
— vermiculatus Torr. 266.
Sarcococca Ldl. II. 136, **1020.**
— humilis Stapf II. 1020.
— pruniformis Ldl. II. 136, 1020.
— ruscifolia Stapf II. 1020.
— saligna M. Arg. II. 136, 1020.
— — angustifolia Baill. II. 1020.
— — latifolia Baill. II. 1020.
Sarcostyles Presl 393.
Sarcozygium xanthoxylum Bge. II. 115
Sarothamnus Wim. II. 42.
— cantabricus Willk. II. 42.
— scoparius Wim. II. 42.
— vulgaris Wim. II. 42.
Sassafras Nees et Eberm. 349.
— officinale N. et E. 349.
— Sassafras Karst. 349, 807.
— variifolium C. S. 806.
Satureja L. II. 603.
— cristata Nym. II. 604.
— graeca L. II. 604.
— hyssopifolia Bert. II. 603.
— illyrica Host II. 604.
— montana L. II. 603.
— — communis Vis. II. 603.
— — illyrica Benth. II. 604.
— — subspicata Vis. II. 604.
— — variegata Vis. II. 604.
— pygmaea Sieb. II. 604.
— rupestris Wulf. II. 603.
— subspicata Vis. II. 604.
— variegata Host II. 604.
Saxifraga pectinata Pursh 485.
Schefflera impressa Harms II. 420.
Schinus L. II. 1021.
— dependens Ort. II. 1021.
Schisandra (Schizandra) Rich. 340, II. **928.**
— axillaris Hk. et Tb. 341.
— chinensis Baill. 341.
— coccinea Mchx. 341.
— grandiflora Hk. et Tb. 341.

Schisandra Henryi Clarke II. 928.
— nigra Max. 341.
— proquinqua Hk. et Th. 341.
Schizonotus Ldl. 486.
— Ral. 495.
— argenteus dumosus Ktze. 497.
— discolor Ral. 499.
— dumosus Koch. 497.
— tomentosus Ldl. 490.
Schizophragma S. et Z. 393.
— hydrangeoides S. et Z. 393.
— — integrifolia Fr. 394.
— integrifolia Oliv. 394.
Schmaltzia Desv. II. 148.
— aromatica Small II. 148.
— Ashei Small II. 154.
— crenata Greene II. 149.
— hirta Small II. 154.
— Michauxi Sm. II. 155.
— trilobata Small II. 148.
Schmidelia integerrima Ht. II. 254.
Schoberia Iruticosa Mey. 267.
Schollera Roth II. 560.
— oxycoccus Roth II. 561.
Schranckia angustata Torr. et Gr. II. 3.
Scoria Ral. (= Hicoria) 76.
Scorpius Mnch. II. 28.
— spinosus Mnch. II. 30.
Securinega Juss. II. 134, 1020.
— flueggeoides Müll.-Arg. II. 135, 1020.
— japonica Miqu. II. 135.
— obovata M.-Arg. II. 1020.
— ramiflora Müll.-Arg. II. 135.
Sedum L. 359.
— populifolium Pall. 360.
Semele Kth. II. 860.
— androgyna Kth. II. 860.
Senecio L. II. 765.
— elaeagnifolius Hook. II. 765.
— Greyi Hook. II. 767.
Sericotheca Ral. II. 962.
— concolor Rydb. II. 962.
— dumosa Rydb. II. 962.
— microphylla Rydb. II. 962.
Serissa Commers. II. 631.
— foetida Comm. II. 631.
— — variegata Barcl. II. 631.
— japonica Hemsl. II. 631.
Shepherdia Nutt. II. 405.
— argentea Nutt. II. 406.
— — Ht. II. 410.
— — × canadensis II. 406.
— canadensis Nutt. II. 406.
— — xanthocarpa Rehd. II. 406.
— gottingensis Rehd. II. 406.
— rotundifolia Parry II. 405.
Sibbaldiopsis tridentata Rydb. 522.
Sibiraea Max. 485.
— altaiensis C. S. 485, 808.
— croatica Deg. II. 961.
— laevigata Max. 485, 808
— — croatica C. S. II. 961.
Sideroxylon lycioides L. II. 573.
— lanuginosa Mchx. II. 573
Sieversia paradoxa Don 526.
Silene L. 268.
Silene carnea Salisb. 269.
— chloraefolia Sm. 269.
— Iruticosa L. 268.
Silliquastrum cordatum Mnch. II. 5.
— orbiculatum Mnch. II. 8.
Simmondsia Nutt. II. 141.
— californica Nutt. II. 141.
— chinensis C. S. II. 141.
Sinofranchetia Hemsl. II. 912.
— chinensis Hemsl. II. 912.
Sinowilsonia Hemsl. II. 957.
— Henryi Hemsl. II. 957.
Siphisia Ral. II. 905.
Skimmia Thbg. II. 126.
— Foremani Mast. II. 127.
— Fortunei Mast. II. 127.
— — argentea Mast. II. 127.
— — × japonica II. 127.
— — rubella Rehd. II. 127.
— fragrans Carr. II. 127.
— fragrantissima Hort. II. 127
— intermedia Carr. II. 127.
— japonica Hook II. 127.
— — Thbg. II. 127.
— — argenteo-variegata Nich. Mott. II. 127.
— — ovata Rehd. II. 127.
— — Veitchi Rehd. II. 127.
— Laureola S. et Z. II. 127.
— oblata Moore II. 127.
— — ovata Carr. II. 127.
— — Veitchi Carr. II. 127.
— Rogersi Mast. II. 127.
— rubella Carr. II. 127.
Smilax L. II 862.
— aspera L. II. 862.
— — altissima Mor. II. 863.
— — mauritanica Gr. et God. II. 863.
— — nigra Hal. II. 863.
— bona-nox L. II. 863.
— excelsa L. II. 864.
— — triangulata Schwer. II. 865.
— glauca Walt. II. 865.
— hastata W. II. 863.
— hispida Muhl. II. 864.
— lanceolata L. II. 865.
— laurifolia L. II. 865.
— mauritanica Desf. II. 863.
— nigra W. II. 863.
— pseudochina L. II. 864.
— quadrangularis W. II. 865.
— rotundifolia L. II. 865.
— — crenulata Small et H. II. 865.
— — quadrangularis Wood. II. 865.
— sagittaefolia Ht. II. 863.
— sarsaparilla L. II. 865.
— tamnoides Gr. II. 863.
— Walteri Pursh II. 865.
Smirnowia Bge. II. 85.
— turcestana Bge. II. 85.
Solanum L. II. 612.
— assimile Friv. II. 613.
— Dulcamara L. II. 612.
— — indivisum Boiss. II. 613.
— — litorale Brd. II. 613.
— — persicum Dipp. II. 613.

Solanum Dulcamara tomentosum Koch II. 613.
— — villosissimum Desv. II. 613
— jasminoides Paxt. II. 612.
— litorale Raab II. 613.
— persicum Willd. II. 613.
Solidago Sarothrae Pursh II. 755.
Sophora L. II. 17.
— alfinis Ht. II. 20.
— — T. et Gr. II. 19.
— japonica L. II. 19.
— — columnaris Schwer. II. 1009.
— — bybrida Carr. II. 19.
— — pendula Loud. II. 20.
— — praecox Schwer. II. 1009.
— — tomentosa Ht. II. 20.
— — typica C. S. II. 20.
— — — variegata C. S. II. 20.
— — violacea Carr. II. 20.
— Korolkowi Ht. II. 20.
— macrocarpa Sm. II. 18.
— Moorcroftiana Bentb. II. 18.
— — Davidi Franch. II. 18.
— platycarpa Max. II. 17.
— pubescens Tausch II. 20.
— secundiflora Lag. II. 19.
— sinensis Forest. II. 20.
— — Ht. II. 20.
— Shikokiana Max. II. 17.
— tetraptera Mill. II. 17.
— tomentosa Ht. II. 20.
— — L. II. 18.
— viciifolia Hance II. 18.
— violacea Dipp. II. 20.
Sorbaria A. Br. 486, II. **961**.
— Aitchisonii Hemsl. 491, 808.
— alpina Dipp. 488.
— — × sorbifolia 488.
— angustifolia Zbl. 491.
— arborea C. S. 490, II. 961.
— — glabrata Rehd. II. 961.
— — subtomentosa Rehd. II. 961.
— assurgens Rehd. 490, II. 961.
— grandiflora Max. 488.
— Kirilowi Max. 486.
— Lindleyana Max. 490.
— millefolium Focke 492.
— sorbifolia A. Br. 488.
— — dubia C. S. 488.
— — stellipila Max. 490.
— — typica C. S. 488.
— stellipila C. S. 489.
— — incerta C. S. 490.
— — typica C. S 490.
Sorbaronia C. S. II. 996.
— alpina C. S. II. 997.
— Dippelii C. S. II. 997.
— — superaria C. S. II. 997
— fallax C. S. II. 996.
— heterophylla C. S. 996.
— monstrosa C. S. II. 996.
— sorbifolia C. S. II. 996.
Sorbopyrus C. S. 666, II. 995
— auricularis C. S. 666.
— — bulbiformis C. S. 667.
Sorbus L. 667, II. **995**
Sorbus alnifolia Koch 703.
— alpina Ht. 689.
— — Heynh. 689.
— altaica Koch. II. 996.
— ambigua Hedl. 698.
— americana Marsh. 677.
— — Pursh 676.
— — × arbutifolia 677.
— — × aria 677.
— — × aucuparia 674.
— — decora Sarg. 676.
— — × decora 677.
— — groenlandica C. S. 677.
— — macrocarpa Zbl. 676.
— — × melanocarpa 677.
— arbutifolia Heyn. 698.
— — × aria 689.
— — atropurpurea C. S. 698.
— — × aucuparia 676.
— — Baenitziana C. S. 698.
— — depressa C. S. 698.
— — × melanocarpa 699.
— arguta Zbl. 708.
— aria Crtz. 687, II. 996.
— — × aucuparia 674, II. 996.
— — aurea Ht. 688.
— — carpinifolia Ht. 688.
— — — Kirchn. 688.
— — × chamaemespilus 689, 698.
— — chrysophylla Ht. 688.
— — concolor Boiss. 686.
— — × cuspidata 684.
— — cyclophylla Beck 688.
— — edulis Wenz. 687.
— — — × aucuparia 675.
— — flabellifolia Wenz. 689.
— — glabra Alb. 685.
— — glabrata Dipp. 695.
— — graeca Koch 690.
— — incisa Alb. 694.
— — — Rehb. 687.
— — × intermedia 688.
— — kamaonensis Max. 703.
— — longifolia Pers. 688.
— — lutescens Ht. 688.
— — majestica Zbl. 688.
— — × melanocarpa 689.
— — × Mougeoti 688.
— — nepalensis Ht. 688.
— — rotundifolia Ht. 685.
— — salicifolia Myr. 688.
— — seminicisa Borb. 695.
— — subtomentosa Alb. 686.
— — × torminalis 688.
— — typica C. S. 687.
— — — parvula C. S. 687.
— — velutina Alb. 685.
— arioides Hedl. 688.
— armeniaca Hedl. 693.
— arranensis Hedl. 692.
— aucuparia L. 672.
— — alpestris Wim. 673.
— — alpina Blytt 673.
— — baltica Zbl. II. 995.
— — decurrens II. 995.
— — Dirkeni C. S. 674.

Sorbus aucuparia Dirkeni aurea Ht. 674.
— — × domestica 674.
— — dulcis Kraetzl 674.
— — — laciniata Beiss. 674.
— — Duhmbergii Koeh. II. 996.
— — fol. lut.-varg Späth 674.
— — fr. luteo Loud. 674.
— — Fifeana C. S. 674.
— — glabrata C. S. 673, II. 995.
— — glabrescens Zbl. II. 995.
— — × hybrida 675.
— — incisa Ht. 674.
— — integerrima Koeh. 674.
— — × intermedia 692.
— — japonica Max. 678.
— — laciniata Hartm. 674.
— — lanuginosa Beck 673.
— — — × umbellata 675.
— — luteo-variegata C. S. 674.
— — Meinichi Lindb. 675.
— — × melanocarpa 676.
— — moravica Zeng. 674.
— — — laciniata C. S. 674.
— — × Mougeoti 675, 676.
— — pendula Kirchn. 674.
— — — variegata C. S. 674.
— — rossica Späth-Koehne 674.
— — — major Späth 674.
— — subcalva Schur. 673.
— — typica Beck 673.
— — — C. S. 673.
— Baldaccii Deg. et Fr. 691.
— bellojocensis Gand. 688.
— Boissieri C. S. 671.
— Bollwylleriana Zbl. 667.
— californica Greene 671.
— carpatica Borb. 688.
— casbmiriana Hedl. 680.
— — Aitchisoni C. S. 680.
— carpinifolia Hedl. 688.
— chamaemespilus Crtz. 697.
— — discolor Heg. 697.
— — — Neilr. 698.
— — glabra Neilr. 697.
— — × Mougeoti 694.
— — ovalifolia R. et C. 698.
— commixta Hedl. 677.
— — rufoferruginea C. S. 678, II. 996.
— — typica C. S. 678.
— — — angustissima C. S. 678.
— concolor C. S. 686.
— Conwentzi C. S. 688.
— crenata Koch 684.
— cretica Fritsch 690.
— cuspidata Hedl. 683, II. 996.
— dacica Borb. 675.
— decipiens Hedl. 688.
— — × Mougeoti 689.
— decora C. S. 676.
— decurrens Hedl. 674, II 995.
— Dippeli Zbl. 689.
— — superaria C. S. 689.
— — typica C. S. 689.
— discolor Hedl. 669, II. 995.
— domestica L. 683.
Sorbus dubia Hedl. 689.
— dumosa Greene 672.
— edulis Koch 687.
— erubescens Kerner 698.
— fallacina Rog 696.
— fallax C. S. 676.
— fennica Fries 692.
— flabellifolia Schau. 689.
— florentina Nym. 724.
— floribunda Heynh. 699.
— — glabrescens C. S. 699.
— foliolosa Spach 680.
— — pluripinnata C. S. 680.
— — typica C. S. 680.
— — ursina Wenz. 680.
— Giraldiana C. S. 672.
— glabra Gil. 673.
— — Zbl. 707.
— glabrata Hedl. 673.
— — Kirchn. 695.
— gracilis Koch 679.
— graeca Hedl. 690.
— grandifolia Heynh. 700.
— Hedlundi C. S. 685.
— heterophylla C. S. 676.
— — Dipp. 676.
— Hosti Hedl. 694.
— hupehensis C. S. 680.
— hybrida L. 691.
— — superaucuparia Zbl. 674.
— incana Hedl. 689.
— incisa Hedl. 687.
— insignis Hedl. 667.
— intermedia Pers. 692, II. 997.
— japonica Koch. 678.
— — Sieb. 703.
— — Zbl. 712.
— — rufoferruginea Koidz. II. 996.
— Koehneana C. S. 681.
— Koehnei Zbl. 703.
— Kurzi C. S. 679.
— lanata Koch 691.
— lanuginosa Ht. 674.
— — Kit. 673.
— latifolia Pers. 694.
— — obtusata C. S. 695.
— — parmulobata C. S. 695.
— — semiincisa C. S. 695.
— — × torminalis 695.
— — typica C. S. 695.
— longifolia Hedl. 688.
— maderensis Decne. 672.
— Matsumurana Koeh. 669.
— — Reinii Koeh. II. 995
— Meinichi Hedl. 675.
— melanocarpa Heynh. 699.
— — grandifolia Rehd. 700.
— — subpubescens Rehd. 700.
— — typica C. S. 700.
— meridionalis Fritsch 691.
— micrantha Dum.-Cours. 677.
— — Koidz. II. 000.
— microcarpa Pursh 677, II. 996.
— microphylla Decne. 682.
— minima Hedl. 692.
— Mougeoti Soy. et Godr. 694.

Sorbus Mougeoti austriaca C. S 694.
— — typica C. S. 694.
— monstrosa C. S. 677.
— Miyabei Mayr 703.
— nepalensis Ht. 684.
— nikkoensis Koidz. II. 996.
— oblongifolia Rchb. 688.
— obtusata Hedl. 695.
— obtusifolia Hedl. 688.
— occidentalis Greene 670.
— parmulobata Fritsch 695.
— parviflora Hedl. 669, II. 995.
— paucicrenata Hedl. 695.
— pekinensis Koeh. 669, II. 995.
— perincisa Borb. 696.
— persica Hedl. 694.
— plantièrensis C. S 677.
— pohuashanensis Rehd. 672.
— polaris Koeh. II. 996.
— praemorsa Nym. 672.
— pruinosa Koeh. II. 996.
— pseudoscandica Zhl. II. 996.
— pseudogracilis Koeh. II. 995.
— pubescens Hedl. 699.
— pumila Raf. 669.
— Pyrus Crtz. 662.
— quercifolia Hedl. 675.
— reflexipetala Koeh. II. 996.
— rotundifolia Hedl. 689.
— rufoferruginea C. S. II. 996.
— rufopilosa C. S. 682.
— salicifolia Hedl. 688.
— sambucifolia Auct. 669, 676, 677.
— — Roem. 667.
— — Grayi Wenz. 670
— — typica C. S. 668.
— — pseudogracilis C. S. 668, II. 995
— Sargenti Dipp. 677.
— scandica Fries 692.
— — Mougeoti Zhl. 694.
— Schneideriana Koeh. II. 995.
— Schwerini C. S. 679.
— scopulina Greene 677.
— semipinnata Hedl. 674.
— — thuringiaca Hedl. 675.
— serotina Koeh. II. 996.
— sibirica Hedl. 678, II. 996.
— sikkimensis Wenz. 700.
— — ferruginea Wenz. 700.
— — microcarpa Wenz. 700.
— — oblongifolia Wenz. 701.
— sitchensis Roem. 669.
— sorbifolia Hedl. 677.
— splendida Hedl. 674.
— spuria Pers. 676.
— subfusca Boiss. 685.
— subvestita Greene 672.
— sudetica Nym. 698.
— suecica Krok. et Alm. 692.
— tapashana C. S. 672.
— thianshanica Rupr 668, II. 995.
— thuringiaca C. S. 675.
— — Fritsch 675.
— torminalis Crtz. 696.
— — mollis C. S. 696.
— — perincisa C. S. 696.
Sorbus torminalis pinnatifida Boiss. 696.
— trilobata Boiss. 726.
— — oxyloba Boiss. 726.
— turcestanica Hedl. 692.
— — unipinnata C. S. 693.
— umbellata Fritsch 689.
— — Baldaccii C. S. 691.
— — cretica C. S. 690.
— — flabellifolia C. S. 689.
— ursina Decne. 680.
— — typica C. S. 680.
— — Wenzigiana C. S. 680.
— velutina C. S. 686.
— villosa Zhl. 710.
— — laevis Zhl. 710.
— Vilmorini C. S. 682.
— — setschwanensis C. S. 683.
— — typica C. S. 683.
— Wilfordii Koeh. II. 995.
— Wilsoniana C. S. 671.
— Zahlbruckneri C. S. 685.
Spartianthus Link II. 23.
— junceus Lk. II. 23.
Spartium L. II. 23.
— aphyllum Pall. II. 85.
— cinereum Vill. II. 32.
— decumbens Dur. II. 48.
— grandiflorum Brot. II. 43.
— gymnopternm Viv. II. 28.
— horridum Vahl II. 28.
— infestum Presl II. 60.
— junceum L. II. 23.
— lanigerum Desf. II. 60.
— monospermum L. II. 26, 27.
— multiflorum Ait. II. 43.
— — incarnatum Lodd. II. 43.
— radiatum L. II. 27.
— scoparium L. II. 42.
— sphaerocarpum L. II. 27.
— spinosum L. II. 60.
— umbellatum Desf. II. 31.
— villosum Poir. II. 60.
Spartocytisus albus Koch II. 43.
— filipes Webb II. 43.
Sphaerophysa salsula DC. II. 85.
Spinovitis Davidi Rom. II. 303, 1032.
Spiraea (L.) Max. 449, II. **959**.
— acutifolia W. 452.
— acutifolioides C. S. 452.
— Aemiliana C. S. 477.
— Aitchisoni Hemsl. 491.
— alba Dur. 481.
— — bethlehemensis Zhl. 481.
— — × corymbosa 479.
— — densifolia Zhl. II. 960.
— — × Douglasi 483, II. 961.
— — latifolia Dipp. 481.
— — — × albiflora 475.
— — — × Douglasi 482.
— — — × expansa 472
— — — × fastigiata 472.
— — × media 458.
— — × salicifolia 481.
— — × tomentosa II. 961.
— — typica C. S. 481.
— — — lanceolata C. S. 481.

Spiraea alba typica paniculata C. S. 481.
— albiflora Miq. 473, II. 959.
— — × corymbosa 475.
— — × Douglasi 475.
— — × expansa 472.
— — × fastigiata 472.
— — × japonica 474.
— — × salicifolia 475.
— alpina Ht. 455.
— — Pall. 456.
— — altaica Max. 456.
— altaiensis Laxm. 486.
— ambigua Koch 457.
— amurensis Max. 444.
— anatolica Hausskn. 454.
— angulata Fritsch 477.
— angustifolia Dipp. 483.
— anomala Bat. 442.
— aquilegifolia Pall. 453.
— — Van Houttei Briot 465.
— arbuscula Greene 480, II. **960**
— — × Douglasi 480.
— — pubigera C. S. 480.
— — × pumila 475.
— — typica C. S. 480.
— arcuata Hk. 466.
— argentea Mutis 495.
— arguta Zbl. 451.
— ariaefolia Sm 499.
— assimilis Zbl. 475.
— assurgens Ht. 490.
— Beauverdiana C. S. 478, II. **959**.
— — Steveni C. S. 478, II. **959**
— — typica C. S. 478.
— bella Sims. 471.
— — × fastigiata 471.
— betulaefolia Pall. 478.
— — Aemiliana Koidz. II. 959
— — ajanensis C. S. 478.
— — corymbosa Max. 479.
— — × Douglasi 483.
— — × pumila 475.
— — rosea Gr. 480.
— — typica C. S. 478.
— Billiardii C. S. 481.
— blanda Zbl. 463.
— Blumei Don 465.
— — hirsuta Hemsl. 463.
— — latisepala Hemsl. 465.
— — rotundifolia Hemsl. 465.
— Boissieri C. S. 461.
— brachybotrys Lge. 469.
— brachystachys Dipp. 483.
— bracteata Zbl. 466.
— — dumosa Zbl. 467.
— — × trilobata 465.
— brabuica Boiss. 460.
— — major Boiss. 461.
— brumalis Lge. 472.
— bullata Max. 476.
— — × pumila 475
— Bumalda Koch. 474.
— — ruberrima Lem. 475.
— caespitosa Nutt. 485
— californica Torr. II. 962.
— callosa Thbg. 476.

Spiraea callosa Wall. 471.
— — alba Ht. 473.
— — albiflora Miq. II. 959.
— — Froebeli Ht. 475.
— — macrophylla Hk. et Th. 472
— — robusta Hk. et Th. 472.
— cana W. K. 456.
— — × chamaedrifolia ulmifolia 457.
— — × crenata 455.
— — × hypericifolia 453.
— — × media 458.
— — mollis Beck 457.
— — × obovata 453.
— canescens Don 468.
— — × Douglasii 469.
— — × fastigiata 469.
— — glabra Auct. 466.
— — glauca Zbl. 469.
— — glaucophylla Fr. 469.
— — myrtifolia Zbl. 469.
— — × salicifolia 469.
— — sulphurea Bat. 469.
— cantoniensis Lour. 464.
— — × chinensis 463.
— — lanceata Zbl. 464.
— — × trilobata 465.
— capitata Pursh 443.
— carpinifolia W. 481.
— Cavanillesi Gand. 453.
— chamaedrifolia Bl. 465.
— — L. 459.
— — crataegifolia Zbl. 460.
— — flexuosa Max. 459.
— — × media 458.
— — stenophylla Zbl. 458.
— — transiens Zbl. 460.
— — typica C. S. 460.
— — ulmifolia Max. 460.
— — — × bella 460.
— — — × trilobata 460.
— chinensis Max. 463.
— cinerea Zbl. 453.
— concinna Zbl. 472.
— conferta Zbl. 455.
— confusa ambigua Koch 457.
— conspicua Zbl. 475.
— corymbosa Ht. 460.
— — Raf. 479.
— — Roxbg. 464.
— — × Douglasi 479, 482.
— — × japonica 476.
— — lucida Zbl. 479.
— — — × Douglasii II. 959.
— — typica C. S. 479.
— crenata L. 454.
— — Tbbg. 451.
— — fol. ovatis fl. pl. Tbbg. 450.
— — × media 455.
— — × — mollis 456.
— — × obovata 453.
— — Pallasiana Max. 454.
— — — glabrata Lit. 454.
— — — puberula Lit. 454.
— crenifolia C. A. M. 454.
— — capitata Trautv. 454.
— — mongolica Max. 454

Spiraea crispifolia Hlt. 576.
— cuneifolia glauca Kirch. 469.
— dahurica Max. 458.
— dasyantha Bge. 461.
— — typica C. S. 461.
— — Wawrana C. S. 461.
— decumbens Koch 467.
— — bellunensis Bizz. 467.
— — × Hacqueti 467.
— — mollis Koch 468.
— — Poechi Hsm. 468.
— — tomentosa Poech. 467.
— densiflora Nutt. II. 960.
— — × Douglasii II. 960.
— — × Menziesii II. 960.
— — pubigera C. S. II. 960.
— — typica C. S. II. 960.
— dillormis Zbl. 479.
— discolor Pursh 499.
— — ariaefolia Wats. 499.
— — dumosa Wats. 497.
— — glabrescens Greenm. 497.
— Douglasi Hk. 483.
— — × expansa 472.
— — × fastigiata 472.
— — × japonica 476, 483.
— — Menziesi Presl 483.
— — Nobleana Wats. II. 960.
— — × salicifolia 481.
— — × superba 475.
— — × tomentosa 483.
— dumosa Nutt. 497.
— eriophylla Zbl. II. 961.
— expansa Koch 471, 807.
— — Wall. 471, 807.
— — × japonica 472.
— — nivea Ht. 469.
— fastigiata Wall. 471, 807.
— — × japonica 472.
— Faurieana C. S. 451.
— lissa Ldl. 495.
— flabellata Bertol. 453.
— flagelliformis Ht. 469.
— flexuosa Rchb. 467.
— — Fisch. 458.
— — foliosa C. S. 458.
— — × media 458.
— — stenophylla C. S. 458.
— — typica C. S. 458.
— foliosa Poir. 458.
— Fontenaysi Bill. 469.
— — alba Zbl. 469.
— — rosea Zbl. 469.
— Fortunei Planch. 476.
— — alba Ht. 473.
— Foxii Zbl. 476.
— Fritschiana C. S. 477.
— fulvescens Dipp. 483, II. 961.
— gemmata Zbl. 466.
— Gieseleriana Zbl. 457.
— gracilis Max. 470.
— grandiflora Hook. 494.
— — Lodd. 481.
— — Sweet 488, 808.
— grossulariaefolia Ht. 465.
— Hacqueti Fenzl et Koch 467.
Spiraea Hartwegiana Rydb. II. 961
— Helleri Rydbg. II. 960.
— Hendersonii Pip. II. 961
— Henryi Hemsl. 469.
— hirsuta C. S. 463.
— hispanica Koch 453.
— Hookeri Ht. 471.
— hypericifolia L. 452
— — Ht. 452.
— — acuta Ser. 452.
— — acutifolia Dipp. 452.
— — — × media 452.
— — flabellata Fiori 453.
— — × obovata 452.
— — Plukenetiana Ser. 452.
— — thalictroides Hlt. 452.
— — — Led. 454.
— — truncata Zbl. 452.
— — turkestanica Zbl. 452.
— incisa Thbg. 448.
— inflexa Koch 456.
— intermedia Lem. 475
— japonica L. 475.
— — Sieb. 464.
— — acuminata Fr. 476.
— — alba Ht. 473.
— — albiflora Koidz. 473, II. 959.
— — alpina Max. 475.
— — bullata Mak. II. 959.
— — glabra Koidz. II. 959.
— — ibukiensis Mak. II. 959.
— — laxissima Zbl. 475.
— — macrophylla S.-L. 475.
— — ovalifolia Fr. 476.
— — × salicifolia 476.
— — × superba 475.
— — tomentosa Koidz. II. 959.
— — typica C. S. 475.
— — — atrosanguinea Zbl. 475.
— — — glabra C. S. 475.
— — — ruberrima Zbl. 475.
— — — variegata C. S. 475.
— Kirilowi Rgl. 486.
— laevigata L. 486.
— lanceolata Poir. 464.
— lancifolia Max. 467.
— — Hollmannsegg 467.
— latifolia Borkh. 481, II. 961.
— Laucheana Koch. 464.
— Lemoinei Zbl. 475.
— Lindleyana Wall. 490.
— longifolia Dipp. 483.
— longigemmis Max. 473.
— lucida Dougl. 479.
— — rosea Greene 480.
— macrothyrsa Zbl. 482.
— magellanica Poir. 484.
— magnifica Dipp. 483.
— majestica Dipp. 483.
— Margaritae Zbl. 475.
— Maximowicziana C. S. 461.
— media Schmidt 457.
— — glabrescens Zbl. 457.
— — mollis C. S. 457.
— — — ambigua C. S. 457.
— — — polonicka C. S. 457.

Spiraea media oblongifolia Beck 457.
— — — Ht. 458.
— — — glabrescens Simk. 457.
— — < obovata 453.
— — pilosiuscula Zbl. 457.
— — rotundifolia Nich. 467.
— — sericea Rgl. 457.
— — subintegerrima Zbl. 457.
— Menziesi Hook. 483.
— — Billiardi Zbl. 481.
— mexicana Schiede 495.
— micrantha Hk 472.
— micropetala Zbl. 453, II. 959.
— — acutifolioides Zbl. 452.
— microthyrsa Zbl. 458.
— millefolium Torr. 491.
— Miyabei Koidz. II. 959.
— mollis K. et B. 457.
— mombetsusensis Franch. 457.
— mongolica Ht. 456.
— — Koch. 466.
— — Max. 454.
— monogyna Torr. 445.
— multiflora Zbl. 453.
— — × Thunbergi 451.
— nepalensis Ht. 469.
— nervosa Fr. et Sav. 461.
— Neumanni Ht. 464.
— Nicoudiertii Boss. 456.
— nipponica Max. 466.
— — dumosa C. S. 467.
— — × trilobata 465.
— nivea Zbl. 469.
— Nobleana Hk. 476.
— — Ilt. 479.
— — Zbl. II. 960.
— notha Zbl. 479.
— nudiflora Zbl. 460.
— nutans Ilt. 469.
— oblongifolia Dipp. 483.
— — Rgl. 456.
— — W. K. 457.
— obovata W. et K. 452.
— — dentata C. S. 452.
— — typica C. S. 452.
— opulifolia L. 442.
— — aur.-marg. Ilt. 442.
— — ferruginea T. et Gr. 443.
— — mollis T. et Gr. 443.
— — pauciflora T. et Gr. 444.
— — tomentella Ser. 442.
— ovata Raf. 481.
— oxyodon Zbl. 458.
— pachysandra Ilt. 479.
— pachystachys Zbl. 479.
— Pallasii Don 488.
— pallidiflora Zbl. 484, II. 961
— parvifolia Benth. 484.
— — Bert. 470.
— — Raf. II. 961.
— pauciflora Nutt. 444.
— pectinata T. et Gr. 485.
— pikoviensis Bess. 455.
— pinnata Mnch. 489.
— polonicka Blocki 457.
— praecox Ilt. 455.
Spiraea Pratti C. S. 472.
— prostrata Max. 458.
— pruinosa Zbl. 469.
— prunifolia S. et Z. 450.
— — fl. pl. Bosse 450.
— — plena C. S. 450.
— — typica C. S. 450.
— pubescens Bge. 463.
— — Ldl. 463.
— pulchella Kze. 471.
— pulchra Ht. 479.
— pumila Zbl. 474.
— — × splendens 475.
— pumilionum Zbl. 467.
— pyramidata Greene 482.
— Reevesiana Ldl. 464.
— — fl. pl. Ht. 464.
— revirescens Zbl. 472.
— rhodorlada Lev. 453.
— ribifolia Nutt. 443.
— rosalba Dipp. 481.
— rosea Koch. 480.
— roseata Rydb. II. 960.
— Rosthornii Diels 476.
— ruberrima Koch 472.
— rubra Zbl. 472.
— salicifolia L. 480.
— — alpestris Pall. 481.
— — grandiflora Koch 481.
— — lanceolata T. et Gr. 481
— — latifolia Ait. 481.
— — Lenneana Ht. II. 961.
— — nana Koch 481.
— — paniculata Ait. 481.
— — × superba 475.
— Sanssouciana Koch 476.
— Schinabecki Zbl. 460.
— Schrenkiana C. A. M. 492.
— semperflorens Zbl. 476.
— sericea Turcz. 457.
— sibirica Ht. 452.
— sorbifolia L. 489.
— — alpina Pall. 488.
— — angustifolia Wenz. 491.
— splendens Baum. 480, II. 960.
— — × Douglasi 480.
— stellata Wall. 471.
— Steveni Rydb. II. 959.
— subcanescens Rydb. II. 961.
— subvillosa Rdyb. II. 960.
— superba Zbl. 475.
— syringiflora Lem. 475.
— thalictroides Ilt. 452.
— — Pall. 454.
— Tbunbergi Sieb. 451.
— thyrsiflora Koch 446.
— tomentosa L. 484.
— — angustata C. S. 484.
— tomentulosa Rydbg. II. 959.
— triloba L. 465.
— trilobata L. 465.
— tristis Zbl. 471.
— ulmifolia Scop. 460.
— uniflora Pip. II. 961.
— uratensis Fr. 469.
— vaccinifolia Don 470.

Digitized by Google

Spiraea vaccinifolia Ht. 454.
— — Ldl. 470.
— Van Houttei Zbl. 465.
— — phyllothyrsa Zbl. 465.
— Veitchi Hemsl. 470, II. 959.
— velutina Fr. 472.
— virginiana Britt. 479.
— Watsoniana Zbl. II. 960.
— Wilsoni Duth. II. 959.
— yunnanensis Fr. 463.
— Zabeliana C. S. 466.
Spiraeanthus Max. 492.
— Schrenkianus Max. 492.
Spiltgerbera japonica Miq. II. 905.
Sponia nudiflora S. et Z. 227.
Stachyurus S. et Z. II. 362.
— chinensis Franch. II. 363, 1038.
— himalaicus Hook. et Thoms. II. 363.
— japonica Ilt. II. 363.
— praecox S. et Z. II. 363, 1038.
— — gracilis Ilt. II. 363.
— salicifolius Franch. II. 364.
— yunnanensis Franch. II. 363.
— — pedicellatus Rehd. II. 1038.
Staehelina L. II. 767.
— arborescens L. II. 767.
— unifloseulosa Sibth. et Sm. II. 767.
Staphylea L. II. 187.
— Bolanderi Gray II. 188, 1027.
— Bumalda S. et Z. II. 189.
— colchica Stev. II. 191.
— — Coulombieri Zabel II. 191.
— — — grandiflora Zbl. II. 191.
— — — macrocarpa Zbl. II. 191.
— — Hooibrencki Zbl. II. 191
— — Kochiana Medw. II. 191.
— — lasiandra Dipp. II. 191.
— — × pinnata II. 191.
— Coulombieri Andr. II. 191.
— elegans Zabel II. 191.
— — Hessei Zbl. II. 191.
— Emodi Wall. II. 190.
— Francheti Boiss. II 188.
— holocarpa Hemsl. II. 189, 1027.
— lobocarpa Ht. II. 1027.
— pinnata L. II. 191.
— — lasiandra Zbl. II. 191.
— trifolia L. II. 190.
— — pauciflora Rehd. II. 190.
— — typica C. Schn. II. 190.
— trifoliata Payer II. 190.
— — pauciflora Zbl. II. 190.
Stauntonia DC. 295.
— chinensis DC. 295.
— hexaphylla Decne. 295.
Stauracanthus Lk. II. 57.
— aphyllus Lk. II. 57.
Stellariopsis santalinoides Rydb. 522.
Stellera L. II. 405.
— Alberti Regel II. 405.
Stephanandra S. et Z. 448.
— chinensis Hance 449.
— flexuosa S. et Z. 448.
— gracilis Fr. et S. 449.
— incisa Zbl. 448.
— Tanakae Fr. et S. 449
Stephania hernandifolia Walp. 325.
— japonica Miers 324.
Stephanocarpus monspeliensis Spach II 347.
Sterculia L. II. 392.
— platanifolia L. II. 392.
Stereoxylon R. et P. 397.
— rubrum R. et P. 398.
— virgatum R. et P. 399.
Stevia Cav. II. 1061
— salicifolia Cav. II. 1062.
Stewartia L. (= Stuartia) II. 330.
Stranvaesia Ldl. 712.
— amphidoxa C. S. 713, II. 999.
— Calleryana Decne. 712.
— Davidiana Decne. 713.
— — undulata R. et W. II. 999.
— digyna S. et Z. 710.
— glauca Baill. 713.
— glaucescens Ldl. 713.
— — yunnanensis Fr. 713
— Henryi Diels 713, II. 999.
— Nussia Decne. 713.
— Rostborni C. S. 713
— undulata Decne. 713, 999.
Strobilanthes Bl. II. 1054.
— Dalhansianus Cl. II. 1054.
Stuartia L. II. 330, 1035
— grandiflora Ht. II. 331.
— japonica Ht. II. 331, 1036.
— — grandiflora Ilt. II. 331.
— Malachodendron L. II. 1037.
— monadelpha S. et Z. II. 1035.
— monogyna Ilt. II. 1035.
— pentagyna L'Hér. II. 330.
— pseudocamellia Maxim. II. 330.
— serrata Maxim. II. 331.
— virginica Cav. II. 1037.
Styphnolobium affine Walp. II. 19.
— japonicum Schott II. 20.
Styrax L. II. 577.
— americanus Lam. II. 579.
— — genuinens Perk. II. 580.
— — pulverulentus Perk. II. 580.
— californicum Torr. II. 580.
— grandiflorum Gmel. II. 580.
— grandifolius Ait. II. 580.
— Hemsleyanus Diels II. 578, 1047.
— japonicus S. et Z. II. 580.
— laevigatum Ait. II. 580.
— Obassia S. et Z. II. 580.
— officinalis L. II. 580.
— officinarum Crtz. II. 580.
— Perkinsiae Rehd. II. 1047.
— pulverulentum Mchx. II. 580.
— serrulatus Ht. II. 580.
— Shiraianus Mak. II. 578.
— Wilsonii Rehd. II. 1047.
Suaeda Forsk. 267.
— fruticosa Forsk. 267.
Svida Small II. 443.
— alternifolia Small. II. 439.
— candidissima Small II. 441.
— microcarpa Small II. 443.
— Priceae Small II. 443.
— stricta Small II. 442.

Swainsonia salsula Taub. II. 85.
Sycopsis Oliv. 433.
— Griffithiana Oliv. 443.
— sinensis Oliv. 433, II. 957.
— — integrifolia Diels 433.
Symphoria conglomerata Pers. II. 669.
— glomerata Pursh II 670.
— occidentalis R. Br. II. 671.
Symphoricarpus Juss. II. 669.
— acutus Dipp. II. 673, 1058.
— Austinae Esstw. II. 674.
— ciliatus Nutt. II. 673.
— fragrans Nels. et Kena. II. 675.
— glabratus Esstw. II. 674.
— glaucescens K. II. 673.
— glaucus Eastw. II. 673.
— Heyeri Dipp. II. 671.
— hyalinus Hell. II. 672.
— longiflorus Gray II. 669, 675.
— microphyllus K. II. 673.
— mollis Nutt. II. 673.
— — acutus Gray II. 673.
— montanus Kuntb II. 673.
— occidentalis Hook. II. 670.
— — Heyeri Dieck II. 671.
— — × racemosus II. 671.
— orbiculatus Moench II. 669.
— — spicatus Gray II. 669.
— — variegata Cow. II. 669.
— oreophilus Gray II. 669, 674.
— ovatus Ht. II. 673.
— Parishii Rydb. II. 673.
— parvifolius Eastw. II. 674.
— pauciflorus Britt. II. 672.
— racemosus Michx. II. 672.
— — laevigatus Fernald II. 672.
— — pauciflorus Robb. II. 672.
— rotundifolius Gray II. 669, 674.
— sinensis Rehd. II. 673.
— spicatus Engelm. II. 669.
— tetonensis Nels. II. 673.
— utahensis Rydb. II. 673.
— vaccinioides Rydb. II. 673.
— vulgaris Mchx. II. 669.
Symplocos Jacqu. II. 576.
— crataegoides Buch.-Ham. II. 576.
— japonica A. DC. II. 576, 1047.
— lucida S. et Z. II. 1047.
— paniculata Wall. II. 576.
— tinctoria L'Hérit. II. 577.
Syringa L. II. 771, 1062.
— affinis Heary II. 773.
— — Giraldi C. Schn. II. 774.
— afghanica C. Schn. II. 775.
— amurensis Rupr II. 784.
— Bretschneideri Lem II 781.
— — hybrida Henr. II. 781.
— — rosea Browne II. 781.
— capitata Gmel II. 775.
— chinensis Willd. II. 774.
— dichroa Borb. II. 1062.
— Dielsiana C. Schn. II. 778.
— dubia Pers. II. 774.
— Emodi Wall. II. 783.
— — pilosissima C. Schn II. 782.
— — roseo Cornu II. 781.
Syringa Giraldi Spr. II. 774, 1062.
— Giraldiana C. Schn. II. 780.
— Henryi C. Schn. II. 782.
— hyacinthiflora Rehd. II. 773.
— japonica Decne. II. 783.
— Josikaea Jacqu. II. 782.
— — eximia Froeb. II. 782.
— — hybrida Henry II. 781.
— — „H. Zabel" Froeb. II. 782.
— — × villosa II. 781.
— Julianae C. Schn. II. 777.
— Koehneana C. S. II. 1063.
— Komarowi C. Schn. II. 783, 1064.
— ligustrina Ht. II. 784.
— Meyeri C. S. II. 1062.
— microphylla Diels II. 778.
— — glabriuscula C. S. II. 1062.
— oblata Ldl. II. 772.
— — alba Ht. II. 774.
— — × vulgaris II. 773.
— pekinensis Rupr. II. 784.
— persica L. II. 775.
— — alba Ait. II. 775.
— — laciniata Ait. II. 775.
— — rothomagensis Mirb. II. 774.
— — typica C. Schn. II. 775.
— — × vulgaris II. 774.
— pinnatifolia Hemsl. II. 775, 1062.
— Potanini C. Schn. II. 777.
— pubescens Ht. II. 780.
— — Turcz. II. 776.
— — tibetica Bat. II. 776.
— — typica Turcz. II. 776.
— — — pilosa C. Schn. II. 776.
— reflexa C. Schn. II. 779, 1063.
— Rehderiana C. S. II. 1064.
— rothomagensis A. Rich. II. 774.
— rotundifolia Decne II. 784.
— sempervirens Franch. II. 771.
— suspensa Thbg. II. 771.
— Sweginzowi Koeh. et Ling. II. 780, 1063.
— Sargentiana C. S. II. 1063.
— tetraoloba C. S. II. 1063.
— tomentella Bur. et Franch. II. 782, 1064.
— — Koeh. II. 1063.
— velutina Bur. et Fr. II. 1062.
— — Ht. II. 1063.
— — Komarow II. 778, 1064.
— verrucosa C. S. II. 1063.
— villosa Decne. [et Auct.] II. 776.
— — Vahl II. 780.
— — glabra C. Schn. II. 780.
— — hirsuta C. Schn. II. 780.
— — „Lutèce" Ht. II. 781.
— — ovalifolia DC. II. 776.
— — rosea C. Schn. II. 781.
— — typica C. Schn. II. 780.
— — — glabra C. Schn. II. 780.
— — — subhirsuta C. Schn. II. 780.
— vulgaris L. II. 774.
— — alba Ait. II. 774.
— — coerulea Ait. II. 774.
— — purpurea DC. II. 774.
— — rubra Lodd. II. 774.
— — violacea Ait. II. 774.

Syringa Wilsonii C. S. II. 1064.
— Wolfi C. Schn. II. 782.
— yunnanensis Franch. II. 780.
Syspone sagittalis Grisb. II. 36.

Tamarix L. II. 341.
— africana Poir. II. 344.
— chinensis Lour. II. 342.
— — S. et Z. II. 343.
— — plumosa Ht. II. 343.
— dahurica Willd. II. 345.
— — italica Avé-Lall. II. 345.
— elegans Spach II. 343.
— gallica L. II. 343.
— — narbonensis Ehrbg. II. 343.
— germanica L. II. 344.
— hispida Ht. II. 343.
— — Willd. II. 341.
— — aestivalis Ht. II. 343.
— japonica Ht. II. 343.
— — plumosa Ht. II. 343.
— juniperina Bge. II. 343.
— odessana Stev. II. 342.
— Pallasii Desv. II. 343.
— parviflora DC. II. 344.
— — × tetrandra II. 344.
— pentandra Pall. II. 342.
— plumosa Ht. II. 343.
— tetrandra Pall. II. 344.
— viridis Ht. II. 343.
Taonabo Aubl. II. 329.
— japonica Szys. II. 329.
Tapiscia Oliv. II. 1026.
— sinensis Oliv. II. 1026.
Tecoma chinensis Koch II. 623.
— grandiflora Delaun. II. 623.
— — atrosanguinea Rehd. II. 623.
— — aurantiaca Dipp. II. 623
— — Princei Dipp. II. 623.
— — Thunbergi Rehd. II. 623.
— hybrida Jouin II. 1053.
— intermedia Schelle II. 623.
— Princei coccinea grandiflora Ht. II 623.
— radicans Juss. II. 623.
— — atropurpurea Kirchn. II. 623.
— — minor Kirchn. II. 623
— — praecox Rehd. II. 623.
— — speciosa Dipp. II. 623.
— Thunbergi Ht. II. 623.
Teline Webb II. 41.
— maderensis Webb II. 41.
— stenopetala Webb II. 41.
Ternstroemia Mutis II. 329.
— japonica Thbg. II. 329.
Tetracentron Oliv. II. 927.
— sinense Oliv. II. 927.
Tetradymia DC. II. 765.
— canescens DC. II. 765.
— glabrata Gray II. 765.
— Nuttalii Torr. et Gr. II. 765.
— spinosa Hook. et Arn. II. 765.
— squamata Gray II. 765.
Tetraglochin Poepp. 535.
— buxifolium Presl 535.
— caespitosum Phil. 535.
Tetraglochin microphyllus Phil. 535.
— strictum Poepp. 535.
Tetranthera Jacq. 350.
— californica H. et A. 349.
— causticans Pasq. 349.
— glauca Wall. 351.
— japonica Sprgl. 351.
Tetrastigma Planch. II. 312, 1032.
— capreolatum Koeb. II. 312.
— Hemsleyanum Diels et Gilg II. 313.
— hypoglaucum Planch. II. 313.
— obtectum Planch. II. 313.
— Potentilla C. S. II. 313.
— serrulatum Planch. II. 312.
Tetrathyrium Benth. 433, 807.
— subcordatum Benth. 433.
Teucrium L. II. 598.
— aureum Schreb. II. 599.
— capitatum L. II. 599.
— Chamaedrys L. II. 599.
— commune Rouy II 599.
— creticum L. II. 599.
— flavum L. II. 599.
— fruticans L. II. 600.
— byssopifolium Schreb. II. 599.
— lucidum L. II. 599.
— marum L. II. 599.
— montanum L. II. 598.
— — hirsutum Boiss. II. 598.
— — pannonicum Briqu. II. 598.
— — supinum Ten. II. 598.
— officinale Lam. II. 599.
— pannonicum Kern. II. 598.
— Polium L. II. 599.
— rosmarinifolium Lam. II. 599.
— supinum L. II. 598.
Thea L. II. 1035
— japonica Baill. II. 1035.
— Sasanqua Nois. II. 1035.
Thermopsis laburnifolia Don II. 22.
— nepaulensis DC. II. 22.
Thesium elegans Roch. 247.
Thlaspi cordatum Desf. II. 928.
Thymelaea All. II. 393.
— Tartonraira All. II. 393.
— tinctoria Endl. II. 393.
Thymus L. II. 605.
— angustifolius Pers. II. 606.
— — empetroides Wimm. et Grab. II. 606.
— — ericoides Wimm. et Grab. II. 606.
— carniolicus Borb. II. 606.
— Chamaedrys alpestris Tausch II. 606.
— comosus Hauff. II. 606.
— Hackelianus Opiz II. 606.
— hirsutus M. B. II. 606.
— Kosteleckyanus Opiz II. 606.
— lanuginosus Mill. II. 606.
— marginatus Kern. II. 606.
— Marshallianus Willd. II. 606.
— montanus W. K. II. 606.
— ovatus Mill. II. 606.
— pannonicus All. II. 606.
— parvifolius Opiz II. 606.
— polytrichus Kern. II. 606.
— praecox Opiz II. 606.

Thymus pulcherrimus Schur II. 606.
— Serpyllum L. II. 606.
— — comosus Briqu. II. 606.
— — lanuginosus Briqu. II. 606.
— — marginatus Briqu. II. 606.
— — ovatus Briqu. II. 606.
— — polytrichus Briqu. II. 606.
— — Serpyllum Briqu. II. 606.
— — subcitratus Briqu. II. 606.
— silvicola Wimm. et Grab. II. 606.
— subcitratus Schreb. II. 606.
— sudeticus Opiz II. 606.
— vulgaris L. II. 605.
— — albus C. Schn. II. 606.
— — angustifolius C. Schn. II. 606.
— — latifolius C. Schn. II. 606.
Tigarea tridentata Pursh 528.
Tilia L. II. 367.
— aenobarba Borb. II. 376.
— alba Ait. II. 386.
— — Koch II. 386.
— — Mchx. II. 387.
— — pendula Ht. II. 386.
— — petiolaris Loud. II. 386.
— — viridis Bayer II. 374.
— americana L. II. 381.
— — Mill. II. 381.
— — × cordata II. 374.
— — gigantea Ht. II. 381.
— — heterophylla Loud. II. 387.
— — × heterophylla II. 382.
— — laxiflora Ht. II. 382.
— — pendula Ht. II. 386.
— — × petiolaris II. 381.
— — × platyphyllos II. 379.
— — pubescens Dipp. II. 381.
— — — Ht. II. 382.
— — superba hybrida Ht. II. 381.
— — × tomentosa II. 381.
— — vestita V. Engl. II. 381.
— — murensis Rupr. II. 374.
— — acuminatissima V. Engl. II. 375.
— — oligantha V. Engl. II. 375.
— — polyantha V. Engl. II. 375.
— apiculata Court. II. 376.
— argentea Desf. II. 386.
— aurea Jüngst II. 376.
— australis Small II. 382.
— Baroniana Diels II. 387.
— — investita V. Engl. II. 388.
— Beaumontia pendula Ht. II. 374.
— begonifolia Stev. II. 379.
— betulaefolia Holm. II. 372.
— Blockiana Borb. II. 373.
— Braunii Simonk. II. 376.
— canadensis Mchx. II. 381.
— carlsruhensis Simk. II. 379.
— caroliniana Mill. II. 381, 382.
— caucasica Rupr. II. 379.
— chinensis Maxim. II. 384.
— corallina Host II. 377.
— cordata Mill. II. 372.
— — acuminatissima C. S. II. 373.
— — asymetra sibirica Engl. II. 372.
— — aureo-variegata C. S. II. 373.
— — betulaefolia C. S. II. 372.
Tilia cordata Blockiana C. S. II. 373.
— — borealis C. S. II. 372.
— — cordifolia C. S. II. 372.
— — cymosa C. S. II. 372.
— — japonica Miqu. II. 372.
— — major vitifolia V. Engl. II. 373.
— — mandschurica Maxim. II. 375.
— — ovalifolia C. S. II. 373.
— — × petiolaris II. 374.
— — × platyphyllos II. 374.
— — × rubra dasystyla II. 374.
— — sibirica Maxim. II. 372.
— — × tomentosa II. 374.
— — typica Beck II. 372.
— — — longibracteata C. S. II. 372.
— — vitifolia C. S. II. 372.
— cordifolia Bess. II. 376.
— corinthiaca Bosc II. 381.
— corylifolia Host II. 378.
— cucullata Jacqu. II. 376.
— dasystyla Ht. II. 374.
— — Stev. II. 379.
— dictyoneura V. Engl. II. 369.
— eburnea Ashe II. 387.
— euchlora Koch II. 374.
— — × petiolaris II. 374.
— — × platyphyllos II. 374.
— eudimitiata C. S. II. 374.
— europaea L. II. 374.
— — asplenifolia Ht. II. 378.
— — borealis Wahlb. II. 372.
— — dasystyla Loud. II. 374.
— — filicifolia Ht. II. 378.
— — laciniata Ht. II. 378.
— — pallida Wierzb. II. 374.
— flaccida Host II. 379.
— flava Wolny II. 379.
— flavescens A. Br. II. 374.
— floribunda A. Br. II. 374.
— floridana Small II. 382.
— Franchetiana C. S. II. 386.
— gigantea Ht. II. 381, 382, 387.
— glabra Vent. II. 381.
— grandifolia Ehrh. II. 376.
— — asplenifolia Ht. II. 378.
— — filicifolia Ht. II. 378.
— — laciniata Ht. II. 378.
— — latebracteata Ortm. II. 378.
— hegyensensis Simk. II. 374.
— Henryana Szysz. II. 388.
— heterophylla Vent. II. 387.
— heterophylla Ht. II. 382.
— hirsuta Presl II. 376.
— Hoffmanniana Op. II. 379.
— hollandica Ht. II. 374.
— Hooglii Rose II. 384.
— hybrida Bechst. II. 374.
— — superba Ht. II. 382.
— inciso-dentata Ht. II. 381.
— intermedia Boiss. II. 381.
— — Host II. 378.
— — acuminatissima Rehb. II. 373.
— Jurányiana Simk. II. 374.
— — eudimitiata Simk. II. 374.
— japonica Simk. II. 371.
— — × kiusiana II. 369.

Tilia Kinashi Lév. et Vant. II. 385.
— kiusiana Mak. et Shiras. II. 369.
— latebracteata Host II. 378.
— latifolia Salisb. II. 381.
— laxiflora Hentze II. 381.
— — Mchx. II. 384.
— leptophylla Small II. 384.
— longidentata Ht. II. 381.
— longifolia Ht. II. 381, 387.
— — dentata Ht. II. 381.
— — incisa Ht. II. 382.
— macrophylla Ht. II. 381, 382.
— — Mér. II. 387.
— mandschurica Rupr. et Maxim. II. 384
— — Szysz. II. 387.
— — pekinensis V. Engl. II. 384.
— Maximowicziana Shir. II. 385, 1038
— Maximowiczii Bak. II. 375.
— mexicana Scheele II. 383.
— Michauxi Nutt. II. 387.
— microphylla Vent. II 374.
— Miqueliana Maxim. II. 385.
— — Sarg. II. 385.
— — chinensis Szysz. II. 384
— — gracilis V. Engl. II. 386.
— Miyabei Jack II. 1038.
— mollis Ortm. II. 376.
— — Spach II. 376.
— Moltkei Späth II. 381.
— mongolica Maxim. II. 369.
— morifolia Simk. II. 373.
— multiflora Ledeb. II. 379.
— — Simk. II. 374.
— mutabilis Host II. 377.
— neglecta Spach II. 381.
— nigra Borkh. II. 381.
— — macrophylla Ht. II. 381.
— — vestita A. Br. II. 381.
— obliqua Host II. 379.
— — Opiz II. 376.
— obliquaefolia Ortm. II. 376.
— occidentalis Rose II. 383.
— Oliveri Szysz. II. 387, 1038.
— orbicularis Carr. II. 374.
— pallida Simk. II. 374.
— parvifolia Ehrh. II. 374.
— — cymosa Rehb. II. 372
— paucicostata Maxim. II. 371.
— — firma V. Engl II. 371.
— — tenuis V. Engl. II. 371.
— pauciflora Hayne II. 376.
— pekinensis Rupr. II. 384.
— pendula V. Engl. II. 387.
— petiolaris DC. II. 386.
— — × pubescens II. 384.
— — × tomentosa II. 386.
— pilosa Presl II. 376.
— platyphyllos Scop. II. 376.
— — asplenifolia Ht. II. 378
— — Brannii Beck II. 376.
— — — C. S. II. 376.
— — corallina Simk. II. 377.
— — cordifolia C. S. II. 376.
— — — cucullata C. S. II. 376.
— — — multibracteata C. S. II. 376.
— — — oxycarpa C. S. II. 376.
Tilia platyphyllos cordifolia sphaerocarpa C. S. II. 376.
— — corylifolia Simk. II. 378.
— — eugrandifolia C. S. II. 376.
— — euplatyphyllos C. S. II. 376.
— — — corallina C. S. II. 377.
— — — mutabilis C. S. II. 377.
— — — — latebracteata C. S. II. 378.
— — — tenuifolia C. S. II. 377.
— — — vitifolia C. S. II. 377.
— — filicifolia Ht. II. 378.
— — Hoffmanniana Simk. II. 379.
— — laciniata Ht. II. 378.
— — multibracteata O. Kuntze II. 376.
— — mutabilis Simk. II. 377.
— — obliqua Simk. II. 379.
— — oxycarpa Rehb. II. 376.
— — pendula Ht. II. 386.
— — praecox Simk. II. 379.
— — pseudorubra C. S. II. 378.
— — — corylifolia C. S. II. 378.
— — — Hoffmanniana C. S. II. 379.
— — — obliqua C. S. II. 379.
— — — praecox C. S. II. 379.
— — — pseudoobliqua C. S. II. 378.
— — — pyramidalis C. S. II. 378.
— — — — latissima C. S. II. 378.
— — pyramidalis Simk. II. 378.
— — — pseudoobliqua Simk. II. 378.
— — × rubra II. 379.
— — sphaerocarpa Rehb. II. 376.
— — tenuifolia Simk. II. 377.
— — vitifolia Simk. II. 377.
— praecox A. Br. II. 379.
— — Host II. 379.
— Preslii Op. II. 377.
— Pringlei Rose II. 383.
— pseudoobliqua Simk. II. 378.
— pubescens Ait. II. 384.
— — Koch II. 382.
— — leptophylla Vent. II. 381.
— pyramidalis Host II. 378.
— — latissima Borb. II. 378.
— — sphenophylla Borb. II. 378
— Richteri Borb. II. 374.
— rotundifolia Vent. II. 386.
— rubra DC. II. 379.
— — Ht. II. 378.
— — V. Engl. II. 379.
— — begonifolia C. S. II. 379.
— — dasystyla C. S. II. 379.
— — euchlora Dipp. II. 374.
— — multiflora C. S. II. 379.
— — praecox V. Engl. II. 381.
— — typica C. S. II. 379.
— semicuneata Rupr. II. 372.
— septentrionalis Rupr. II. 372.
— sibirica Bay. II. 372.
— spectabilis Dipp. II. 384.
— — Host II. 377.
— sublanata Simk. II. 374.
— subparvifolia Borb. II. 374.
— sylvestris Desf. II. 374.
— — cordifolia Spach II. 372.
— — major Spach II. 372.
— — ovalifolia Spach II. 373.

Tilia Taqueti C. S. II. 372.
— tenuifolia Host II. 377.
— tomentosa Moench II. 386.
— — obliqua Thüm. II. 386.
— — pendula Ht. II. 386.
— — petiolaris Kirchn. II. 386.
— — subvitifolia Borb. II. 386.
— truncata Spach II. 384.
— Tuan Szysz. II. 389.
— — Cavalieri V. E. et Lév. II. 389.
— Tučekii Op. II. 377.
— ulmifolia Scop. II. 374.
— — acuminatissima Simk. II. 373.
— — betulaefolia Simk. II. 372.
— — cymosa Simk. II. 372.
— — fol. variegatis Kirchn. II. 373.
— — longibracteata Kirchn. II. 372.
— — major Simk. II. 372.
— — ovalifolia Simk. II. 373.
— — parvifolia Simk. II. 372.
— velutina K. K. Mack. II. 381.
— vestita H. Br. II. 381.
— viridis Simk. II. 374.
— vitifolia Host II. 377.
— — Wierzb. II. 372.
— vulgaris Hayne II. 374.
— — Hal. II. 381.
Tinus laurifolius Borkh. II. 653.
Tolmiea Hook. II. 467.
Toona Roem. II. 131.
— sinensis Roem. II. 132, 1019.
Torminaria Roem. 696.
— Clusii Roem. 696.
— florentina Roem. 724.
— latifolia Dipp. 695.
— torminalis Dipp. 696.
Toxicodendron crenatum Mill. II. 149.
— diversilobum Greene II. 149.
— glabrum Mill. II. 150.
— hesperium Greene II. 149.
— orientale Greene II. 151.
— pubescens Mill. II. 149.
— Rydbergi Greene II. 149.
— vulgare Mill. II. 150.
Toxylon Ral (= Ioxylon) 239, II. 905.
Trachelospermum Lem. II. 851.
— divaricatum K. Schum. II. 851.
— jasminoides Lem. II. 851.
Tragopyrum lanceolatum M. B. 257.
— — latifolium Rgl. 257.
— spinosum Presl 255.
Trianodendron caspicum Ht. II. 12.
Trichothalamus lignosus Lehm. 522.
Tricuspidaria dependens Hook. II. 364.
— — R. et P. II. 365.
Triosteum L. II. 632.
Tripetalela S. et Z. II. 467.
— bracteata Maxim. II. 467.
— paniculata S. et Z. II. 467, 1042.
Triphasia trifoliata Seeligm. II. 129.
Tripterygium Hk. II. 1026.
— Wilfordi Hk. II. 1026.
Trochodendron S. et Z. 269.
— aralioides S. et Z. 269.
Trochostigma S. et Z. II. 327.
— arguta S. et Z. II. 327.
Trochostigma polygama S. et Z. II. 327.
— repanda S. et Z. II. 327.
— rufa S. et Z. II. 327.
— volubilis S. et Z. II. 327.
Tsuslophyllum Tanakae Maxim. II. 510.

Ugni Turcz. II. 1040.
— Molinae Turcz. II. 1040.
Ulex L. II. 57.
— aphyllus Lk. II. 57.
— Armoricanus Mab. II. 58.
— australis Clem. II. 59.
— europaeus L. II. 58.
— — autumnalis Zbl. II. 58.
— — biferus Taslé II. 58.
— — fl. pl. Loud. II. 58.
— — Galli Rouy II. 59.
— — nanus longispinosus Rouy II. 59.
— — parviflorus tenuior Rouy II. 59.
— — strictus Webb. II. 58.
— — typicus C. S. II. 58.
— — — biferus C. S. II. 58.
— — — plenus C. S. II. 58.
— Galli Pl. II. 59.
— genistoides Brot. II. 57.
— intermedius Le Gall II. 59.
— nanus Forst. II. 59.
— — longispinosus C. S. II. 59.
— parvillorus Pourr. II. 59.
— provincialis Lois. II. 59.
— strictus Mack. II. 58.
— Webbianus Coss. II. 57.
— Welwitschianus Planch. II. 59.
Ulmus L. 212, II. 901.
— Abelicea Sibth. et Sm. 226.
— alata Mchx. 214, II. 901.
— alba Ht. 220.
— — Ral. 213.
— americana L. 213.
— — aurea Rehd. II. 901.
— — × laevis 213.
— — nigricans Dipp. 213.
— — pendula Ait. 213, II. 901.
— — variegata Ht. 213.
— arbuscula Wolf II. 902.
— Bergmanniana C. S. II. 902.
— campestris Hemsl. II. 902.
— — Huds. 805.
— — L. 218, 219, 805. II. 902.
— — antarctica Rehd. 805.
— — Berardi Rehd. 805.
— — betulifolia nigrescens Ht. 220.
— — cornubiensis Loud. 220.
— — lastigiata Ht. 220.
— — fol. arg. marg. Kirchn. 220.
— — glabra Dum.-Cours. II. 902.
— — — laevis C. S. II. 902.
— — — minor A. et Gr. II. 902.
— — — vulgaris A. et Gr. II. 902.
— — japonica Sarg. II. 902.
— — Koopmanni Späth 220.
— — laevis Planch. 805.
— — — Spach II. 902.
— — „Louis v. Houtte“ Ht. 220.
— — microphylla fol. alb. dent. Ht. 220.

Ulmus campestris monumentalis Kirchn. [et Rehd.] 805.
— — myrtifolia purpurea Ht. 220.
— — nuda A. et Gr. II. 902.
— — — Koch II. 902.
— — pendula Dipp. 220.
— — punctata S.-L. 220.
— — purpurea Ht. 218.
— — Rueppelii Ht. 218.
— — suberosa Wahlbg. II. 902.
— — — pendula Ht. 220.
— — turcestanica Rgl. 220.
— — umbraculifera Rehd. 220, 805.
— — — Trautv. 220.
— — — gracilis Späth 220.
— — viminalis Loud 220.
— — — antarctica Ht. 220.
— — — gracilis Ht. 220.
— — virens Ht. 221
— castaneifolia Hemsl. 216, II. 904.
— chinensis Pers. 222.
— ciliata Ehrh. 213.
— corylifolia Host 220.
— crassifolia Nutt. 222.
— crispa W. 217.
— Davidiana Pl. 216, II. 904.
— Dippeliana C. S. 218, II. 902.
— — bataviana C. S. 218.
— — Dampieri C. S. 218.
— — muscaviensis C. S. 219.
— — purpurea C. S. 218.
— — Rueppelii C. S. 218.
— — tricolor C. S. 219.
— — vegeta C. S. 218.
— — Wredei C. S. 218.
— effusa W. 213.
— elliptica K. Koch 216.
— erosa Wall. 216.
— Escaillardi Ht. 217.
— excelsa Borkh. 218.
— exoniensis Ht. 218.
— floridana Chapm. 213.
— Fordii Ht. 218.
— fulva Ht. 218.
— — Mchx. 216.
— gigantea Ht. 218
— glabra Huds. 805, II. 901.
— — Mill. 219, 805, II. 902.
— — concavaefolia Dipp. 217.
— — latifolia Ldl. 219.
— — pendula C. S. 220.
— — — albo-dentata C. S. 220.
— — — antarctica C. S. 220.
— — — viminalis C. S. 220.
— — — Wentworthii C. S 220.
— — pubescens C. S. 220.
— — — argenteomarginata C. S. 220.
— — — Berardi C. S. 220.
— — — purpurascens C. S. 220.
— — — tortuosa C. S. 220.
— — — Van Houttei C. S. 220.
— — stricta C. S. 220.
— — — modiolina C. S. 220.
— — — monumentalis C. S. 220.
— — — sarniensis C. S. 220.
— — — virgata C. S. 220.
Ulmus glabra suberosa Guerke 220.
— — — propendens C. S. 220.
— — — turcestanica C. S. 220.
— — × scabra 218.
— — scampstoniensis Kirchn. 220.
— — typica C. S. 220. II. 902.
— — — corylifolia C. S. 220.
— — — gracilis C. S. 220.
— — — minor C. S. 220.
— — — nigrescens C. S 220.
— — — punctata C. S. 220.
— — — scampstoniensis C. S. 220.
— — — tiliaefolia C. S. 220.
— — — umbraculifera C. S. 220.
— — — Koopmanni C. S. 220.
— — vegata Loud. 218, II. 902.
— glaucescens Fr. II. 904.
— Heyderi Ht. 216.
— hollandica Ht. 218.
— — Mill. 218.
— Hookeriana Planch. 222.
— japonica Sarg. II. 902.
— keaki Sieb. 226.
— laevis Ht. 220.
— — Pall. 213, II. 901.
— — punctata C. S. 213.
— lancifolia Roxhg. 222, II. 904.
— latifolia Ht. 218.
— — Mnch. 218.
— macrocarpa Hance 216, II. 904.
— macrophylla aurea Ht. II. 901.
— major Sm. 218, II. 902.
— — heterophylla Max. et R. 218.
— microphylla Pers. 220.
— minor Mill. 220, II. 902.
— montana Hemsl. II. 902.
— — With. 216.
— — crispa Loud. 217.
— — Dampieri Kirchn. 218.
— — — Wredei Ht 218.
— — Escaillardi Ht. 217.
— — fastigiata Loud. 218.
— — fulva Ht. 218.
— — gigantea Ht. 218.
— — hollandica Ht. 218.
— — horizontalis Kirchn. 218.
— — laciniata Trautv. 218.
— — latifolia Ht. 218.
— — Pitteursii Ht. 218.
— — superba Ht. 218.
— — tricolor Ht. 219.
— — vegeta Ht. 218.
— nemoralis Ht. 219.
— nigra Lodd. 218.
— nitens Moench 805, II. 902.
— nuda Ehrh. 218.
— parvifolia Jacq. 222.
— pedunculata Fong. 213.
— pendula Lodd. 218.
— — W. 213.
— pinnato-ramosa Koch. II. 904.
— — aurescens Dieck II. 904.
— Pitteursii Ht. 218.
— Plotii Druce II. 902
— procera Salisb. II. 902.
— pumila L. 221.

Ulmus pumila Pall. 220
— — × scabra II. 902.
— racemosa Borkh. 213.
— — Thomas 214.
— rubra Mchx. 216.
— scabra Mill. 216, 805, II. 901.
— — lastigiata C. S. 218.
— — horizontalis C. S. 218.
— — major Gürke 218, II. 901.
— — — macrophylla Dipp. 217.
— — — nana Dipp. 218.
— — nana C. S. 218.
— — — monstrosa C. S. 218.
— — pendula C. S. 218.
— — — serpentina C. S. 218.
— — pyramidalis K. Koch 218.
— — tricuspis K. Koch 218.
— — typica C. S. 217.
— — — atropurpurea C. S. 218.
— — — aureo-variegata C. S. 217.
— — — concavaefolia C. S. 217.
— — — crispa C. S. 217.
— — — crispa-aurea C. S. 217.
— — — firma C. S. 217.
— — — heterophylla C. S. 218.
— — — luteseens C. S. 217.
— — — macrophylla C. S. 217.
— — — nigra C. S. 218.
— sarniensis Lodd. 220.
— serotina Sarg. 222.
— sibirica Ht. 216.
— stricta Ldl. 220.
— superba Ht. 218.
— surculosa Stokes II. 902.
— Thomasii Sarg 214
— tiliaefolia Host 220.
— tomentosa Ht. 216.
— tortuosa Host 220.
— — Lodd. 220.
— urticaefolia Aud. 217.
— vegeta Ilt. 218.
— — Ley II. 902.
— viminalis Ilt. 219.
— — Lodd. 220.
— Wallichiana Pl. 216, II. 902.
— Webbiana Ilt. 217.
— Wilsoniana C. S. II. 904
Umbellularia californica Nutt. 349, II. 928.
Unedo edulis Hoffm. II. 541.
Ungnadia Endl. II. 258.
— speciosa Endl. II. 258.
Urostelma chinensis Bge. II. 854.
Urtica biloba Ilt. II. 905.
— nivea L. 246.
Uvaria japonica L. 342.

Vaccinium L. II. 548.
— alaskaense How. II. 559.
— amoenum Ait. II. 553.
— angustifolium Ait. II. 554.
— arboreum Marsh. II. 549.
— Arctostaphylos L. II. 560.
— atrococcum Hell. II. 553.
— brachycerum Mchx. II. 547.
— bracteatum Thbg. II. 551.
— buxifolium Salisb. II. 547.
Vaccinium caespitosum Mchx. II. 556.
— canadense Kalm II. 553.
— — chlorocoecum Decne. II. 553.
— cantabricum Huds. II. 515.
— Chamissonis Bong. II. 559.
— ciliatum Thbg. II. 552.
— corymbosum Ht. II. 553.
— — L. II. 553.
— — amoenum Gray II. 553.
— — atrococcum Gr. II. 553.
— — pallidum Gr. II. 555.
— diffusum Ait. II. 550.
— disomorphum Mchx. II. 553.
— dumosum Andr. II. 547.
— elevatum Sol. II. 550.
— Elliotti Chapm. II. 553.
— erythrocarpum Michx. II. 561.
— formosum Andr. II. 553.
— frondosum L. II. 548.
— glaucum Mchx. II. 548.
— hirsutum Buckl. II. 555.
— birtellum Ait. II. 547.
— hirtum Thbg. II. 555.
— hispidulum L. II. 539.
— humifusum Grah. II. 536.
— Idsuroei Franch. et Sav. II. 551.
— intermedium Ruthe II. 558.
— japonicum Miqu. II. 561.
— lanceolatum Dun. II. 559.
— ligustrinum L. II. 534.
— longeracemosum Fr. et Sav. II. 552.
— macrocarpum Ait. II. 561.
— — × Oxycoccus II. 561.
— melanocarpum Mohr II. 550.
— — candicans Small II. 550.
— membranaceum Dougl. II. 558.
— microphyllum How. II. 557.
— montanum Salisb. II. 557.
— mucronatum L. II. 169.
— Myrsinites Lam. II. 551.
— myrtilloides Hook. II. 558.
— — Mchx. II. 554.
— Myrtillus L. II. 557.
— — anomalum Rouy II. 557.
— — epruinosum Asch. et Magn. II. 557.
— — erythrocarpum A. et M. II. 557.
— — leucocarpum Dumort. II. 557.
— — microphyllum Hook. II. 557.
— — × Vitis Idaea II. 558.
— nigrum Britt. II. 555.
— nitidum Andr. II. 552.
— nubigenum Fernald II. 558.
— occidentale Gray II. 556.
— oreophilum Rydbg. II. 1047.
— ovalifolium Smith II. 559.
— ovatum Pursh II. 559.
— oxycoccus L. II. 560.
— — intermedium Gray II. 561.
— — microcarpum A. et Gr. II. 561.
— — oblongifolius Mchx. II. 561.
— pallidum Ait. II. 555.
— parvillorum Andr. II. 548.
— parvifolium Smith II. 559.
— pennsylvanicum Lam. II. 554.
— — angustifolium Gray II. 554.
— — leucocarpum Deane II. 554.

Vaccinium pennsylvanicum myrtilloides Fernald II. 554.
— — nigrum Wood II. 555.
— praestans Lamb. II. 556.
— pubescens Wormsk. II. 556.
— punctatum Lam. II. 559.
— resinosum Ait. II. 548.
— sednense Pers. II. 556.
— Smallii Gray II. 555.
— stamineum L. II. 550.
— — fructu coeruleo Ht. II. 550.
— — melanocarpum Mohr II. 550.
— tenellum Ait. II. 553.
— uliginosum L. II. 556.
— — frigidum Schur II. 556.
— — krushianum Fisch. II. 556.
— — leucocarpum Zhl. II. 556.
— — macrocarpum Drej. II. 556.
— — microphyllum Lge. II. 556.
— — mucronatum Herd. II. 556.
— — nanum Boiss. II. 556.
— — pubescens Zbl. II. 556.
— — sednense Rong II. 556.
— ursinum M. A. Curt. II. 548.
— vacillans Kalm II. 554.
— venustum Ait. II. 548.
— virgatum Ait. II. 552.
— Vitis Idaea L. II. 559.
— — leucocarpum Asch. II. 559.
— — minor Lodd. II. 559.
Valoradia Hochst. II. 572.
— plumbaginoides Bois. II. 572.
Vauquelinia Corr. 492, II. **962**.
— angustifolia Rydb. II. 962.
— californica Sarg. II. 962.
— corymbosa Corr. 492, II. 962.
— Karwinskyi Max. 493, II. 962.
— Torreyi S. Wats. 493.
Vella L. 358.
— pseudocytisus L. 358.
— spinosa Boiss. 358.
Veronica L. II. 621, **1049**.
— Armstrongii Kirk. II. 1050.
— chathamica Buch. II. 1053.
— Colensoi Hk. II. 1052.
— cupressoides Hk. II. 621, 1050.
— Darwiniana Col. II. 1052.
— decumbens Armstr. II. 1051.
— diosmaefolia Cunn. II. 1051.
— — trisepala Kirk. II. 1052.
— elliptica Forst. II. 621.
— glaucophylla Cock. II. 1052.
— Godefroyana Carr. II. 1052
— Hectorii Hk. II. 1050.
— Hillii Col. II. 1052.
— loganioides Armstr. II. 1050.
— pinguifolia Hk. II. 1050.
— Traversii Hk. II. 621, 1052.
— trisepala Col. II. 1052.
Vesalea floribunda Mart. et Gal. II. 1059.
Vesicaria sinuata Poir. 359.
— utriculata DC. 359.
Viburnum L. II. 638, **1057**.
— acerifolium Ht. II. 640.
— — L. II. 642.
Viburnum acuminatum Ht. II. 656.
— affine Bush II. 649.
— alnifolium Marsh. II. 659.
— americanum Mill. II. 640.
— amplifolium Rehd. II. 654.
— anglicum Ht II. 656.
— arborescens Hemsl. II. 663.
— arcuatum Kom. II. 663.
— Awabucki Koeb II. 667.
— betulifolium Bat. II. 648.
— bitchiuense Mak. II. 663, 1058.
— Bockii Graeb. II. 661.
— brachybotryum Hemsl. II. 667.
— bracteatum Rehd. II. 649.
— brevipes Rehd. II. 1058.
— — Taquetii Rehd. II. 1058.
— buddleifolium C. H. Wright II. 659.
— Buergeri Miqu. II. 643.
— burejaeticum Rgl. et Herd. II. 663.
— burejanum Herd. II. 663.
— Carlesii Hemsl. II. 658.
— cassinoides L. II. 654.
— ceanotboides C. H. Wright II. 643.
— chinshanense Graeb. II. 665.
— cinnamomifolium Rehd. II. 652.
— congestum Rehd. II. 664.
— cordifolium Wall. II. 665.
— coriaceum Bl. II. 654.
— corylifolium Hk. II. 646.
— cotinifolium Don II. 659.
— crassifolium Rehd. II. 654
— cuspidatum Thbg. 666.
— cylindricum Hamilt. II. 654.
— dasyanthum Rehd. II. 647.
— Davidi Franch. II. 652.
— davuricum Pall. II. 663.
— Demetrionis Deane et Rob. II. 649.
— dentatum L. II. 645.
— — longifolium Dipp. II. 647.
— — lucidum Ait. II. 645.
— — pubescens Ait. II. 652.
— — scabrellum Torr. et Gr. II. 647.
— — semitomentosum Mchx. II. 647.
— Dielsii Graeb. II. 662.
— dilatatum Thbg. II. 645.
— — radiatum Gray II. 667.
— ellipticum Hook. II. 652.
— erosum Thbg. II. 650.
— — ichangense Hemsl. II. 650.
— — setchuense Graeb. II. 650.
— erubescens Wall. II. 669.
— — burmanicum Rehd. II. 1058.
— — gracilipes Rehd. II. 1058.
— — × Henryi II. 1058.
— — Prattii Rehd. II. 1058.
— fallax Graeb. II. 661.
— foetidum Wall. II. 643.
— — rectangulum Rehd. II. 643.
— Fordiae Hance II. 647.
— fragrans Bge. II. 667.
— furcatum Bl. II. 665.
— — Ht. II. 645.
— Giraldii Graeb. II. 662.
— glomeratum Max. II. 658.
— grandiflorum Wall. II. 667.
— Hanceanum Dipp. II. 647.

Viburnum lanceanum Max. II. 667, 1058.
— Henryi Hemsl. II. 668, 1058.
— Hessei Koch. II. 645.
— hirtulum Rehd. II. 647.
— hirtum Thbg. 387.
— hupehense Rehd. II. 649, 1058.
— hypoleucum Rehd. II. 660.
— ichangense Rehd. II. 650.
— involueratum Wall. II. 646.
— Jacquemontii Planch. II. 643.
— japonicum Sprgl. II. 643.
— — boninsimense Mak. II. 643.
— kansuense Bat. II. 641, 1058.
— Keteleeri Carr. II. 663.
— — macrocephalum Carr. II. 663.
— laevigatum Ait. II. 657.
— Lantana L. II. 659.
— — aureo-marginatum Ht. II. 659.
— — discolor Hut. II. 659.
— — glabratum Chabt. II. 659.
— — maculatum Pant. II. 659.
— — minus Dipp. II. 659.
— — rugosum Rehd. II. 659.
— lantanoides Mchx. II. 660.
— latifolium Ht. II. 654.
— laurifolium Lam. II. 653.
— Lentago L. II. 656.
— — × nudum II 656.
— — sphaerocarpum Gray II. 656.
— lobatum Lam. II. 641.
— lobophyllum Graeb II. 649, 1058
— — floccnlosum Rehd. II. 1058.
— lucidum Mill. II. 653.
— macrocephalum Fort. II. 663.
— — Keteleeri Nich. II. 663.
— — sterile Dipp. II. 663.
— macrophyllum Auct. II. 643.
— molle Auct. II 647.
— — Mchx. II. 649.
— — tomentosum Chapm. II. 647.
— mongolicum Rehd. II. 663.
— Mullaha Ham. II. 646.
— multratum K. Koch II. 659.
— nervosum Don II. 667.
— nitidum Ait. II. 656.
— nudum L II. 655.
— — angustifolium Torr. et Gr II. 656.
— — cassinoides Torr. et Gr. II. 655
— — Claytoni Torr. et Gr. II 656.
— — grandifolium Gray II. 656.
— — nitidum Zah. II. 656
— — serotinum Rav. II. 656.
— obovatum Walt. II. 657.
— odoratissimum Ker II. 667.
— opuloides Mühl. II. 640.
Opulus L. II. 640.
— americanum Ait. II. 640.
— aureum C. S. II. 640.
— — eradiatum Oak II. 642.
— — H. pl. Ht. 640.
— — nanum Jacqu. II. 640, 1057.
— — pygmaeum Ht. II. 640, 1057.
— — roseum L. II. 640.
— — Sargentii Tak. II 1057.
Viburnum Opulus scantocarpum Späth II. 640.
— — sterilis DC. II. 640.
— orientale Pall. II. 643.
— ovatifolium Rehd. II. 647.
— Oxycoccus Pursh II. 640.
— pallidum Franch. II. 643.
— pauciflorum Ral. II. 642.
— phlebotrichum S. et Z. II. 644.
— plicatum Thbg. II. 665.
— — parvifolium Miqu. II. 666.
— — plenum Miqu. II. 665.
— polycarpum Wall. II. 659.
— Pratti Graeb. II. 669, 1058.
— propinquum Hemsl. II. 652.
— — parvifolium Graeb. II. 652.
— prunifolium Ht. II. 656.
— — L. II. 656.
— — globosum Nash II. 656.
— pubescens Pursh II. 651.
— pubigerum Wight et Arn. II. 669.
— pyramidatum Rehd. II. 654.
— pyrifolium Poir. II. 656.
— rectangulum Graeb. II. 643.
— reticulatum Ht. II. 667.
— rhytidophyllum Hemsl. II. 664.
— rigidum Vent. II. 654.
— rosaceum Ht. II. 640.
— roseum Ht. II. 640.
— Rosthorni Graeb. II. 665.
— rufidulum Ral. II. 656.
— rufotomentosum Small II. 656.
— rugosum Pers. II. 654.
— Sandankwa Hassk. II. 667.
— Sargenti Koehne II. 640, 1057.
— — calvescens Rehd. II. 640.
— scabrellum Chapm. II. 647.
— scandens L. F. 388.
— semitomentosum Rehd. II. 647.
— sempervirens K. Koch II. 643.
— serratum Thbg. 392.
— setigerum Hance II. 654.
— shensianum Maxim. II. 662.
— Sieboldi Miqu. II. 667.
— — reticulatum Rehd. II. 667.
— — variegatum Rehd. II. 667.
— squamatum Willd. II. 655.
— stellulatum Wall. II. 646.
— strictum Link II. 654.
— suspensum Ldl. II. 667.
— sympodiale Graeb. II. 665
— Taquetii Lév. II. 1058.
— ternatum Rehd. II. 654.
— theiferum Rehd. II. 645.
— Tinus L. II. 652.
— — strictum Ait. II. 654.
— — — Spr. II. 1058.
— tomentosum Lam. II. 659.
— — Thbg. II. 665, 1058.
— — cuspidatum Maxim. II. 666.
— — lanceolatum Rehd. II. 666.
— — Mariesi Veitch II. 666.
— — parvifolium Rehd. II. 666.
— — plenum Rehd. II. 665.
— — plicatum Maxim. II. 665.
— — rotundifolium Rehd. II. 666.

Viburnum tomentosum sterile Zab. II. 665.
— trilobum Marsh. II. 640.
— urceolatum S. u. Z. II. 661.
— utile Hemsl. II. 663.
— venosum Britt. II. 647.
— — Canbyi Rehd. II. 647.
— — longifolium Rehd. II. 647.
— venulosum Benth. II. 613.
— Veitchi C. H. Wright II. 658.
— Vetteri Zab. II. 656.
— virens Tbbg. 388.
— Wightianum Wall. II. 669.
— Willcanum Graeb. II. 649.
— Wilsoni Rehd. II. 647.
— Wrightii Ht. 645.
— — Miqu. II. 645.
— yunnanense Rehd. II. 667.
Vinca L. II. 848.
— acutiflora Bert. II. 850.
— difformis Pourr. II. 850.
— major L. II. 849.
— — elegantissima Mill. II. 849.
— — pubescens Boiss. II. 849.
— media Hoff. et Lk. II. 850.
— minor L. II. 848.
— — alba Dipp. II. 849.
— — — plena Mill. II. 849.
— — albovariegata Mill. II. 849.
— — argenteo-variegata Mill. II. 849.
— — aureovariegata Mill. II. 849.
— — azurea Dipp. II. 849.
— — coerulea Mill. II. 849.
— — — plena Dipp. II. 849.
— — cuprea Doell. II. 849.
— — purpurea Ht. II. 849.
— — — plena F. W. B. II. 849.
— — rosea Mill. II. 849.
— — — plena Dipp. II. 849.
— — typica C. S. II. 849.
— pubescens Urv. II. 850.
Viola arborescens L. II. 356.
Vlorna flaccida Small 277.
— Gattingeri Small 276.
— glaucophylla Small 277.
— obliqua Small 277.
— versicolor Small 277.
Virgilia capensis Lam. II. 16.
— lutea Mchx. II. 16.
Viscum L. 248.
— album L. 248.
— — coloratum Kom. II. 905.
— — laxum Fiek. 249.
— — lutescens Mak. II. 905.
— — rubroaurantiacum Mak. II. 905.
— austriacum Wiesb. 249.
— laxum Boiss. et R. 249.
— oxycedri DC. 251.
Vitex L. II. 594.
— agnus castus L. II. 594.
— — alba Rehd. II. 594.
— — coerulea Rehd. II. 594
— — diversifolia Schelle II. 594.
— — latifolia Loud. II. 594.
— cannabifolia S. et Z. II. 594
— incisa Lam. II. 594.
Vitex incisa heterophylla Fr. II. 1033.
— — multifida C. Schn. II. 594.
— laciniata Ht. II. 594.
— latifolia Mill. II. 594.
— Negundo L. II. 594.
— verticillata Lam. II. 594.
Vitis L. II. 301, 1032, **1033**.
— adstricta Hance II. 1033.
— aestivalis Mchx. II. 306.
— — Bourquiniana Bail. II. 306.
— — × candicans II. 304.
— — canescens Engelm. II. 308.
— — × cinerea II. 306.
— — Lincecumii Muns. II. 306.
— amurensis Ht. II. 320.
— — Rupr. II. 311.
— arborea L. II. 322.
— argentifolia Muns. II. 306.
— arizonica Engelm. II. 308.
— — × rupestris II. 310.
— armata Diels et Gilg II. 303, II. 1033.
— — Veitchi Veitch II. 1033.
— austrina Small II. 306.
— Baileyana Muns. II. 308.
— Berlandieri Planch. II. 308.
— betulifolia Diels et Gilg II. 303.
— bicolor Le Conte II. 306.
— bipinnata Nutt. II. 322.
— Blandi Prince II. 304.
— Bourquiniana Muns. II. 306.
— brevipedunculata Dipp. II. 319.
— californica Bentb. II. 306.
— candicans Engelm. II. 304.
— — × Berlandieri II. 304.
— — × rupestris II. 304.
— — × vulpina II. 304.
— cantoniensis Seem. II. 323.
— capriolata D. Don II. 312.
— Caribaea DC. II. 306.
— Champini Planch. II. 304.
— cinerea Engelm. II. 308.
— — canescens Bail. II. 308
— — floridana Muns. II. 306.
— citrulloides Ht. II. 320.
— Coignetiae Pull. II. 305.
— congesta Ht. II. 305.
— cordata Koch II 318.
— cordifolia Mchx II. 312.
— — foetida Engelm. II 312.
— — sempervirens Muns. II. 312
— coriacea Shuttl. II. 304.
— Davidi Foëx II. 303, **1033**.
— Delavayi Veitch II. 1033.
— diversifolia Prince II. 306.
— Doaniana Muns. II. 304.
— elegans K. Koch II. 320.
— ficifolia Bge. II. 307, **1033**.
— flexuosa Thunb. II 309.
— — parvifolia Gagnep. II. 1033.
— — Wilsoni Veitch II. 1033.
— floridana Ral. II. 306.
— Foëxeana Planch. II. 310.
— Girdiana Muns. II 306.
— hederacea Ehrh. II. 317.
— — texana Dur. II. 316.

Vitis Henryana Hemsl. II. 318.
— heptaphylla Britt. II. 316.
— heterophylla Thbg. II. 320.
— — citrulloides Ht. II. 320.
— — cordata Rgl. II. 319.
— — humulifolia J. D. Hook. II. 320.
— himalayana Brand. II. 314.
— Hoggi Ht. 1021.
— incisa Jacqu. II. 310.
— inconstans Miqu. II. 315.
— indivisa Willd. II. 318.
— japonica Ht. II. 315.
— — Thbg. II. 300.
— Labrusca L. II. 304.
— — × vulpina II. 304.
— laciniosa L. II. 312.
— lanata Roxb. II. 305.
— leeoides Ht. II. 1032.
— — Maxim. II. 323.
— Linsecomii Buckl. II. 306.
— Longii Prince II, 310.
— megaphylla Veitch II. 1034.
— monosperma Mchx. II. 311.
— monticola Buckl. II. 310.
— Munsoniana Simps. II. 301.
— Mustangensis Buckl. II. 304.
— Nortoni Prince II. 306.
— Nuevo-Mexicana Lemm II. 310.
— odoratissima Donn II 310.
— orientalis Boiss. II. 321.
— Pagnucci Rom. du Caill. II. 302, 1033.
— palmata Vahl II. 310.
— parvifolia Roxb. II 309. 1033.
— pentagona Diels et Gilg II. 306.
— persica Boiss. II. 318.
— Piasezkii Maxim. II. 303.
— — Baroniana Diels et Gilg II. 303.
— Potentilla Lév. et Vut. II. 313.
— — glabra L. et V. II. 313.
— pubescens Miqu. II. 317.
— pullaria Le Conte II. 312.
— quinquelolia Lam. II. 317.
— — macrophylla Lauche II. 315.
— — radicantissima Lauche II. 317.
— — hirsuta Nich. II. 317.
— riparia Mchx. II. 310.
— — palmata Planch II. 310.
— — cirrhisequa Koehne II. 310.
— Romaneti Rom. du Caill. II. 303.
— rotundifolia Mchx. II. 301.
— Royleana Ht. II. 322.
— rubra Mchx II. 311.
— rubrifolia Lév. et Vt. II. 1033.
— rupestris Scheele II. 309.
— — dissecta Egg. II. 309.
— rutilans Carr. II. 1033.
— serjaniaefolia Franch. et Sav. II 320
— Sieboldii Ht. II. 308.
— Simpsoni Muns. II. 304
— Solonis Planch. II. 310.
— sylvestris Gmel. II. 312.
— taurina Bartr. II. 301.
— texana Muns. II. 310.
— Thomsoni Laws. II. 1033.
Vitis Thomsoni Veitch II. 1033.
— Thunbergi S. et Z. II. 307.
— — adstricta Gagnep. II. 1033.
— — cinerea Gagnep. II. 1033.
— Treleasei Muns. II. 310.
— trichoclada Diels et Gilg II. 306.
— vinifera L. II. 312.
— — amurensis Rgl. II. 311.
— — apiifolia Loud. II. 312.
— — Davidi Hort. II. 1033.
— — laciniosa Dipp. II. 312.
— Veitchi Ht. II. 315.
— vulpina Auct. II. 301.
— — L. II. 310.
Vitis Idaea punctata Mnch. II. 559
Voglera G., M. et Sch. II. 28.
— spinosa G., M. et S. II. 30.

Wagneria Middendorffiana Versch. II. 752.
Weigela (Weigelia) Thbg. II. 745.
— amabilis Ht. II. 748.
— arborea grandiflora Ht. II. 749.
— arborescens Ht. II. 751.
— coraeensis Thbg. II. 750.
— Desboisii Carr. II. 748.
— floribunda Ht. II. 751.
— florida DC. II 748.
— grandiflora alba Ht. II. 748.
— intermedia Kirchn. II. 748.
— Isoline V. Htte. II. 748.
— japonica Thbg. II. 751.
— Lavallèei Ht. II. 751.
— Middendorffiana Ht. II. 752.
— multiflora Ht. II. 751.
— rosea Ldl. II. 748.
— — alba Carr. II. 748.
— — nana fol. varg. V. Htte. II. 748.
— Stelzneri V. Htte. II. 748.
Whipplea Torr. 382.
— modesta Torr. 382.
— utahensis Wats. 376.
Wiborgia Mnch. II. 48.
Wickstroemia Endl. II. 393, 1038.
— canescens Meissn. II. 393.
— — Ganpi Miqu. II. 393.
Wigandia californica Hk. et Arn. II. 585.
Wikstroemia Endl. II. 393, 1038.
Wintera aromatica Murr. II 925.
Wisteria (Wistaria) Nutt. II. 75, 1010
— brachybothrys S. et Z. II. 79.
— chinensis multijuga Hk. II. 77.
— frutescens DC. II. 76.
— — macrostachya Torr. et Gr. II. 77.
— — magnifica Henricqu. II. 76.
— japonica S. et Z. II. 75.
— macrobotrys Ht. II. 78.
— macrostachys Nutt. II 77.
— multijuga Htte. II. 1010.
— — alba Miller II. 77.
— — × sinensis II. 78.
— polystachya K. Koch II. 79.
— sinensis DC. II. 78, 1010.

Wisteria sinensis S. et Z. II. 77.
— — alba-plena W. Miller II. 78.
— — albiflora Lemaire II. 78.
— — flore-pleno W. Miller II. 68.
— — macrobotrys Beau. II. 78.
— — variegata W. Mill. II. 78.
— — violaceo-plena C. S. II. 78.
— speciosa Nutt. II. 76.

Xanthoceras Bunge II. 257.
— sorbifolia Bunge II. 257.
Xanthorrhiza simplicissima Marsh. 273.
Xolisma ferruginea Hell. II. 532.
— foliosillora Small II. 533.
— fruticosa Nash II. 533.
Xylophylla obovata W. II. 1020
— — ramillora Ait. II. 135.
Xylosteum alpigenum Fischer II. 707.
— alpinum Dum. II. 707.
— arboreum Webb II. 726.
— asperifolium Dec. II. 702.
— Bungeanum Rupr. II. 692.
— campaniflorum Lodd. II. 704.
— chrysanthum subtomentosum Rupr. II. 719.
— ciliatum Pursh II. 692.
— coeruleum Dum. de Cours. II. 695.
— conjugiale How. II. 711.
— cordatum Moench II. 717.
— flexuosum Dum. II. 733.
— gibbiflorum Rupr. II. 722.
— hispidum Steph. II. 701.
— ibericum Fisch. II. 697.
— involucratum Rich. II. 705.
— Karelini Rupr. II. 7f0.
— Ledebourii How. II. 705.
— ligustrinum D. Don II. 695.
— Maacki Rupr. II. 724.
— Maximowiczii Rupr. II. 7f2.
— mexicanum Humb. II. 693.
— nigrum Med. II. 715.
— oblongifolium Gold. II. 706.
— orientale Fisch. II. 713.
— Philomelae Jac.-Mak. II. 693.
— pubescens Juss. II. 722.
— purpurascens Dec. II. 687.
— pyrenaicum Borkh. II. 717.
— — Dum. de Cours. II. 704.
— Sieversianum Rupr. II. 692.
— Solonis Eat. II. 694.
— spinosum Dec. II. 686.
— tataricum Dum. de Cours. II. 717.
— — Michx. II 692.
— utahense How. II. 692.
— villosum Mchx. II. 694
— — Torr. II. 706.
— vulgare Borkh. II. 722.

Yucca L. II. 855.
— acuminata Sweet II. 859.
— angustifolia Pursh II. 858.
— angustissima Englm. II. 858.
— — elata Engl. II. 858
— — radiosa Englm. II. 858.
Yucca arborescens Trel. II. 859.
— brevifolia Englm. II. 859.
— Draconis arborescens Torr. II. 859.
— elata Englm. II. 858.
— filamentosa Auct. II. 857.
— — L. II. 855.
— — flaccida Englm. II. 857.
— — × glauca fl. 858.
— — glaucescens Bak. II. 858.
— flaccida Haw. II. 855.
— — × glauca II. 858.
— — glaucescens Trel. II. 855.
— — integra Trel. II. 856.
— glauca Nutt. fl. 858.
— — Sims II. 857.
— — stricta Trel. If. 858.
— glaucescens Haw. II. 856.
— gloriosa Ht. II. 859.
— — L. II. 858.
— — recurvifolia Englm. II. 859.
— Harrimanianae Trel. II. 858.
— karlsruhensis Graeb. II. 858.
— parviflora Torr. II. 859.
— pendula Groenl. II. 859.
— radiosa Trel. II. 858.
— recurva Haw. II. 859.
— recurvifolia Salisb. II. 859.
— stricta Sims. II. 858.
— tenuistyla Trel. II. 858.
— Whipplei Bak. II. 859.

Zanthorhiza L'Hér. 273.
— apiifolia L'Hér. 273.
Zanthoxylum L. II. 118.
— acanthopodium DC. II. 118.
— ailanthoides S. et Z. II. 121.
— alatum Roxb. II. 118.
— americanum Mill. II. 118.
— Arnottianum Maxim. II. 118.
— Bungeanum Maxim. II. 118.
— Bungei Planch II. 118.
— dimorphophyllum Hemsl. II. 120.
— dissitum Hemsl. II. 120.
— fraxineum Willd. If. 118.
— fraxinoides Hemsl. II. 119.
— mandschuricum Benn. II. 121.
— micranthum Hemsl. II. 120.
— multijugum Franch. II. 121.
— nitidum Bge. II. 118.
— Piasezkii Max. II. 119.
— piperitum DC. II. 120.
— planispinum S. et Z. II. 120.
— schinifolium S. et Z. II. 121.
— stenophyllum Hemsl. II. 121.
— trifoliatum L. II. 427.
— Tweedi Engl. II. 118.
— undulatifolium Hemsl. II. 119.
Zauschneria Presl II. 418.
— argentea A. Nels. II. 4f8.
— arizonica Dav. II. 418.
— californica Presl II. 418.
— — latifolia Ldf. II. 418.
— latifolia Greene II. 418
— tomentella Greene II 4f8.
Zelkova Spach 224, 805.

Zelkova Abelicea Boiss. 226, 806.
— acuminata Planch. 226.
— carpinifolia Dipp. 225.
— crenata Spach 225.
— cretica Spach 226.
— hirta C. S. 806.
— japonica Dipp. 225.
— keaki Mayr [et Dipp.] 226, 806.
— serrata Mak. 806.
— ulmoides C. Schn. 806.
Zenobia cassinefolia Poll. II. 527.
— floribunda DC. II. 528.
— pulverulenta Poll. II. 527.
— racemosa DC. II. 528.
— speciosa Don II. 526.
— — pulverulenta Rehd. II. 527.
Zizyphus Mill. II. 261.
— Giraldii Spr. II. 1031.
— Jujuba Lam. II. 261.
— Paliurus W. II. 260.
— sativa Gaertn. II. 261.
— — spinosa II. 261.
— — inermis II. 261.
— sinensis Lam. II. 261.
— vulgaris Lam. II. 261.
— — spinosa Bge. II. 261.
Zygophyllum L. II. 115, **1017.**
— brachypterum K. et K. II. 1017.
— Fabago L. II. 1018.
— ovigerum F. et M. II. 1018.
— xanthoxylum Engl. II. 115.

Druck von Ant. Kämpfe, Jena.